

Erster Nachtrag

zu Edm. Reitter's

Uebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Schlesien


von

Hanns Leder.

Sehr schätzenswerthe Mittheilungen der Herren Kittner in Boskowitz und Kotula in Teschen, so wie des Herren Lehrers Weise in Berlin, welch' Letzterer im vergangenen Sommer eine entomologische Reise in den nördlicheren Theil von österr. Schlesien unternahm und mir seine Resultate bereitwilligst zur Benützung überliess, boten an und für sich schon eine reiche Zahl von Arten, welche in dem Verzeichnisse des Herrn Reitter (Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn, VIII. Bd. II. Heft.) noch nicht angeführt sind, oder für die sich neue Daten über die Verbreitung ergeben haben. Noch mehr Neues brachte uns aber das „Verzeichniss der Käfer Schlesiens von R. Letzner, Breslau 1871“, welches, nach dem Erscheinen der oberwähnten Uebersicht herausgegeben, eine Menge Fundorte unserer Fauna bisher fehlender Arten aus österreichischem Gebiete enthält. Von der Ansicht ausgehend, dass die Schriften des heimischen Vereines gewissermassen auch ein Repertorium für alle Forschungen bieten sollen, welche auf das Vereinsgebiet Bezug haben, trug ich kein Bedenken, die Angaben des Letzner'schen Verzeichnisses, mit gewissenhafter Anführung der Quellen, der nachfolgenden Aufzählung einzufügen. Es betrifft dies namentlich die meisten Arten, welche auf dem Altvater oder im nördlichen Theile von österr. Schlesien jenen entomologisch noch am wenigsten durchforschten Partien unseres Heimatlandes vorkommen. Endlich habe ich, wie Herr Reitter auch auf die in unserem Gebiete noch nicht beobachteten oberschlesischen oder sonst aus dem Grenzgebiete stammenden Arten Rücksicht genommen, weil ich denke, dass

sehr viele von ihnen bei uns, unter ähnlichen Lokalverhältnissen noch aufzufinden sein werden und zwar um so eher, wenn in dieser Weise hierzu angeregt wird. Um jedes Missverständniss zu vermeiden, sind diese Arten durch den Druck ausgezeichnet.*)

*) Die Arten, deren Namen mit Cursivschrift gedruckt sind, sind in den Nachbarländern nachgewiesen und wohl auch bei uns auffindbar. Bei den mit einem * bezeichneten Arten sind blos neue Fundorte angegeben. V. L. bedeutet: Verzeichniss Letzner.



Carabidae.

Carabus Linné.

auratus L. In Gärten und Feldern der Ebene, jedoch nur im westlichen Schlesien. Görlitz (nicht selten), Friedeberg a. d. Oder. V. L.

Leistus Fröhlich.

montanus Steph. Nur im Riesengebirge in einer Höhe von mehr als 4000 Fuss, unter Steinen, ziemlich selten. V. L.

Dyschirius Bonelli.

rotundipennis Chaud. Unter einem Rohrraufen auf Sand 2 Stück (Pfeil). V. L.

Malceus Er. In der Ebene an Gewässern, sehr selten. Grafschaft Glatz, Kanth, Liegnitz. V. L.

obscurus Gyll. Im feinen Sande an Ufern von Flüssen, ziemlich selten. Breslau (Schwarz, v. Bodemeyer). V. L.

Aëtrophorus Schmidt-Goebel.

imperialis Germ. An Ufern von Gewässern und Sümpfen, nach Uberschwemmungen in Rohrstengeln, selten. Leobschitz, Breslau, Glogau (Quedenfeld). V. L.

Dromius Bonelli.

meridionalis Dej. Um Boskowitz und Kunstadt, nicht selten. (Kittner).

melanocephalus Dej. Sehr selten. Birnbäumel. V. L.

Cymindis Latreille.

macularis Mannh. An trockenen sandigen Stellen, unter Moos, Caluna vulgaris, Steinen etc. manchmal ziemlich häufig. Festenberg, (Lottermoser), Panten bei Liegnitz (Schwarz). V. L.

Chlaenius Bonelli.

caelatus Web. In Kieferwäldern, untern Moos, sehr selten. V. L.

Licinus Latreille.

silphoides Fabr. Ratibor, sehr selten (Kelch)? V. L.

**depressus* Payk. Boskowitz (Kittner), Altvater-Gebirge (Letzner).

Pogonus Dejean.

luridipennis Germ. An Ufern von Bächen und Teichen im Gebirge, sehr selten. Ufer der Aupe im Riesengrunde (Schwarz). V. L.

iridipennis Nicol. Ratibor, selten (Roger). V. L.

Calathus Bonelli.

mollis Marsh. Altvater (Weise).

Anchomenus Erichson.

longiventris Mannh. An feuchten Orten, ziemlich selten. Breslau, Birnbäumel, Glogau. V. L.

Krynickii Sperk. An feuchten Orten, unter Laub etc. selten. Breslau, Trachenberg. V. L.

ericeti Panz. Bis jetzt nur im Riesengebirge. V. L.

puellus Dej. Ziemlich häufig. Ratibor, Rauden, O.-S. Landsberg, Breslau, Maltsch, Liegnitz, Glogau. V. L.

Olisthopus Dejean.

Sturmii Duftsch. An Waldrändern, trockenen Lehnen, an Wurzeln der Bäume, unter Steinen etc. selten. Neurode, Glatz (v. Rottenberg), Königshain, Reichensteiner Gebirge. V. L.

Feronia Latreille.

(*cuprea*) var. *affinis* St. Bei Kunstadt einige Exemplare (Kittner). *versicolor* St. Auf Feldern, Wegen, unter Steinen etc. V. L.

Amara Bonelli.

strenua Zimm. An Flussufern, sehr selten. Breslau, Glogau, V. L.

fusca Dej. In den jungen Hauen der Nadelholzwaldungen, sehr selten. Eulen-Gebirge, Bögenberge, Hessberge. V. L.

cursitans Zimm. ♀ *fuscicornis* Zimm. In Wäldern und jungen Hauen des Gebirges und Vorgebirges selten. Karlsbrunn, Klessengrund, Hessberge, Landeshuter Kamm. V. L.

sylvicola Zimm. Auf trockenen Sandhügeln, sehr selten. Saaber bei Glogau, Karlowitzer Sandhügel bei Breslau. V. L.

infima Duft. Auf Sandhügeln, in Kieferwäldern, unter Moos, sehr selten. Rauden, Ujest, Obora bei Ratibor, Liegnitz (v. Rottenberg), Glogau. V. L.

brunea Gyll. An sandigen Orten, um Baumstämme, unter Moos etc. sehr selten. Raudten O.-S., Birnbäumel, Liegnitz, Glogau. V. L.

crenata Dej. Mühlgest bei Raudten 1 Ex. (v. Rottenberg).

nobilis Duft. Grafschaft Glatz (Zebe). V. L.

Harpalus Latreille.

**signaticornis* Duftschm. Paskau auf sandigen Feldern, zahlreich; Kunstadt (Kittner).

flavicornis Dej. Ziemlich verbreitet und häufig. V. L.

Stenolophus Dejean.

longicornis Schaum An Flussufern, ziemlich selten. Glogau, Liegnitz (Gerhardt, Schwarz) V. L.

Trechus Clairville.

micans Schaum. Im Gebirge unter Steinen, Moos etc. häufig. Altvater, Schneeberg, Riesengebirge, Grafschaft Glatz. V. L.

striatulus Putz. Im Gebirge (4500 F.) häufig. Altvater, Janowitzer Haide. Krumhübel, schwarze Koppe, hohes Rad, Schnee gruben. V. L.

latus Putz. In den Beskiden. Ustron. (Roger).

Tachys Schaum.

Fockii Humm. Selten. Breslau, Birnbäumel. V. L.

Bembidium Latreille.

**obtusum* St. Kunstadt, selten (Kittner).

Mannerheimii Sahlb. Ziemlich selten. Patschkau, Kamenz, Glogau, Birnbäumel, Breslau. V. L.

aspericollis Germ. Grafschaft Glatz (Zebe).

conforme Dej. In Gebirgstälern an feuchten Flussufern, selten. Altvater, Ustron, Grätz bei Troppau.

stomoides Dej. Wie der Vorhergehende. Ziemlich selten. Ustron, Wartha, Reinerz, Aupethal. V. L.

obliquum Sturm. Ustron, Troppau. Ratibor (selten).

ruficollis Panz. In der Ebene und dem Gebirge, an sandigen Flussufern, ziemlich häufig. Breslau, Parchwitz, Glogau, kleiner Teich (Gerh.) V. L.

argenteolum Ahr. *var. azureum* Gebl. In der Ebene, ziemlich selten. Breslau, Parchwitz, Glogau, Militsch. V. L.

planum Schilling in Schlesien. Arb. u. Verh. d. schl. Gesellsch. 1846 p. 86; Cat. Coleop. (Gem. et Harold p. 418).

infuscatum Schilling in Schlesien. Arb. u. Verh. d. schl. Gesellsch. 1846 p. 86 Cat. Coleop. (Gem. et Harold p. 414).

Dytiscidae.

Haliplus Latreille.

varius Nicolai. Bei Rauden (Roger).

Brychius Thomson.

elevatus Panz. Am Ufer der Zwittawa bei Skalitz gefangen (Kittner).

Hydroporus Clairville.

- lautus* Kiesw. In Bächen und Tümpeln der Gebirgsthäler, sehr selten. Flinsberg (Letzner), Dittersbach (Gerhardt) V. L.
- septentrionalis* Gyll. Im Gebirge, ziemlich selten. Iserkamm, Reifträger, Hirschberger Thal. V. L.
- dorsalis* Fabr. *var. figuratus* Gyll. Sehr selten. Scheitnig (v. Uechtritz) Glogau, Niesky, Liegnitz. V. L.
- oblongus* Steph. Sehr selten. In Gräben bei Ratibor (Kelch) V. L.
- ferrugineus* Steph. Im Gebirge, in Bächen, manchmal ziemlich häufig, Altvater-Gebirge, Grafschaft Glatz, Riesen-Gebirge. V. L.
- marginatus* Duft. Selten. Breslau, Dittersbach bei Schmiedeberg, Warmbrunn. V. L.
- fuscipennis* Schaum. Ziemlich selten. Rauden, Breslau, Liegnitz. V. L.
- glabellus* Thoms. In Gebirgsbächen, ziemlich häufig. Hessberge, Waldenburger Gebirge, Glatz, Glatzer Schneeberg, Wiesenbaude, Teichränder, Grubenbaude, Kammhäuser bei Fliesberg. V. L.
- Kratzii* Schaum. In den klaren Tümpeln und Quellen auf dem Rücken des Altvater-, Schnee- und Riesengebirges. Zuweilen ziemlich häufig. Reinerz (Schwarz). V. L.
- elongatulus* Sturm. In stehenden Gewässern, sehr selten. Kunitz und Rosenau bei Liegnitz (Gerh., v. Rottenberg). V. L.
- notatus* Sturm. Sehr selten. Altvater-, Riesen- und Iser-Gebirge, Liegnitz. V. L.
- pygmaeus* Sturm. In stehenden Gewässern, selten. Militsch, Sulau, Neudorf bei Liegnitz (v. Rottenberg, Schwarz), Kunitz (Gerh.). V. L.

Colymbetes Clairville.

- Paykulli* Er. Selten. Breslau, Militsch, Schlava. V. L.
- consputus* Sturm. Selten. Breslau. V. L.

Ilybius Erichson.

- angustior* Gyll. Nicht selten. Altvater, Elbfall. Iser-Gebirge, Breslau, Militsch. V. L.

Agabus Leach.

- subtilis* Er. Ziemlich selten. Breslau, Herrnsstadt, Militsch. V. L.
- neglectus* Er. Ziemlich häufig. Breslau, Herrnsstadt, Militsch, Liegnitz, Reichenbach, Hirschberger Thal. V. L.
- chalconotus* Panz. Ziemlich selten. Breslau, Herrnsstadt, Militsch, Glogau, Fuss der Hessberge. V. L.

Gyrinidae.

Gyrinus Geoffroy.

Suffriani Scriba. Ziemlich selten. Breslau, Herrstadt, Festenberg
(Lottermoser) V. L.

Palpicornia.

Philhydrus Solier.

nigricans Zett. In stehenden Gewässern, sehr selten. Breslau. V. L.
ovalis Thoms. In der Ebene häufig durch das ganze Gebiet. V. L.
maritimus Thoms. 1 Exemplar von Gerhardt bei Liegnitz gefangen
(Schwarz).

Helochaeres Mulsant.

dilutus Er. Im Vorgebirge sehr selten. Bögenberge (1 Exemplar v.
Bodemeier).

Laccobius Erichson.

globosus Heer. In stehenden und fliessenden Gewässern, sehr selten.
V. L.

bipunctatus Thoms. Ueberall häufig. V. L.

nigriceps Thoms. Ziemlich häufig. Breslau, Waldenburger Gebirge.
Grafschaft Glatz. V. L.

alutaceus Thoms. Ziemlich selten. V. L.

Limnebius Leach.

truncatulus Thoms. Häufig. Ohlau, Breslau, Herrstadt, Liegnitz,
Reichenbach. V. L.

nitidus Marsh. Wie der Vorhergehende. V. L.

picinus Marsh. Häufig im ganzen Gebiete.

Helophorus Fabricius.

glacialis Heer. Im höhern Gebirge, selten. Riesengebirge. V. L.

dorsalis Marsh. Selten, Breslau, Sulau. V. L.

arvernicius Muls. Kunststadt, sehr selten. (Kittner).

strigifrons Thoms. 1 Exemplar bei Rauden (Roger).

brevicollis Thoms. Ueberall häufig.

Hydrochus Germar.

angustatus Germ. Selten. Breslau, Herrstadt. Liegnitz. V. L.

Ochthebius Leach.

exsculptus Germ. var. *sulcicollis* St. Freiwalldau. Grafschaft Glatz
(v. Rottenberg). V. L.

marinus Payk. Selten. Breslau, Trebnitz, Liegnitz. V. L.

foveolatus Germ. Ziemlich häufig. Patschkau, Breslau, Liegnitz.
V. L.

Hydraena Kugelmann.

testacea Curt. Selten. Bögenberge, Maltzsch (Gerh.). V. L.

angustata St. Selten. Maltzsch (Gerh.). V. L.

polita Kiesw. Ziemlich selten. Altvater-Gebirge, Grafschaft Glatz,
Bögenberge. V. L.

Cercyon Leach.

marinum Thoms. Breslau (Letzner), Liegnitz (Gerh.). V. L.

palustre Thoms. Breslau und Liegnitz. V. L.

lugubre Payk. Ziemlich häufig. Ratibor, Breslau, Liegnitz, Bögen-
berge. V. L.

Staphylinidae.

Autalia Stephens.

**impressa* Oliv. Einmal in grosser Menge bei Karlsbrunn in Schlesien
in Schafmist von Weise gesammelt.

Bolitochara Mannerheim.

bella Maerkel, In Baumschwämmen, selten. Reichenstein, Münsterberg
(v. Bodemeyer), Bögenberge. V. L.

brericollis Kraatz. Reichenstein (v. Bodemeyer), an der Heuscheuer
in Baumschwämmen (Zebe). V. L.

Ocalea Erichson.

castanea Er. Unter Moos, Laub, Anspüllicht etc. selten. Oberrnigk,
Liegnitz, Reindörfel bei Münsterberg (v. Bodemeyer), Glatz (Zebe). V. L.

Ischnoglossa Kraatz.

prolixa Grav. Schönau (Seeliger).

rufopicea Kraatz. Bis jetzt nur in der Grafschaft Glatz. V. L.

Leptusa Kraatz.

ruficollis Er. Unter Ahornrinden, an Schwämmen. Altvater-Gebirge,
Ustron.

piceata Muls. Rey. Unter Rinden etc. Waldenburger Gebirge, Volpers-
dorf. V. L.

Euryusa Erichson.

laticollis Heer. Auf Wiesen, Rainen, in Ameisenhaufen, sehr selten.
Breslau, Liegnitz. V. L.

Homoeusa Kraatz.

acuminata Maerkel. In den Nestern der *Formica fuliginosa*, selten.
Grafschaft Glatz. V. L.

Microglossa Kraatz.

pulla Gyll. Unter Moos etc. in Wäldern. Obernigk, Liegnitz. V. L.

Aleochara Gravenhorst.

monticola Rosenh. Breslau (Letzner, Schwarz). V. L.

spadicea Er. Breslau, 1 Exemplar von Letzner gefangen.

haemoptera Kraatz. An einem Pilze in den Trebnitzer Bergen. (Letzner).

mycetophaga Kraatz. An Pilzen, selten. Grafschaft Glatz, Riesengebirge, Liegnitz. V. L.

binotata Kraatz. Ziemlich häufig. Breslau, Trebnitzer Hügel, Birnbäumel, Glogau, V. L.

Ilyobates Kraatz.

propinquus Aub. Auf dem Sande an dem Ufer des Langwassers oberhalb Buschvorwerk bei Schmiedeberg (Pfeil).

Calodera Mannerheim.

protensa Mannh. Unter feuchtem Laube, selten. Grafschaft Glatz, Waldenburger Gebirge, Bögenberge, Liegnitz. V. L.

rubens Er. 1 Exemplar bei Breslau (Letzner).

uliginosa Er. Unter Laub, Gerölle etc., selten. Breslau, Liegnitz. V. L.

riparia Er. Wie *uliginosa*. Breslau, Liegnitz, Schweidnitz. V. L.

rufescens Kraatz. Bis jetzt nur bei Liegnitz gefangen (Gerh.)

aethiops Grav. An feuchten Localitäten, selten, Breslau, Liegnitz V. L.

Tachyusa Erichson.

balteata Er. An Flussufern, sehr selten. Breslau. V. L.

cyanea Kraatz. Am Rande eines Sumpfes bei Glatz. (v. Rottenberg).

Ocyusa Kraatz.

maura Er. Unter abgefallenem Laube, an den Ufern von Flüssen und Teichen, selten. Breslau, Liegnitz. V. L.

Oxypoda Mannerheim.

lateralis Sahlb. var. *pellucida* Sahlb. Unter feuchtem Moose im Gebirge. Glatzer Schneeberg (Schwarz).

lugubris Kraatz. Unter feuchtem Moose, sehr selten. Weissenrodé bei Liegnitz (Gerh.), Grafschaft Glatz (Zebe. Kraatz).

*funebri*s Kraatz. Im Gebirge, im feuchten Moose, selten, Glatzer Schneeberg (Kraatz und Zebe).

longiuscula Er. Auf einer feuchten Wiese bei Breslau (Letzner), in der Nähe der Hampelbaude (Gerh.), am Glatzer Schneeberg (Schwarz, v. Rottenberg).

togata Er. In Wäldern, unter abgefallenem Laube, ziemlich häufig.
Breslau, Liegnitz, Hessberge. V. L.

soror Thoms. Auf den Kämmen des Riesengebirges unter Steinen, ziemlich häufig. V. L.

rugulosa Kraatz. Breslau (Letzner), Liegnitz (Gerhardt).

terrestris Kraatz. Unter Gerölle am Ufer der Oder bei Breslau
1 Stück. V. L.

filiformis Redtenb. Unter Rinden in Gebirgswäldern, sehr selten. Alt-
vater (Letzner).

ferruginea Er. Unter Baumrinden, Steinen etc. selten. Altvater-Gebirge Grafschaft Glatz, Liegnitz, (Gerh.) V. L.

prociua Er. In Wäldern, selten. Grafschaft Glatz, Panten bei Liegnitz (Gerh.) V. L.

Homalota Mannerheim.

Hypnorum Kiesw. In der Ebene und im Vorgebirge unter Laub, ziemlich selten. Panten bei Liegnitz, Hessberge (Schwarz) V. L.

oblonga Er. Im niedern Gebirge, sehr selten. Riesen-Gebirge. V. L.

**crassicornis* Gyll. Bei Boskowitz (Kittner).

**graminicola* Grav. Bei Boskowitz. (Kittner).

longicollis Muls. Rey. In der Ebene, selten. Breslau. V. L.

rolans Scriba. Bis jetzt nur 1 Exemplar von Gerhardt bei Liegnitz gefangen. V. L.

hygrobia Thoms. An Tümpeln, unter Gerölle, ziemlich selten. Riesen-Gebirge (Gerhardt). V. L.

fluviatilis Kraatz. An Flussufern, sehr selten. Liegnitz (Gerhardt).

fragilis Kraatz. Nach Ueberschwemmungen bei Breslau gefangen. (Letzner).

carbonaria Sahlb. An sandigen Flussufern, Ratibor, Breslau. V. L.

longula Heer. Im feinen Sande der Flussufer, zuweilen häufig. Kanth, Liegnitz. V. L.

monticola Thoms. An Gebirgsflüssen, selten. Grafschaft Glatz, Riesen-Gebirge. V. L.

excellens Kraatz. In Gebirgsthälern, selten. Krumhübel, Grafschaft Glatz. V. L.

incana Er. An sumpfigen Ufern, an den Stengeln des Rohres. Breslau, Ohlau, Liegnitz. V. L.

nigella Er. Selten. Breslau, nach einer Frühjahrsüberschwemmung (Schwarz).

pilicornis Thoms. Nach Dr. Kraatz in Schlesien heimisch. V. L.

arcana Er. Altvater 1 Stück (Letzner), Liegnitz (1 Stück Gerhardt).

- debilis* Er. Breslau, Glogau, Liegnitz. V. L.
deformis Kraatz. Bei Liegnitz 2 Exemplare. (Gerhardt).
rufotestacea Kraatz. Unter Laub, sehr selten. Breslau, Liegnitz. V. L.
macella Er. An waldigen Hügeln, sehr selten. Liegnitz (Gerhardt) V. L.
luctuosa Muls. et Rey. Sehr selten. Altvater.
deplanata Grav. Selten. Altvater, Grafschaft Glatz. V. L.
gemina Er. Unter Anspülicht, sehr selten. Breslau, Liegnitz. V. L.
soror Kraatz. An Flussufern, sehr selten. Breslau. V. L.
vilis Er. Nach Ueberschwemmungen unter Gerölle, an waldigen Hügeln unter Laub, sehr selten. Breslau, Panten bei Liegnitz. V. L.
pumila Kraatz. Nach Ueberschwemmungen unter Gerölle auf feuchten Wiesen bei Breslau (Letzner), Hessberge (Gerhardt).
validiuscula Kraatz. Nur 1 Exemplar in der Grafschaft Glatz gefangen V. L.
valida Kraatz. Bei Liegnitz, sehr selten (Gerhardt).
xanthopus Thoms. Unter Mist, selten, Breslau, Glogau, Panten bei Liegnitz. V. L.
nigricornis Thoms. Im Riesengebirge, sehr selten. V. L.
autumnalis Er. Sehr selten. Liegnitz (Gerhardt).
atrata Sahlb. In Wäldern, unter Laub, selten. Breslau. V. L.
subterranea Muls. et R. Unter Laub, selten. Breslau, Glogau, Liegnitz. V. L.
atramentaria Gyll. Unter faulenden Pflanzen, Koth etc., selten. Breslau (Letzner), Riesen-Gebirge, häufig. (Gerhardt).
laevana Muls. et R. Unter Dünger selten. Breslau (Letzner).
procera Kraatz. Unter faulen Pflanzenstoffen, selten. Altvater, Liegnitz in Weiden Erde (Gerhardt) V. L.
ravilla Er. Wie der Vorhergehende, selten. Waldenburger und Riesen-Gebirge, Grafschaft Glatz, Liegnitz. V. L.
lepida Kraatz. In Pilzen, selten. Breslau. Trebnitzer Hügel. V. L.
testudinea Er. In Anspülicht bei Liegnitz. (Gerhardt).
proxima Kraatz. Altvater, selten. (Letzner).
notha Er. Selten. Altvater, Grafschaft Glatz, Reichenstein, Nimptsch, Reichenbach. V. L.
tibialis Heer. Auf Gebirgsrücken ziemlich häufig. Ratibor, Rauden. Breslau, Waldenburger Gebirge, Grafschaft Glatz. V. L.
flava Kraatz. Bei Glogau (Quedenfeldt.)

Hygronoma Erichson.

- dimidiata* Grav. Auf Schilf und Rohr, selten. Grafschaft Glatz, Liegnitz, Dyhernfurt, Breslau. V. L.

Encephalus Westwood.

complicans Westw. Ludwigsdorf in Katzbach-Gebirge (1 Exemplar Herr Seeliger) V. L.

Gyrophæna Mannerheim.

laevipennis Kraatz. An Pilzen in Wäldern des Riesen- und Iser-Gebirges, selten. Flinsberg, Schreiberhau. V. L.

Myllaena Erichson.

forticornis Kraatz. Bei Breslau. 1 Exemplar (Letzner).

Gymnusa Erichson.

brevicollis Payk. An feuchten Orten, unter Moos, Gerölle etc. Breslau, Glogau, Liegnitz. V. L.

variegata Kiesw. Unter Laub und Moos im Gebirge, sehr selten. Grafschaft Glatz (Zebe), Glatzer Schneeberg (Schwarz, von Rottenberg).

Dinopsis Matthews.

fuscata Matth. An Flüssen und Teichen, feuchten Localitäten. Manchmal häufig. Breslau, Kanth, Liegnitz, Glogau, Marienau bei Breslau (Schwarz). V. L.

Hypocypsus Mannerheim.

discoideus Heer. Unter faulendem Schilfe, auf Pflanzen. 1 Exemplar von Gerhardt bei Liegnitz. V. L.

laeviusculus Mannh. Unter Laub, Baumrinden, auf Gesträuch, Zäunen, Reisig etc. selten. Breslau, Liegnitz. Görlitz. V. L.

Trichophya Mannerheim.

pilicornis Gyll. Unter Baumrinden, Sägespänen etc., sehr selten. Grafschaft Glatz, Hirschberg. V. L.

Tachinus Gravenhorst.

proximus Kraatz. Ziemlich häufig. Altvater-Gebirge, Waldenburger und Riesen-Gebirge. V. L.

rufipennis Gyll. Bis jetzt nur auf dem Kamme des Altvater-Gebirges (Letzner).

laticollis Grav. Altvater, Grafschaft Glatz, Riesen-Gebirge, Ratibor, Breslau, Glogau. V. L.

Conosoma Kraatz.

binotatum Grav. An alten Eichen bei Breslau, sehr selten. Scheitnig (1 Exemplar Schwarz) V. L.

Bolitobius Stephens.

inclinans Grav. Am Gipfel des Hochwaldes (Schwarz).

bicolor Grav. In Pilzen am rothen Berge. (Mährisches Gesenke)
Hiller.

speciosus Er. Rother Berg in Pilzen an Stöcken.

trimaculatus Payk. Boskowitz auf Weidenschwämmen, selten. (Kittner).

Mycetoporus Mannerheim.

Märkelii Kraatz. Am Altvater bis jetzt nur 5 Exemplare gefangen.
(Letzner).

rufigicornis Kraatz. Unter Moos, Gerölle etc. ziemlich selten. Grafschaft Glatz, Waldenburger Gebirge, Liegnitz (Gerhardt), Oberrnigk. V. L.

tenuis Muls. Im Gebirge unter Moos und Gemülle, selten. Riesen-Gebirge (Gerhardt). Glatzer Schneeberg (Schwarz). Nach D. Kraatz (Naturgeschichte d. Ins. Deutschl.) in Schlesien heimisch. V. L.

longicornis Mäklin. Unter Laub und Moos, sehr selten. Grafschaft Glatz, Hessberge, Liegnitz. V. L.

Tanygnathus Erichson.

terminalis Er. An Ufern von Seen und Sümpfen, unter Gerölle etc., sehr selten. Breslau, Hessberge, (Gerhardt).

Acylophorus Nordmann.

glabricollis Grav. Unter feuchtem Moose an Rändern von Gewässern, selten. Liegnitz (Gerhardt).

Quedius Stephens.

temporalis Thoms. Unter Moos, Steinen, Rinden, in Kellern etc., häufig. Altvater-Gebirge.

unicolor Kiesw. selten. Altvater, Glatzer Schneeberg (Kraatz), Riesen-Gebirge (von Kiesenwetter).

modestus Kraatz. Grafschaft Glatz (Kraatz), Mühlgaß bei Steinau (v. Rottenberg).

marginalis Kraatz. In Wäldern, selten. Birnbäumel. V. L.

* monticola Er. Am Altvater, im Gesenke (Weise).

alpestris Heer. Unter Steinen und Moos auf den Kämmeu der Hochgebirge, häufig. Grafschaft Glatz. V. L.

scintillans Grav. Unter Moos und Steinen, sehr selten. Breslau, Liegnitz, Hirschberger Thal, Melzergrund. V. L.

chrysurus Kiesw. In hohlen Bäumen etc., sehr selten. Trebnitzer Hügel, Berchelsdorf bei Jauer. (Schwarz).

Ocypus Stephens.

* alpestris Er. Unter Steinen auf dem Leitsberge, Altvater, Peterstein, nicht selten (Weise).

Philontus Curtis.

- montivagus* Heer. Unter Moos, sehr selten. Karlsbrunn am Altvater, Grafschaft Glatz (v. Rottenberg). V. L.
- **nitidus* Fabr. Um Boskowitz, Kunstadt, selten. (Kittner).
- temporalis* Muls. Bis jetzt nur von Gerhardt gefangen. D. Kraatz in Berlin, ent. Zeitschr. 1868 p. 351.
- lepidus* Grav. var. *gilvipes* Er. Am Ufer der Flüsse. Wartha, Schweidnitz, Kanth, Liegnitz. V. L.
- frigidus* Kiesw. Eulengebirge (1 Exemplar Letzner).
- varipennis* Scriba. Bei Liegnitz. (3 Exemplare von Rottenberg.)
- exiguus* Nordm. Boskowitz, selten. (Kittner).
- trossulus* Nordm. Sehr selten. Görlitz, Münsterberg (von Bodemeyer).
- puella* Nordm. Sehr selten. Altvater, Riesen-Gebirge (Gerhardt).
- rufipennis* Grav. Am Fusse des Riesen-Gebirges, (1 Exemplar Gerhardt), Breslau (1 Exemplar von Hahn), Kunstadt, sehr selten, (Kittner)..
- signaticornis* Muls. Kunnstadt (1 Stück Kittner).

Xantholinus Serville.

- glabratus* Grav. Unter Moos, Laub, Mist etc., sehr selten. Sulau, Liegnitz, Kanth. V. L.
- relucens* Grav. Ratibor an der Oder (Roger).
- atratus* Heer. In der Ebene und im Gebirge, in Ameisennestern. Nicht häufig. Grafschaft Glatz, Bögenberge. Liegnitz, Breslau. V. L.

Leptacinus Erichson.

- linearis* Grav. An geborgenen Plätzen, selten.

Othius Stephens.

- lapidicola* Kiesw. Im Riesen-Gebirge, sehr selten. V. L.

Lathrobium Gravenhorst.

- Letzneri* Gerh. An Flussufern, ziemlich häufig. Paskau (Reitter), Kamentz, Ohlau, Breslau, Kanth, Liegnitz, Hessberge, Schweidnitz (Letzner). Berliner ent. Zeitschrift 1869, p. 257.

Elongatum, alatum, nigrum, nitidum, pubescens; ore, antennis, femoribus, tibiis, tarsis anoque colore rubro-testaceo, coleopteris liquido-rubris, basi nigris; capite, fronte verticeque sparsim punctatis; omnibus articulis antennarum longioribus quam latioribus; coleopteris thoraci longitudine quidem aequalibus, sed latioribus.

Long. 3½ lin.

- ♂ *segmento septimo in medio margine postico exsinuato.*
- boreale* Hochh. Ueberall, jedoch selten.

laevipenne Heer. An Flusssufern, sehr selten. Breslau, Liegnitz. V. L.
scutellare Nordm. An Flüssen, unter Gerölle, sehr selten. Bei Marienau. (1 Exemplar Letzner.)

terminatum Grav. Nicht selten.

sodale Kraatz. In den Bögenbergen (v. Bodemeyer).

Achenium Stephens.

humile Nicol. An Tümpeln und fließenden Wässern der Ebene, ziemlich selten. Ohlau, Breslau, Miltsch. Glogau, Schossnitz. V. L.

Doliceon Laporte.

**biguttulus* Lac. Kunstadt, Boskowitz (Kittner).

Scopaeus Erichson.

Erichsonii Kolen. In Gebirgstälern, sehr selten. Karlsbrunn am Fusse des Altvater. V. L.

pusillus Kiesw. Selten. Altvater-Gebirge, Ustron, Ober-Lausitz (Zebe).

minimus Er. Sehr selten. Grafschaft Glatz (Zebe), Flinsberg V. L.

Lithocharis Erichson.

castanea Grav. Unter Laub, Steinen etc. sehr selten. Glogau, Hirschberg (Pfeil).

ruficollis Kraatz. Unter feuchtem Laub, selten. Breslau. V. L.

Sunius Stephens.

**neglectus* Märk. Kunstadt, Boskowitz (Kittner).

Euaesthetus Gravenhorst.

laeviusculus Mannh. Unter faulenden Vegetabilien.

Stenus Latreille.

longipes Heer. An feuchten Flusssufern, selten. Breslau, Münsterberg (v. Bodemeyer). V. L.

gracilipes Kraatz. Ziemlich selten. Kl. Altvater, Glatzer Schneeberg (v. Kiesenw., Kraatz), Aupagrund (Schwarz).

longitarsis Thoms. Selten. Breslau, Trebnitzer Hügel, Liegnitz (Schwarz). V. L.

argentellus Thoms. An sandigen Ufern der Oder nicht selten. Ratibor, Grafschaft Glatz, Breslau, Ohlau. V. L.

nitidus Lac. Bei Breslau 1 Exemplar (Letzner).

incanus Er. Selten. Ustron, Grafschaft Glatz, Reichenbach. V. L.

atratus Er. Ziemlich selten. Grafschaft Glatz, Schossnitz, Liegnitz. V. L.

trivialis Kraatz. 1 Exemplar im Altvater gefangen (Letzner).

illustrator Er. 1 Exemplar bei Liegnitz gefangen (Gerhardt).

- sylvester* Er. Selten. Ohlau, Breslau, Liegnitz. V. L.
rafellus Er. Am Ufer der Oder und Ohla bei Breslau, selten. V. L.
pumilio Er. Selten. Breslau, Schossnitz bei Kanth. V. L.
bifoveolatus Gyll. Boskowitz, selten (Kittner).
foveicollis Kraatz. Kunstadt, sehr selten (Kittner).
rusticus Er. Kunstadt, sehr selten (Kittner).
picipennis Er. 1 Exemplar bei Charlottenbrunn gefangen. (Letzner).
glacialis Heer. Boskowitz an sonnigen Tagen im Februar oder März,
 noch im Schnee unter Steinen, jährlich einige Stücke von Hrn.
 Kittner erbeutet und von Hrn. Miller bestimmt. Miller und Dr. Küster
 besitzen davon einige Stücke. Wahrscheinlich ist er zu dieser Zeit
 auch an anderen Orten Mährens und Schlesiens zu finden.
paganus Er. Sehr selten. Schossnitz, Liegnitz (Gerh.).
latifrons Er. An feuchten Orten ziemlich häufig. Ustron, Breslau,
 Lissa, Liegnitz, Reichenbach. V. L.
contractus Er. Sehr selten. Breslau, Liegnitz (Gerh., Schwarz).

Bledius Stephens.

- pullipes* Grav. In Sand unter Moos, nicht immer selten. Grafschaft
 Glatz (Zebe), Waldenburger Gebirge, Liegnitz, Schossnitz. V. L.
femoralis Gyll. Am Ufer der Flüsse, selten.
erythropterus Kraatz. Im Gebirge auf den höchsten Kämmen im
 Mai und Juni an und auf dem Schnee, selten. Riesengebirge. V. L.
procerulus Er. Ziemlich selten. Altvater, Riesen-Gebirge, Breslau,
 Birnbäumel. V. L.
erraticus Er. Selten. Trebnitzer Hügel, Ohlau (v. Rottenberg).

Platystethus Mannerheim.

- alutaceus* Thoms. In Mist, selten. Breslau, Liegnitz (Schwarz).
nitens Sahlb. Sehr selten. Altvater, Breslau, Glogau, (Quedenfeldt),
 Liegnitz (Gerh.).

Oxytelus Gravenhorst.

- fulvipes* Er. Unter Laub in Wäldern, sehr selten. Altvater. V. L.
Eppelsheimii Bethé. Selten. Ufer der Weistritz bei Schossnitz
 unter Gerölle (Schwarz), Liegnitz (Schwarz), Münsterberg (nicht selten
 v. Bodemeyer).
inustus Grav. Im Mist, sehr selten. Breslau. V. L.
maritimus Thoms. Ziemlich selten. Breslau (Letzn.), Reichenstein (Schwarz).
intricatus Er. In den Bögenbergen bei Schweidnitz 1 Exemplar
 gefangen (Letzner).
transversalis Czwal. Selten. Breslau, Münsterberg (v. Bodemeyer),
 Liegnitz (Schwarz), Riesenkamm. V. L.

Anthophagus Gravenhorst.

forticornis Kiesw. Im Gebirge bis über 4500 Fuss, selten. Altvater, Glatzer Schneeberg (v. Kiesenw.), Riesen-Gebirge. V. L.

Lesteva Latreille.

monticola Kiesw. Im Gebirge an Bächen, unter Steinen etc. ziemlich selten. Weisswasser, Glatzer Schneeberg, Metzgergrund, Grenzbauden bei Schmiedeberg. V. L.

**punctata* Er. An feuchten Localitäten in der Umgebung Paskau's mehrere Stücke neuer von mir aufgefunden.

Olophrum Erichson.

alpestre Er. Im Gebirge, von etwa 3000 Fuss, bis über die höchsten Kämme, auf Moorboden, unter feuchtem Moose, Steinen etc. sehr selten. Glatzer Schneeberg (Schwarz), Riesen-Gebirge. V. L.

Orochaes Kraatz.

angustata Er. In den Monaten October, November, December und Jänner, an Zäunen und Häusern, zuweilen häufig. Liegnitz (Gerh.), Breslau, Sulau. V. L.

Arpedium Erichson.

troglydytes Kiesw. Bisher nur im Riesen-Gebirge bis 4500 Fuss, unter Steinen und im Moose selten. V. L.

brachypterum Grav. Am Altvater, sehr selten.

Endectus Redtenb.

Giraudi Redtb. In Schlesien nur von Zebe gefangen.

Omalium Kraatz.

validum Kratz. Grafschaft Glatz einige Stücke (Zebe).

ferrugineum Kraatz. Im Schnee, Riesen- und Iser-Gebirge selten. (Schwarz, v. Rottenberg).

impressum Heer. Selten. Trebnitzer Hügel, Waldenburger Gebirge. V. L.

laticolle Kraatz. Eulen-Gebirge, sehr selten. V. L.

subtile Kraatz. Bis jetzt nur bei Liegnitz gekäschert (Gerh.).

scabriusculum Kraatz. Sehr selten. Grafschaft Glatz (Zebe), Altvater (Kolenati).

elegans Kraatz. Grafschaft Glatz, sehr selten (Zebe), Wölfels-Grund (v. Rottenberg).

testaceum Er. Selten, Hessberge, Panten bei Liegnitz (Gerh.).

vile Er. Sehr selten. Waldenburger Gebirge. V. L.

brunneum Payk. Auf der Roweitza bei Ustron in einem Baumschwamm einige Stücke (Kottula).

translucidum Kraatz. Sehr selten. Hessberge im Juli (Letzner).

Anthobium Stephens.

Aucupariae Kiesw. Im Gebirge auf den Blüthen von *Sorbus aucuparia*, *Ranunculus* etc. ziemlich selten. Altvater (v. Kiesenw.), Grafschaft Glatz. Waldenburger und Katzbach-Gebirge. V. L.

anale Er. Ziemlich selten. Altvater- und Riesen-Gebirge. V. L.

puberulum Kiesw. Auf dem Riesen-Gebirge. 2 Exemplare. V. L.

torquatum Marsh. Ziemlich selten. Reichensteiner Gebirge. Bögenberge, Hessberge auf *Pruna spinosa*, Katzbach-Gebirge. V. L.

Megarthus Stephens.

nitidulus Kraatz. Selten. Grafschaft Glatz (Zebe).

affinis Miller. Unter Moos, Steinen etc. Ziemlich häufig. Altvater- und Riesen-Gebirge, Ratibor (in Pilzen, häufig). V. L.

Prognata Latreille.

quadricornis Kirby. Bei Frankenstein Abends im Fluge gefangen (Seeliger).

humeralis Germ. Unter Rinden, sehr selten. Altvater. V. L.

Pselaphidae.**Chennium** Latreille.

bituberculatum Latr. Bei Ameisen unter Steinen, Teschen, Glogau. V. L.

Trichonyx Chaudoir.

Märkelii Aub. Konskauer Wald bei *Formica congerens*. 1 Stück (Kottula).

Bryaxis Leach.

Helferi Schmidt. Auf Wiesen, im Anspülicht etc. selten. Liegnitz, Lissa, Breslau. V. L.

Schüppelii Aub. Bei Liegnitz (Gerhardt).

impressa Panz. Unter Moos, an Gräben, Flussufern etc. ziemlich selten. Lissa, Breslau, Glogau, Liegnitz (häufig Gerh.) V. L.

Bythinus Leach.

clavicornis Panz. Unter Moos bei Ratibor, sehr selten. (Kelch).

Euplectus Leach.

Erichsonii Aub. Unter Gerölle, fauligen Holztheilen etc. sehr selten. Hochwald, Heidelberg bei Göbersdorf (Schwarz).

gracilis Chaud. var. (?) von *Karstenii* Reichb. Unter Rinden, auf Wiesen bei Ameisen, selten. (Letzner).

Scydmaenidae.

Cephennium Müller.

laticolle Aub. Bei Ameisen, selten.

Silphidae.

Leptinus Müller.

testaceus Müller. Unter Gemülle, Rinde, in alten Eichen, am ausfließenden Saft der Bäume, in den Nestern der Mooshummel etc. sehr selten. Altvater, Grafschaft Glatz (Dr. Kraatz). V. L.

Choleva Latreille.

nivalis Kraatz. Unter faulenden Pflanzenstoffen, bis jetzt nur im Schnee- und Riesen-Gebirge beobachtet, selten. V. L.

strigosa Kraatz. Bei Glogau, sehr selten (Gerhardt).

brunea Sturm. Bei Glogau, sehr selten (Gerhardt).

Catops Paykull.

coracinus Kellner. Unter Laub und Steinen, selten. Altvater, Grafschaft Glatz (Zebe).

longulus Kellner. Unter Moos, sehr selten. Altvater. V. L.

varicornis Rosenh. An faulen Blätterschwämmen im Gebirge. Ostabhang der Heuscheuer (v. Rottenberg).

anisotomoides Spense. Unter faulendem Laube, selten. Breslau, Schosnitz bei Kanth, Hessberge (Schwarz). V. L.

Colon Herbst.

Viennense Herbst. Bei Kunstadt ein Stück im Fluge (Kittner).

bidentatum Sahlb. Nach Zebe heimisch in Schlesien.

clavigerum Herbst. Selten. Breslau, Trebnitzer Hügel, Liegnitz. V. L.

dentipes Sahlb. Selten. Grafschaft Glatz, Waldenburger Gebirge. V. L.

Zebei Kraatz. Selten. Altvater, Grafschaft Glatz. V. L.

rufescens Kraatz. Selten. Grafschaft Glatz. V. L.

affine Sturm. Sehr selten. Altvater, Grafschaft Glatz. V. L.; Kunstadt (Kittner).

armipes Kraatz. Auf Grasplätzen in Gebirgswäldern, selten. Grafschaft Glatz. V. L.

latum Kraatz. In waldigen Gegenden des Gebirges, auf Gras (besonders bei Sonnenuntergang), zuweilen ziemlich häufig. Altvater, Grafschaft Glatz (Zebe), Eulen-Gebirge. V. L.

Delarouzei Tourn. Von Zebe mehrfach in der Grafschaft Glatz gefangen. (Dr. Kraatz, Berlin ent. Ztsch. 1864, p. 47).

Necrophilus Illiger.

subterraneus Dahl. Nach Rendschmidt in Schlesien. (Uebers. d. Arb. d. schles. Gesellsch. 1840, p. 84).

Necrophorus Fabricius.

**vestigator* Herchel. Kunstadt, Boskowitz, selten (Kittner).

Gallicus Duv. var. von *interruptus* Steph. Nicht sehr selten. Liegnitz (Gerh.), Waldenburger Gebirge, Breslau, V. L.

Agyrtes Fröhlich.

glaber Payk. In der Grafschaft Glatz aus Moos gesiebt (Zebe).

Sphaerites Duftschmidt.

**glabratus* Fabr. Boskowitz unter einem ausfliessenden Buchenstocke, in dem vom Saft befeuchteten Laube (Kittner).

Triarthron Maerkel.

Märkelii Schmidt. Bisher nur ein Stück an einem Damme vor Weissenrode bei Liegnitz gekäschert (Gerh.), Boskowitz (Kittner).

Hydnobius Schmidt.

punctatissimus Steph. In Pilzen, sehr selten. Riesen-Gebirge. V. L.

strigosus Schmidt. Auf freien Waldplätzen, in Pilzen etc. ziemlich selten. Altvater Gebirge, Grafschaft Glatz, Riesen-Gebirge, Bögenberge. V. L.

Anisotoma Illiger.

rugosa Steph. Er. Sehr selten. Altvater, Riesen-Gebirge. V. L.

rotundata Er. Rother Berg (Weise).

Silesiaca Kraatz. Bei Gräfenberg mit dem Köscher ziemlich zahlreich gefangen (Weise).

nigrita Schmidt. Im Gebirge, sehr selten. Riesen - Gebirge (Zebe), Kynast (v. Kiesewetter).

scita Er. Sehr selten. Reichenstein, Liegnitz, Gröditzberg, Flinsberg. V. L.

Cyrtusa Erichson.

latipes Er. Auf modernden Gegenständen, in Pilzen etc. Sehr selten.

pauzilla Schmidt. Sehr selten. Friedewalde bei Breslau. V. L.

Agaricophagus Schmidt.

cephalotes Schmidt. In Pilzen auf Waldwiesen. Sehr selten. Grafschaft Glatz, Waldenburger Gebirge. V. L.

conformis Er. Auf freien Waldplätzen. Sehr selten. Grafsch. Glatz (Zebe).

Agathidium Illiger.

plagiatum Gyll. Grafschaft Glatz (Zebe).

discoideum Er. In der Grafschaft Glatz in dem Stengel eines auf einem Birkenstocke wachsenden Pilzes aufgefunden (Zebe).

haemorrhoum Er. Ziemlich häufig. Breslau, Trebnitzer Hügel, Liegnitz, Bögenberge, Hessberge. V. L.; Kunstadt (Kittner).

Clambidae.

Clambus Fischer.

pubescens Redt. Unter faulenden Pflanzen, Gerölle, Moos etc. häufig. Boskowitz, selten. (Kittner).

Comazus Fairm. et Lab.

dubius Marsh. Im Gemülle an Flüssen, und um alte Eichen am Boden. Steinau, Paskau.

Trichopterygidae.

Ptenidium Erichson.

fuscicorne Er. Unter faulenden Pflanzenstoffen, selten. Frankenstein, Freiburg, Liegnitz. V. L.

Ptilium Erichson.

fuscipenne Först. Unter faulenden Pflanzenstoffen, Strassendünger. Selten.

minutissimum Wb. et M. Unter faulen Vegetabilien, ziemlich selten.

Breslau, Herrnsstadt, Görlitz, Liegnitz. V. L.

Ptinella Matthews.

pallida Er. Unter faulenden Pflanzenstoffen, Baumrinde etc. ziemlich selten. Ratibor, Breslau, Liegnitz. V. L.

Trichopteryx Kirby.

thoracica Gillm. Ziemlich selten. Freiwaldau, Trebnitzer Hügel, Breslau. V. L.

Histeridae.

Saprinus Erichson.

arenarius Mars. Selten. Breslau, Trebnitzer Hügel, Festenberg (Lottermöser), Hirschberger Thal. V. L.

rugifrons Payk. In der Ebene an sandigen Orten, ziemlich häufig.

Breslau, Obernik, Birnbäumel, Herrnsstadt. V. L.

metallicus Herbst. Wie der Vorgehende, aber seltener. V. L.

Plegaderus Erichson.

- saucius* Er. Unter Baumrinden, in fauligem Holze etc. sehr selten. Breslau, Festenberg (Lottermoser), Grafschaft Glatz. V. L.
discisus Er. Sehr selten. Breslau, Neumarkt, Festenberg, Liegnitz (v. Rottenberg), Hessberge. V. L.

Phalacridae.

Phalacrus Paykull.

- substriatus* Gyll. Auf Blumen, Gesträuchen, unter Rinden. Ueberall.
Caricis Sturm. Selten. Grafschaft Glatz, Waldenburger Gebirge, Liegnitz, Breslau. V. L.

Nitidulariae.

Cercus Latreille.

- rufilabris* Latr. An feuchten Orten, auf Blüthen von Gräsern und namentlich Carex- und Scirpus-Arten, ziemlich selten. Altvater, Hirschberger Thal, Grafschaft Glatz, Liegnitz, Bögenberge. V. L.

Carpophilus Leach.

- sempustulatus* Fabr. Unter Baumrinden, sehr selten. Breslau, Trebnitzer Hügel, Festenberg (Lottermoser). V. L.

Epuraea Erichson.

- angustula* Er. Im Gebirge, an frisch geschlagenem Holze, selten. Altvater, Karlsbrunn, Thal der Thess. V. L.
boreella Zettst. Im höheren Gebirge, ziemlich häufig. Altvater-Gebirge, Riesen-Gebirge, Haselbach bei Schmiedeberg. V. L.
longula Er. Im Gebirge, ziemlich häufig. Altvater, Riesen- und Waldenburger Gebirge, Grafschaft Glatz, Hessberge. V. L.

Meligethes Kirby.

- **rufipes* Gyll. Auch um Teschen und am Altvater.
pumilus Er. Teschen, Paskau, selten (Reitter).
 var. *decoloratus* Först. An denselben Orten, aber seltener (Reitter).
subaeneus Sturm. Brünn, Nikolsburg, nicht besonders selten (Reitter).
coeruleovirens Först. In den Ebenen und im Gebirge bis über 4000 Fuss, ziemlich häufig (Letzner).
 **aeneus* Fabr.

var. *rubripennis* Reitt. Ueber ganz Mähren und Schlesien verbreitet, jedoch selten (Reitter).

var. *coeruleus* Marsh. Wie die Vorhergehende, weniger selten. (Reitter).

**viridescens* Fabr.

var. *Germanicus* Reitter. Paskau, sehr selten (Reitter).

var. *olivaceus* Gyll. Nach Dr. Kraatz in Schlesien.

Symphyti Heer. Ueberall auf Blüthen häufig. (Reitter).

Moraviacus Reitt. Kunststadt (Kittner).

corvinus Er. Bei Teschen im Gebirge, sehr selten (Reitter).

**subrugosus* Gyll. = *subtrigosus* Er. In Mähren, selten (Reitter).

serripes Gyll. Altvater - Gebirge (Letzner), Kunststadt (zahlreich Kittner).

Rosenhaueri Reitter. Schönberg, sehr selten (Reitter).

fibularis Er. Um Brünn, äusserst selten (Reitter).

dives Reitter. Berl. ent. Zeitsch. 1872, p. 172.

Ovalis, convexus, niger, nitidulus, obscure pubescens, dense subtiliter punctatus, antennis pedibusque anticis rufo-ferrugineis, tibis anticis sublinearibus, aequaliter denticulatis.

Mas. ventre fortiter punctato; abdominis segmento ultimo laevis, interstitiis subtilissime membranaceo-reticulatis, medio transversim impressis, apice deflexo leviter transversim bituberculato.

Long. 2mm.

Ein aus Schlesien stammendes Männchen in der Reitter'schen Sammlung.

nanus Er. Auf *Marrubium vulgare*, Paskau, selten (Reitter).

obscurus Er. Mähren, Paskau, sehr selten (Reitter).

bidens Bris. Um Brünn, selten (Reitter).

umbrosus St. Teschner Gebirge, selten (Reitter).

incanus St. In der Ebene und im Vorgebirge, Breslau, Trebnitzer Hügel (Letzner).

fuliginosus Er. Mähren selten; Schlesien zahlreicher (Gerh).

**ovatus* St. Paskau, in Blüthen von *Campanula* nicht besonders selten (Reitter).

brachialis Er. Teschen, selten, Brünn, weniger selten (Reitter).

picipes St. Ueberall häufig (Reitter).

moestus Er. Süd-Mähren, sehr selten (Reitter).

flavipes St. Brünn, Paskau, selten (Reitter).

memnonius Er. Paskau, selten (Reitter).

**ochropus* St. Teschen, Paskau, ziemlich häufig (Reitter).

brunnicornis St. Auf den Abhängen des Altvater Gebirges (Letzner).
Dieckii Reitt. Teschen, sehr selten (Reitter).

difficilis Heer. Altvater, Gräfenberg (Letzner).

var. *Kunzei* Er. Ebenda. Teschen, Paskau, selten.

blandulus Reitter n. sp. Berl. ent. Zeitsch. 1872, p. 130.

Ovalis, leviter convexus, rufo-fuscus, nitidus, prathorace brevissimo, subtilissime parciusque griseo-pubescent, dense subtilissime elytris parcius fortiusque punctatis, interstitiis punctorum laevibus, antennis pedibusque rufis, tibiis anticis subtiliter crenatis, apice acute denticulatis.

Long. 1·8—2mm.

Bei Brünn, sehr selten.

viduatus St. Ueberall sehr häufig.

**pedicularius* Gyll. In Mähren und Schlesien nicht selten (Reitter).

Lepidii Miller. Liegnitz. 1 Exemplar (Gerhardt).

tristis St. In der Ebene und dem Gebirge, allgemein verbreitet.

murinus Er. Altvater Gebirge, Paskau.

var. *planiusculus* Heer. Paskau, selten (Reitter).

lugubris St. Ustron, Altvater-Gebirge (Letzner).

gagathinus Er. Wie der Vorhergehende, jedoch viel seltener.

egenus Er. Allgemein verbreitet und ziemlich häufig (Reitter).

bidentatus Bris. Schlesien (Fuchs) Paskau, ziemlich selten (Reitter).

erythropus Gyllh. Häufig.

exilis St. Paskau, preuss. Schlesien, selten.

solidus Kugel. (Subgen. *Acanthogethes* Reitter). Im südlichen Mähren, sehr selten (Reitter).

Rhicophagus Herbst.

grandis Gyll. In Gebirgswäldern an Fichtenstämmen im zeitigen Frühjahr, an frisch geschlagenem Holze etc. selten. Altvater, Grafschaft Glatz. V. L.

Colydiidae.

Synchita Hellwig.

Mediolanensis Redtb. Unter Rinden, auf Blüten, selten.

Aulonium Erichson.

sulcatum Ol. Unter der Rinde abgestorbener Laubbäume ziemlich selten. Breslau, Sulau. V. L.

bicolor Herbst. Unter Rinden von Laubbäumen. Sehr selten.

Pycnomerus Erichson.

terebrans Ol. In alten Eichen, sehr selten. Breslau, Gorzalkowitz bei Pless (in Eichenmulm, v. Rottenberg).

Cucujidae.

Cucujus Fabricius.

sanguinolentus Linn. Unter Eichenrinde, sehr selten; Breslau, Ohlau. V. L.

Laemophloeus Erichson.

testaceus Fabr. Unter Rinden von Laubbäumen, selten. Friedeberg in österr. Schlesien, Trebnitzer Hügel, Breslau, (häufig in Mehl. Schilling).

pusillus Schh. In Reiss und anderen Pflanzenwaaren in den Magazinen der Materialisten, zuweilen ziemlich häufig (Letzner).

Psammoechus Latreille.

bipunctatus Fabr. In der Ebene und im niedern Gebirge, auf nassen Wiesen, an Gewässern, an Rohr etc. selten. Grafschaft Glatz, Ohlau. Breslau, Trebnitzer Hügel, Liegnitz, Reichenbach, Reindörfel bei Münsterberg (Letzner).

Phloeostichus Redtenbacher.

denticollis Redt. Im Gebirge unter Ahornrinde, selten. Volpersdorf, Heuscheuer, Schneeberg, Bögenberge (Rupp, Letzner).

Monotoma Herbst.

brevipennis Kunze. An Strassendünger in einer Vorstadt Breslau's, selten (Letzner).

Cryptophagidae.

Telmatophilus Heer.

brevicollis Aub. Selten.

Cryptophagus Herbst.

Schmidtii Sturm. Grafschaft Glatz, Waldenburger Gebirge, Breslau, Liegnitz. V. L.

Baldensis Er. Im Gebirge bis 3500 Fuss, selten. Riesen-Gebirge, Waldenburger Gebirge, Grafschaft Glatz (Letzner).

fuscicornis Sturm. In alten Wespennestern, in Kellern an Weinfässern, selten. Grafschaft Glatz, Breslau, Bögenberge. V. L.

subdepressus Gyll. In altem Holze, selten.

pini Panz. In Kellern, an schimmeligen Weinfässern, selten. Breslau (Letzner).

Paramecosoma Curtis.

serratum Gyll. Auf Weidenblüthen, sehr selten. Breslau (Letzner).

Atomaria Stephens.

diluta Er. Unter Dünger, sehr selten. Bögenberge (Letzner).

bicolor Er. sehr selten. Liegnitz, Reichenbach, Glatz (v. Rottenberg).

pulchella Heer. Nach Gerhardt (Quedenfeldt) bei Glogau.

basalis Er. Wie die Vorhergehende.

cognata Er. Selten. Grafschaft Glatz, Waldenburger Gebirge, Breslau (Letzner).

versicolor Er. In der Nähe von Strassendünger, sehr selten. Breslau (Letzner).

Lathridiidae.

Lathridius Illiger.

constrictus Gyll. Sehr selten, Zopten-Gebirge (Letzner).

liliputanus Mannh. Unter Rinden, Holzverkleidungen an Gebäuden etc. in den Ebenen und im Gebirge bis gegen 4000 Fuss, zuweilen ziemlich häufig. Liegnitz. Waldenburger und Riesen-Gebirge. V. L.

planatus Mannh. Ziemlich selten. Altvater-Gebirge, Festenberg (Lottermoser), Breslau. V. L.

carbonarius Mannh. Selten. Breslau, Liegnitz (Letzner).

filiformis Gyll. An mit Schimmel bedeckten Wänden zuweilen häufig. Breslau, Militsch, Glogau, Liegnitz, Reichenbach. V. L.

Corticaria Illiger.

denticulata Gyll. Selten. Altvater, Grafschaft Glatz, Riesen-Gebirge. V. L.

badia Mannh. Unter Laub, in faulem Holze etc. selten. Breslau, Liegnitz. V. L.

linearis Payk. In Gebäuden, sehr selten, Lüben (Gerhardt).

foveola Bech. Selten. Altvater-Gebirge, Grafschaft Glatz, Liegnitz (auf *Carduus acanthoides*). V. L.

ferruginea Marsh. In Gebäuden, an Mauern, Fenstern etc. sehr selten, Liegnitz. V. L.

similata Gyll. Kunstadt, sehr selten (Kittner).

Dermeestidae.

Dermeestes Linné.

- atomarius* Er. An todtten kleinen Thieren, selten. Ohlau, Breslau, Trebnitzer Hügel, Schossnitz, Liegnitz. V. L.
tesselatus Fabr. An Häuten und thierischen Stoffen, sehr selten. Breslau, Liegnitz, Trebnitz. V. L.
bicolor Fabr. Ziemlich selten. Ohlau, Breslau, Liegnitz, Goldberg, Schweidnitz, Münsterberg. V. L.

Hadrotoma Erichson.

- corticalis* Eichhoff. Unter der Rinde von Kiefern, Ahorn, selten. Breslau, Pantener Höhen (im März, Schwarz) Mühlgaſt bei Randten (v. Rottenberg).
nigripes Fabr. Boskowitz, selten (Kittner).

Trogoderma Latreille.

- nigrum* Herbst. Auf Blüthen, sehr selten Mahlen bei Breslau, Festenberg (Lottermoser), Trebnitz. V. L.

Byrrhidae.

Syncalypta Dillnyn.

- paleata* Er. An Fluſſufern, unter Steinen, in Moos, Anſpülicht etc. sehr selten. Waldenburg, am Altvater, Münsterberg (v. Bodemeyer), Liegnitz (Gerhardt).

Curimus Erichson.

- hispidus* Er. An mit Moos bewachsenen Bächen, selten. Grafschaft Glatz (Zebe).

Simplocaria Marsham.

- metallica* St. Bis jetzt nur in 2 Exemplaren am kleinen Teiche von Gerhardt in Moos gefangen.
maculosa Er. Unter Moos, ziemlich selten. Altvater und Waldenburger Gebirge, Breslau. V. L.

Limnichus Latreille.

- pygmaeus* St. An sandigen Fluſſufern, vorzüglich der Ebene, sehr selten. Breslau, Festenberg (Lottermoser), Grafschaft Glatz (Zebe).

Georyssidae.

Georyssus Latreille.

laesicollis Germ. Bei Nieder-Langenau (Dr. Scholz, Uebs. d. Arb. d. schl. Ges. 1842 p. 173.

Parnidae.

Parnus Fabricius.

griseus Er. Selten. Breslau, Trebnitzer Hügel, Liegnitz. V. L.

luridus Er. Selten. Reichenbach, Jauer, Hirschberger Thal. V. L.

Pomatinus Sturm.

Dryops Leach.

substriatus Müll. In den Bächen des Vorgebirges, sehr selten. Reindörfel bei Münsterberg (2 St. v. Bodemeyer).

Potamophilus Germar.

acuminatus Fabr. An den Ufern der Oder, sehr selten. (Bei Breslau schon vor 1808 von Schummel gefangen.) V. L.

Elmis Latreille.

Kirschii Müll. in litt. Ziemlich häufig. (Letzner).

obscurus Müll. In den kleinen Bächen des Vorgebirges, an überfluthetem Moose etc. selten. Anhänge des Eulen-Geb. Bögenberge, Hessberge, Kauffung, Schreiberhau, Zackenfall. (V. L.)

* *Volkmari* Panz. Altvater, Thal der Biela und Oppa (Letzner).

opacus Müll. Sehr selten. Flinsberg, Hirschberger Thal, Liegnitz und Goldberg. V. L.

paralelopipedus Müll. Selten. Nieder-Langenau, oberes Weistritzthal, Hessberge, Liegnitz, Hirschberger Thal. V. L.

subviolaceus Müll. In Gebirgsbächen, selten. Altvater-Geb. Grafsch. Glatz (Letzner).

Heteroceridae.

Heterocerus Fabricius.

femoralis Kiesw. Im feuchten Sande der Flussufer, sehr selten. Alte Oder bei Breslau (Schwarz).

Lucanidae.

Aesalus Fabricius.

scarabaeoides Panz. In der Ebene in faulem Holze der Eichen und anderer Laubbäume, jetzt sehr selten. Breslau, Ohlau, Brieg, Birnbäumel. V. L.

Scarabaeidae.

Aphodius Illiger.

- scrutator* Herbst, In Kuh- und Pferdemit, sehr selten in den südlichen Gegenden von Schlesien. Grafsch. Glatz (im Sept. Zebe).
piceus Gyll. Altvater (2 St. Weise).
putridus St. Selten. Weigel'sches Verz. (v. Stillfried) Breslau. (Letzner).
Hydrochaeris Fabr. Sehr selten, Herrnsstadt (Letzner).
alpinus Scop. Nach Kolenati auf dem Altvater (Wiener ent. Ztschr. IV. p. 382).
var. rubens Muls. Wie der Vorhergehende.
lividus Ol. In Pferdemit ziemlich selten. Breslau, Dyhernfurt, Herrnsstadt, Neumarkt, Kanth. (V. L.)
conspurcatus Linn. Selten. Birnbäumel, Trebnitzer Hügel, Breslau (Schummel). Dyhernfurt, Görlitz. (V. L.)
tessulatus Payk. Sehr selten. Riesen-Geb., Trachenberg (v. Rottenberg).
maculatus St. Abhang des Leiterberges nach Gabel hin, selten (Weise).
porcus Fabr. Selten. Breslau, Trebnitzer Hügel, Neumarkt, Glogau, Liegnitz. (V. L.)
biguttatus Germ. Sehr selten, Oderberg (Letzner).
contaminatus Herbst. Von Letzner 2 Ex. bei Herrnsstadt gefangen.
villosus Gyll. Trebnitzer Hügel, Költzchenberg (aus Kiefern.) V. L.

Ochodacus Lepeletier et Serville.

- chrysomelinus* Fabr. Gegen Sonnenuntergang über Grasflächen umherfliegend, sehr selten. Breslau. Herrnsstadt, Glogau. V. L.

Trox Fabricius.

- cadaverinus* Ill. Sehr selten in Wäldern. Festenberg (Lottermoser), Münsterberg (v. Bodemeyer).

Melolontha Fabricius.

- pectoralis* Germ. Seltener als vulgaris.

Cetonia Fabricius.

- *viridis* Fabr. Nikolsburg (Kittner).

Buprestidae.

Dicerca Eschscholtz.

- moesta* Fabr. Grafsch. Glatz, sehr selten, (Rendschmidt).

Poeilonota Eschscholtz.

decipiens Mannerh. In alten Linden selten.

Melanophila Eschscholtz.

decostigma Fabr. Bis jetzt nur in den Kiefernwaldungen bei Birnbäumel (Letzner).

Anthaxia Eschscholtz.

pratricula Laferté. In den Nadelwäldern der rechten Oderseite, sehr selten. Birnbäumel. (Letzner).

Ptosima Solier.

flavoguttata Ill. Im Kottwitzer Walde in mehreren Exempl. gefangen (Schummel, Letzner).

Coraeus Laporte.

undatus Fabr. Auf Eichen, sehr selten. Trebnitzer Hügel, bei Breslau. V. L.

Agrilus Solier.

betuleti Ratzeb. Auf jungen Birken, sehr selten. Liegnitz, Neumarkt. V. L.

laticornis Ill. Auf Eichengesträuch ziemlich selten. Ohlau, Breslau, Trebnitzer Hügel. V. L.

hastulifer Ratzeb. Im Thale der Oppa ein Männchen von Letzner gefangen.

graminis Lap. Sehr selten. Altvater, Ustron.

rugicollis Ratzeb. Bei Liegnitz sehr selten (Gerhardt).

Trachys Fabricius.

pumilus Ill. Selten. Breslau, Kanth, Trebnitzer Hügel (Letzner).

Aphanisticus Latreille.

emarginatus Fabr. In der Nähe der Flüsse, an feuchten Stellen auf Pflanzenblättern, Grafschaft Glatz, Breslau, Dyhernfurt, Kanth, Liegnitz V. L.

Eucnemidae.

Tharops Laporte.

melasoides Lap. Unter Buchenrinde, nach Zebe bei Neustadt in Oberschlesien.

Elateridae.

Cryptohypnus Eschscholtz.

maritimus Curt. Teschen an der Olsa im Sande 2 St. (Kotula).

gracilis Muls. In den Beskiden 2 Exemplare (Letzner).
riparius Fabr. An den Gebirgsbächen unter Steinen etc. nicht selten.
Altvater-, Schnee-, Riesen- und Waldenburger Geb. V. L.

Cardiophorus Eschscholtz.

discicollis Herbst. In den Süd-Abhängen des Altvater-Gebirges, sehr selten (Letzner).

Athous Eschscholtz.

**rufus* de Geer. Boskowitz, sehr selten (Kittner).
mutilatus Rosenh. In hohlen Linden, Kastanien, Rüstern und anderen Laubbäumen, sehr selten. Strehlen, Liegnitz, Breslau (v. Hahn.) V. L.

Corymbites Latreille.

serraticornis Payk. Im niederen Gebirge auf Blüthen (*Sorbus Spira*) sehr selten. Altvater-, Waldenburger- und Riesen-Geb. V. L.
cinctus Panz. Sehr selten. Trebnitzer Hügel, Glogau Liegnitz (v. Rotenberg); Wilkendorf, südlicher Abhang des Gesenkes (Weise).

Agriotes Eschscholtz.

pallidulus Ill. Kunststadt, sehr selten (Kittner).

Sericosomus Redtenbacher.

subaeneus Redtenb. In den Gebirgsthälern bis über 3500', auf Dolden etc. ziemlich selten, das ♀ sehr selten Altvater-Geb., Grafsch. Glatz, Waldenburger-, Iser- und Riesen-Geb. V. L.

Adrastus Eschscholtz.

lateralis Er. Auf feuchten Grasplätzen, ziemlich häufig. Altvater, Ustron.

Dascillidae.

Cyphon Paykull.

nitidulus Thoms. Ueberall häufig.
pallidulus Boh. Selten. Mahlen bei Breslau, Hessberge, Fuss des Eulen-Geb. V. L.

Eucinetus Germar.

haemorrhoidalis Germ. In *Bolyporus*-Arten, nach Ueberschwemmungen unter Gerölle, Steinen etc. ziemlich selten. Althammer, Brieg, Breslau, Trachenberg, Dyhernfurt, Glogau, Panten bei Liegnitz, Schossnitz, Nimptsch. V. L.

Malacodermata.

Cantharis Linné.

* *Erichsonii* Bach. Bei Setzdorf (Johannisberg) sehr häufig (Weise).
paludosa Fall. Auf Blüthen an sumpfigen Stellen (*Hieracium paludosum*) häufig. Altvater-Geb. Grafsch. Glatz, Eulen-, Waldenburger- und Riesen-Gebirge, Bögenberge, Hessberge, Katzbach- und Iser-Gebirge. V. L.

prolixa Märk. Rother Berg im Gesenke (Weise).

Rhagonycha Eschscholtz.

limbata Thoms. Ueberall, besonders in der Ebene häufig. V. L.

Malthinus Latreille.

frontalis Marsh. Selten. Ohlau, Trebnitzer Hügel, Geiersberg, Hessberge, Riesen-Geb. V. L.

Malthodes Kiesenwetter.

mysticus Kiesw. Selten. Altvater, Grafsch. Glatz, Trebnitz. V. L.

trifurcatus Kiesw. Kunstadt, sehr selten (Kittner).

spretus Kiesw. Im Gebirge, selten, Beskiden, Altvater-Geb. Grafsch. Glatz. V. L.

* *hexacanthus* Kiesw. Boskowitz, sehr selten (Kittner), Freiwaldau (Letzner).

brachypterus Kiesw. Auf niedern Pflanzen, Gräsern etc. nicht selten. Panten bei Liegnitz (Gehrh.), Hessberge. (V. L.)

Malachius Fabricius.

spinosus Er. Am Rände von Gewässern, selten. Herrnsstadt, Wohlau, Liegnitz, Hirschberg (Pfeil) V. L.

Anthocomus Erichson.

sanguinolentus Fabr. In Gärten, Promenaden etc. sehr selten. Trebnitzer Hügel, Breslau, Liegnitz, Glogau, Grafsch. Glatz. V. L.

Attalus Erichson.

coarctatus Er. Boskowitz, sehr selten (Kittner).

analisis Panz. Auf jungen Fichten, Eichensträuchern etc. ziemlich selten. Bögenberge, Buchwald bei Schmiedeberg, Hirschberg (Gerhardt). V. L.

Cardiacae Linn. Nach Kiesenwetter in Schlesien heimisch. Naturg. d. Ins. Deutschl. IV. p. 601.

Ebaeus Erichson.

coerulesens Er. Sehr selten. Altvater-Geb., Grafsch. Glatz. V. L.

appendiculatus Er. Grafsch. Glatz (nach Zebe selten, nach v. Rottenberg auf Gesträuch und Blüthen nicht selten).

Dasytes Paykull.

aerosus Kiesw. Auf Blüthen, selten. Troppau.

subaeneus Schh. Nach Letzner bis jetzt nur im Herzogthum Teschen beobachtet.

aeneiventris Küst. Boskowitz, selten (Kittner) von Hrn. Miller bestimmt.)

Haploenemus Steph.

pinicola Kiesw. Von Pfeil in 2 St. im Riesen-Geb. gefangen. Berl. ent. Ztsch. 1865 p. 223.

Julistus Kiesenwetter.

memnonius Kiesw. Auf Tannen, sehr selten. Glogau (Pfeil).

fulvohirtus Bris. Auf Tannen, sehr selten. Bögenberge. V. L.

Danacaea Laporte.

nigritarsis Küst. Auf Rubus Idaeus. Troppau, Ratibor.

morosa Kiesw. Auf Blüthen. Altvater (in grösserer Anzahl von Letzner gesammelt). Ratibor (Roger).

Cleridae.

Clerus Leoffroy.

rufipes Brahm. Von Zebe 2 St. im Februar 1852 unter Ahornrinde in der Grafsch. Glatz gefangen (Synopsis).

substriatus Gebl. An Nadelhölzern, selten. Altvater-Gebirge, Grafsch. Glatz. V. L.

quadrinaculatus Schaller. Sehr selten. Trebnitzer Hügel, Pantener Höhen, Bögenberge, Hessberge, (Schwarz). V. L.

Trichodes Herbst.

alvearius Fabr. Auf Blüthen (Crataegus, Dancus, Achillea) ziemlich häufig. Johannisberg, Bögenberge, Hessberge, Pantener Höhen, Trebnitzer Hügel. V. L.

Laricobius Rosenhauer.

Erichsonii Roch. Auf Lärchen (Pinus Larix), selten. Altvater-Geb., Grafsch. Glatz, am Kunitzer See bei Liegnitz. V. L.

Ptinidae.

Hedobia Sturm.

regalis Duftschm. Selten.

Ptinus Linné.

bicinctus Sturm. In Gebüsch, unter der Rinde der Bäume etc. sehr selten. Breslau, Dyhernfurt, Liegnitz, Bögenberge. V. L.

brunneus Duftschm. In Gebäuden, sehr selten, Breslau, Trebnitzer Hügel. V. L.

Anobiidae.

Ernobius Thomson.

abietinus Gyllh. Auf Kiefern und Fichten, sehr selten, Boskowitz (Kittner).

angusticollis Ratzeb. An Nadelhölzern, selten. Altvater-Geb., Grafsch. Glatz, Hessberge. V. L.

longicornis Sturm. Auf Kiefern, selten, Birnbäumel, Trebnitzer Hügel, Panten bei Liegnitz. V. L.

Amphibolus Mulsant et R.

striatellus Bris. Auf den Hessbergen an Tannen, sehr selten. (Gerhardt).

Gastrallus du Val.

sericatus Lap. An Tannen und Fichten sehr selten. Altvater-Geb. (Letzner).

Xyletinus Latr.

laticollis Duft. Boskowitz, selten (Kittner).

Lasioderma Stephens.

serricorne Fabr. In Gebäuden, in überseeischen Cigarren und Rollentabak, in der Wurzel echt chinesischer Rhabarber etc. (Letzner).

Cis Latreille.

laminatus Mellié. In Schwämmen, selten. Obernigk, Birnbäumel bei Sulau. (Letzner).

bidentatus Ol. In Schwämmen, an Nadel- und Laubbäumen, in der Ebene und im Gebirge, ziemlich häufig. Altvater-Geb., Grafsch. Glatz, Waldenburger Geb. V. L.

castaneus Mellié. In Schwämmen, in Gebirgswaldungen, sehr selten. Altvater-Geb. (Letzner).

laricinus Mellié. Wie der Vorhergehende, ziemlich selten. Ustron, Altvater-Geb. (Letzner).

Tenebrionidae.

Opatrum Fabricius.

Viennense Duftschm. Nikolsburg (Kittner).

Hypophloeus Hellw.

**rufulus* Rosenh. Kunstadt, selten (Kittner).

linearis Fabr. Unter der Rinde trockener Kieferzweige, sehr selten.
Trebnitzer Hügel, Neumarkt. (Letzner).

Alphitobius Stephens.

diaperinus Panz. In Feigen, wahrheinlich aus dem Süden eingeführt.

Tenebrio Linné.

opacus Duft. Im Moder alter Bäume, Balken etc. sehr selten. Troppau.

Menephilus Mulsant.

curvipes Fabr. Unter der Rinde alter Eichen bei Breslau (Schummel).

Cistelidae.

Cistela Fabricius.

serrata Chevrol. Auf Blüthen, sehr selten, Liegnitz, Wohlau, Glogau. V. L.

semiflava Küst. In jungen Hauen bei Panten auf blühenden Gräsern (Köhleria cristata) (Gerhardt).

Cteniopus Solier.

sulphuripes Germ. Im Juni 1868 um Nikolsburg häufig mit dem Schöpfer gefangen (Kittner).

Pythidae.

Pytho Fabricius.

depressus Linn. Unter der Rinde alter Nadelhölzer, selten. Altwater-Geb., Rauden, Grafsch. Glatz. Waldenburger Geb., Brieg, Breslau. V. L.

Salpingus Illiger.

mutilatus Beck. Unter der Rinde von Fichten- und Kienholz, sehr selten. Riesen-Geb. V. L.

Lissodema Curtis.

cursor Gyll. Unter der Rinde von Eichensträuchern am Geiersberg, sehr selten (Letzner), Panten bei Liegnitz (Schwarz).

Rhinosimus Latreille.

viridipennis Latr. Unter Rinden. Boskowitz, selten. (Kittner).

aeneus Oliv. Unter Rinden von Bäumen und Sträuchern. Boskowitz, selten (Kittner).

Melandryidae.

Orchesia Latreille.

laticollis Redt. In Buchenschwämmen, selten. Altvater, (Letzner).

Hypulus Paykull.

quercinus Payk. In dem morschen Holze der Laubbäume, sehr selten.
Oberschlesien, Jauersberg (Rendschmidt).

Melandrya Fabricius.

flavicornis Duftschm. Rother Berg (Gesenke). (Dr. Thieme).

Pedilidae.

Xylophilus Latreille.

**nigrinus* Grm. Kunstadt, sehr selten (Kittner).

Anthicidae.

Anthicus Paykull.

bimaculatus Ill. Im Sande am Oderufer bei Glogau. (Quedenfeldt).

gracilis Panz. Unter Gerölle, an Gewässern, selten, Schossnitz bei
Kanth, Liegnitz. V. L.

nectarinus Panz. An trockenen, grasigen Stellen, selten. Ohlau, Bres-
lau, Trebnitzer Hügel. V. L.

Mordellonae.

Mordella Linné.

villosa Schrank. Sehr selten, Johannisberg, Grafsch. Glatz. (Letzner).

Mordellistena Costa.

brevicauda Boh. Auf Blüten und Blättern häufig. Ustron, Altvater-
Gebirge, Ratibor, Grafsch. Glatz (Letzner).

stenidia Muls. Auf Blüten häufig. Teschen.

Artemisiae Muls. Bis jetzt nur 2 Exempl. von Letzner in *Artemisia*
campestris gefangen.

parvula Gyll. Auf Blüten, an Dämmen, häufig. Rauden, Rattibor,
Kupp, Ohlau, Breslau, Kanth, Glogau (Letzner).

Anaspis Geoffroy.

phalerata Germ. Auf Bäumen und Gesträuch, selten. Grafsch. Glatz,
Hessberge, Hirschberger Thal. V. L.

Meloidae.

Meloë Linne.

**decora* Brandt. Freistadt 1 St. (Kotula).

Epicauta Redtenbacher.

**verticalis*. Ill. In den Weinbergen bei Nikolsburg. (Kittner).

Stenoria Mulsant.

analis Schaum.

var. adusta Schaum. In Schlesien (Cat. Col. Harold & Gemminger p. 2162).

Oedemeridae.

Nacerdes Schmidt.

melanura Linn. Auf Blüthen sehr selten. Ustron, Waldwiesen bei Ohlau, Trachenberg. V. L.

Oedemera Olivier.

tristis Schmidt. Auf Blüthen, ziemlich selten. Beskiden, Altvater- und Riesen-Gebirge. (Letzner).

annulata Germ. Im Gebirge auf Blüthen, sehr selten. Grafschaft Glatz. (Zebe).

Curculiones.

Otiorhynchus Germar.

inflatus Gyllh. S. Teschen in der Grabina auf *Arsium obracium* im jungen Fichtendickicht. Im September 1869 in Menge. (Kotula).

**Perdix* Germ. Boskowitz, im Frühjahr den Obstbäumen schädlich. (Kittner).

monticola Germ. Nur auf den höchsten Kämmen der Sudeten unter Steinen, isländischem Moos, unter Gras etc. häufig. Altvater-Gebirge, Glatzer Schneeberg, Riesen-Geb. V. L.

sulcatus Fabr. In Gärten, auf den Blättern des Weinstocks etc. ziemlich häufig. Die Larve lebt an den Wurzeln verschiedener Gartenpflanzen. Ohlau, Breslau, Trebnitz, Glogau, Schweidnitz (Letzner).

**aerifer* Germ. Teschen in der Grabina, wie *inflatus* (Kotula).

var. regularis Stierl. Teschen in der Grabina zahlreich aufgefunden. (Kotula).

Kolari Germ. Elgot (Kotula, Heczko).

pinastri. Herbst. Kunststadt, selten. (Kittner).

**gibbicollis* Boh. Kunststadt selten. (Kittner).

Peritelus Germar.

hirticornis, Herbst. Am rothen Berge mit dem Siebe. (Weise).

Omius Schönherr.

mollinus Boh. S. Unter Gras ziemlich häufig. Altvater- und Riesen-Gebirge. Grafsch. Glatz. (Letzner).

Barypeithes du Val.

virguncula Seidl. In Adamsthal bei Brünn von Dr. Hampe gesammelt.

mollicornis Ahr. Sehr selten. Breslau, Waldenburg. (Letzner).

Platytarsus Schönherr.

setiger Gyllh. Auf Gräsern etc. ziemlich selten. Liegnitz. V. L.

Trachyploeus Germar.

digitalis Gyllh. An Flussufern, selten.

Phyllobius Schönherr.

acuminatus Boh. S. Im Gebirge, ziemlich selten. Ustron, Altvater, Grafsch. Glatz. (Letzner).

virens Boh. S. Wie die Vorhergehende, aber seltener.

cinereus Gyllh. S. Auf Grasplätzen, Rainen, an Zäunen etc. bisweilen häufig. Breslau, Neumarkt, Glogau, Alt-Beckern bei Liegnitz, Jauer, Schweidnitz. V. L.

scutellaris Redt. Im Gebirge, zuweilen ziemlich häufig. Ustron, Altvater (Letzner).

var. *xanthocnemus* Kiesw. Wie der Vorhergehende.

**viridicollis* Fabr. Auf der Rownika bei Ustron auf Pappelsträuchern, sehr häufig. (Kotula).

Tropiphorus Schönherr.

carinatus Müll. Boskowitz sehr selten. (Kittner).

Liophloeus Germar.

aquisgranensis Förster. In Gebüsch, Wald, unter Steinen etc. selten. V. L.

gibbus Boh. S. Nach Zebe in der Grafsch. Glatz nicht selten.

Strophosomus Billberg.

hirtus Schönh. Bei Ratibor unter Laub, Moos etc. sehr selten. (Kelch).

Sciaphilus Schönherr.

afflatus Boh. S. Bei Troppau (Dr. Kraatz Berl. ent. Z. 1868 p. 297).

ninguidus Grm. An Dämmen etc. ziemlich selten. Trebnitzer Hügel, Liegnitz, Grafsch. Glatz, Langenbielau. V. L.

Sitones Schönherr.

suturalis Steph.

var. *elegans* Gyllh. S. Verbreitet, jedoch ziemlich selten. V. L.

Waterhousei Walton. Selten. Breslau, Trebnitzer Hügel, Liegnitz, Wahlstadt, Abhänge des Waldenburger und Eulen-Gebirges. V. L.

Cambricus Steph. An Flussufern, nach Ueberschwemmungen etc. sehr selten. Rauden, Breslau, Liegnitz. V. L.

Polydrosus Germar.

fulvicornis Fabr. Im niederen Gebirge, selten. Teschen, Altvater-Gebirge. (Letzner).

impressifrons Gyllh. S. Auf jungem Laubholz, ziemlich häufig. Altvater, Ratibor (auf Weiden, Kelch), Grafsch. Glatz, Waldenburger und Zopten-Geb., Glogau. V. L.

pterygomalis Boh. S. Im Vorgebirge und niederen Gebirge, ziemlich selten. Ustron, Altvater-Geb., Grafsch. Glatz, Bögenberge, Liegnitz. V. L.

flavovirens Gyllh. S. Ziemlich selten. V. L.

binotatus Thoms. Auf *Fagus sylvatica* und anderem Laubholz, häufig, Salzgrund, Salzbrunn, Bögenberge. V. L.

Orthochaetes Germar.

*setiger Germ. Boskowitz, höchst selten, (Kittner).

Molytes Schönherr.

Germanus Linn.

var. *carinaerostris* Gyllh. S. Vom Fusse der Vorberge bis auf die Kämme (über 4000') auf den Blättern von *Petasites albus* und *Adenostylium albifrons* häufig, Altvater-Geb., Katscher, Grafschaft Glatz, Frankenstein, hohe Eule, Steinkunzendorf, Bögenberge, Liegnitz, Iser- und Riesen-Geb. V. L.

Illyricus Gyllh. S. Nach Zebe einmal in der Grafsch. Glaz auf einer Wiese im Gemülle im Monat Oktober gefangen. V. L.

Plinthus Germar.

anceps Boh. S. Auf dem Kamme des Riesen-Geb. selten. Grenzbauden. (Letzner).

Hypera Germar.

intermedia Boh. S. Im Vorgebirge und Gebirge, ziemlich selten. Hessberge, Liegnitz, Riesen-Geb. Larve auf *Achillea millefolium*. V. L.

elegans Boh. S. 2 Exempl. auf einer feuchten Wiese des Riesenkammes (Märkel, Stett. ent. Z. VIII. 83).

contaminata Herbst. Boskowitz, selten. (Kittner).

fasciculata Herbst. Selten. Grafsch. Glatz, Trebnitzer Hügel, Panten bei Liegnitz, bei Hainau, Glogau. V. L.

elongata Payk. Ziemlich häufig im Gebirge. Ratibor, Grafsch. Glatz, Trebnitzer Hügel, Zopten-Geb., Waldenburger Geb., Hirschberger Thal, Liegnitz, Glogau. V. L.

histrion Boh. S. Im niedern Gebirge und in der Ebene, selten. Ustron, Altvater-Geb., Freiwaldau. (Letzner).

Viciae Gyllh. S. In der Ebene und im Vorgebirge auf Wiesen, ziemlich selten. Altvater-Geb., Ratibor, Waldenburger Gebirge, Hirschberger Thal. (Letzner).

plagiata Redt. In der Ebene und im Vorgebirge, sehr selten. Oderberg, Breslau, Glogau, Schweidnitz, Zopten. V. L.

Cleonus Schönherr.

grammicus Panz. Nicolsburg. (Kittner).

nebulosus Linn. In der Ebene, auf Kiefern und Papeln, sehr selten

Bei Krascheow nicht selten. (Kelch). V. L.

**punctiventris* Germ. Nikolsburg. (Kittner).

**albidus* Fabr. Nikolsburg (Kittner).

varius Herbst. Bis jetzt nur ein Exemplar bei Glogau. (Quedenfeldt).

Larinus Germar.

senilis Fabr. Auf *Carlina acaulis*, sehr selten. Trebnitzer Hügel. V. L.

Lixus Fabricius.

rufulus Boh. S. In der Ebene und im Hügellande, auf sonnigen Rainen, an Distel-Arten, zuweilen ziemlich häufig. Freiburg, Striegau, Jauer, Liegnitz. V. L.

Pissodes Germar.

Pini Linn. Boskowitz. Kunstadt, nicht selten. (Kittner).

piniphilus Herbst. Boskowitz und Mährisch-Rothwasser. (Kittner).

Eirrhinus Schönherr.

bimaculatus Fabr. An Fluss- und Teich-Ufern der Ebene und des Vorgebirges, auf Wasserpflanzen ziemlich häufig. Grafschaft Glatz, Trachenberg, Glogau, Dyhernfurt, Breslau, Ohlau. V. L.

rubidus Rosenh. Auf dem Altvater von Kolenati gefangen. (Wiener ent. Z. IV. p. 382).

scirrhosus Gyllh. S. An Ufern von Flüssen und stehenden Gewässern, an *Carex*-Arten und anderen Wasserpflanzen. V. L.

Dorytomus Germar.

Silbermanni Wenck. Nach Dr. Kraatz von Zebe in der Grafschaft Glatz gefangen (Berl. ent. Z. 1867. p. 384).

salicinus Gyllh. An Flussufern, auf Weidengesträuch, selten. Breslau, Dyhernfurt. V. L.

punctator Herbst. Auf Weiden ziemlich häufig. Lubowitz bei Ratibor, Rauden, Breslau, Trebnitzer Hügel, Hessberge, Liegnitz, Bögenberge, Zopten. V. L.

Bagous Germar.

- elegans* Fabr. In der Ebene, in mit Arundo Phragmites besetzten Gewässern, sehr selten. Breslau. V. L.
- rotundicollis* Boh. S. In der Ebene, in Lehmtümpeln, sehr selten. Breslau. V. L.
- binodulus* Herbst. In der Ebene, in stehenden Gewässern, auf Stratiotes aloides; bei Breslau überall sehr häufig. Glogau, Liegnitz, selten. (Letzner).
- nodulosus* Gyllh. S. In stehenden Gewässern der Ebene, selten. Breslau, Glogau, Liegnitz. V. L.
- diglyptus* Boh. S. In der Ebene am Ufer stehender und fließender Gewässer, unter Anspülicht etc. selten. Liegnitz. (Gerhardt).
- limosus* Gyllh. In der Ebene und dem Vorgebirge, an seichten Gewässern, selten. V. L.
- encaustus* Boh. S. Wie der Vorhergehende, sehr selten, Breslau, Liegnitz. V. L.
- var. halophilus* Redtb. Wie der Vorhergehende.

Tanysphyrus Germar.

- **Lemnæ* Fabr. Sehr zahlr. in den Ropitzer Sümpfen bei Teschen. (Heczko).

Anoplus Schönherr.

- setulosus* n. sp. Kirsch. Berl. ent. Z. 1870 p. 217.

Ovatus, niger, scutello pectorisque lateribus dense niveo squamosis; prothorace fortiter punctato, punctis squamis piliformibus repletis; elytris profunde et late crenato-striatis, interstitiis planis, singulo setulis erectis, albis, brevibus, rigidis, seriatis. — Long. 1 lin.
Bei Troppau (Rost), Altvater (Letzner), Paskau (Reitter).

Anthonomus Germar.

- undulatus* Gyllh. S. Boskowitz, sehr selten. (Kittner).
- Schönherrri* Desbroch. Im niedern Gebirge (4000') auf Sorbus aucuparia, ziemlich häufig, Friesensteine, Kynast (Gerhardt), Grafschaft Glatz. V. L.
- var. conspersus* Muls. Wie der Vorhergehende.

Orchestes Illiger.

- Alni* Linn. Auf Erlen, zuweilen ziemlich häufig. Breslau, Liegnitz, Hirschberger Thal, Glogau, Trebnitz. V. L.
- Quedenfeldtii* Gerhardt. Auf Ulmus campestris bei Weissenrode unweit Liegnitz, ziemlich häufig. (Letzner).
- Ilicis* Fabr. Auf Eichen, sehr selten. Breslau, Trebnitzer Hügel, Liegnitz, Glogau, Hirschberger Thal. (Letzner).

erythropus Germ. Auf Eichengesträuch, ziemlich selten. Nieder-Lindewiese (Weise).

decoratus Germ. Auf Haseln und Weiden. Nicht selten.

var. affinis Steph. Wie der Vorhergehende.

Coryssomerus Schönherr.

Ardea Germ. Auf Dämmen, an Rainen und Wiesen etc. überall ziemlich häufig. (Letzner).

Lignyodes Schönherr.

rudesquamosus Fairm. Nicolsburg 1 St. (Kittner).

Tychius Germar.

polylineatus Germar. In der Ebene auf Grasplätzen, selten. Lubowitz bei Ratibor, Breslau, Glogau. (Letzner).

squamulatus Gyllh. Auf Melilotus-Arten, zuweilen ziemlich häufig. Ohlau, Breslau, Liegnitz, Glogau. V. L.

Medicaginis Bris. Auf *Medicago sativa* und *falcata* häufig. Breslau, Trebnitzer Hügel, Liegnitz. Glogau. V. L.

bicolor Bris. Von Roger in einigen Stücken in Ober-Schlesien gefangen. (Dr. Kraatz in Berl. ent. Z. 1867 p. 385).

Meliloti Steph. Auf *Melilotus vulgaris*, ziemlich häufig. Breslau, Trebnitzer Hügel, Liegnitz, Glogau. V. L.

crassirostris Kirsch. n. sp. Berl. ent. Z. 1871 p. 48.

Oblongus, convexus, niger, subtus dense albido- aut silaceo-squamosus, supra squamulis oblongis, lacte brunneis sat dense vestitus; rostro valido, apice attenuato; antennis (clava excepta) rostro plus minusve, pedibus ferrugineis; prothorace lateribus leviter rotundato; clytris subtiliter punctato-striatis, striis pilis brevibus, remotis, decumbentibus, albidis; femoribus posticis obsolete dentatis, anticis ♂ squamoso-ciliatis. — Long. $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$ mill.

Bei Liegnitz von Gerhardt in *Melilotus*-Arten aufgefunden.

Cionus Clairville.

Fraxini de Geer. Auf Eschen sehr selten. Breslau, Dyhernfurt, Glogau. (Quedenfeldt). V. L.

Gymnetron Schönherr.

pascuorum Gyllh. Auf feuchten Wiesen im niederen Gebirge, selten. Altvater-Geb., Grafschaft Glatz (nicht selten Zebe), Waldenburger Gebirge V. L.

var. bicolor Gyllh. S. Wie der Vorhergehende.

ictericus Gyllh. S. In der Ebene an sumpfigen Flussufern, sehr selten. Breslau. (Letzner).

- stimulosus* Germ. Auf Compositeen (Matricaria) in der Ebene und im Vorgebirge, sehr selten. Breslau, Parchwitz, Schweidnitz, Liegnitz Nimptsch. (Letzner).
- rostellum* Herbst. Selten. Breslau, Trebnitzer Hügel, Liegnitz, Glogau, Hirschberger Thal. V. L.
- melanarius* Germ. Sehr selten. Breslau, Trebnitzer Hügel, Glogau, Pfaffendorfer Höhen bei Liegnitz. V. L.
- thapsicola* Germ. Auf Verbascum, selten. Breslau, Trebnitzer Hügel. V. L.
- collinus* Gyllh. Auf Linaria vulgaris, selten. Breslau, Trebnitzer Hügel, Liegnitz, Strigau. V. L.

Acalles Schönherr.

- **Camelus* Fabr. Rother Berg, sehr häufig. (Weise).
- Pyrenaeus* Boh. S. Am rothen Berge im m. schl. Gesenke an Klafftern, selten. (Weise).
- Lemur* Germ. In Weidenmoder, sehr selten. Hessberge (im Mai, Schwarz).
- **hypocrita* Boh. S. Am rothen Berge, häufig. (Weise).
- fasciculatus* Boh. S. Sehr selten. Reinerz (v. Rottenberg).
- var. Dromedarius* Boh. S. Wie der Vorhergehende.

Coeliodes Schönherr.

- trifasciatus* Bach. Auf Eichen, ziemlich selten. V. L.
- Lamii* Herbst. Selten. Altvater (Letzner), Boskowitz, sehr selten. (Kittner).
- exiguus* Oliv. Auf Geranien (*Geranium pratense*) überall häufig.
- congener* Först. Auf Eichensträuchern sehr selten. Breslau (Letzner).

Ceuthorhynchus Schönherr.

- macula-alba* Herbst. Auf *Sisymbrium Sophia* und *Papaver*-Arten (in deren Köpfen die Larve) sehr selten. Breslau, Jacobsdorfer See bei Liegnitz (Gerh). Weissenrode. V. L.
- arator* Gyllh. S. An Flussufern, selten. Ohlau, Breslau, Dyhernfurt V. L.
- setosus* Boh. S. Auf Kreuzblüthen, ziemlich häufig. Breslau, Trebnitzer Hügel, Neumarkt, Glogau, Liegnitz, Hirschberger Thal, Hessberge, Bögenberge, Grafschaft Glatz. V. L.
- parvulus* Bris. Grafsch. Glatz (Zebe). Berl. ent. Z. 1867 p. 386.
- crucifer* Oliv. An grasreichen Orten, selten. Breslau. Trebnitzer Hügel, Glogau. Liegnitz, Hochwald (auf *Salix caprea*, Schwarz). V. L.
- Andreae* Germ. Boskowitz, sehr selten. (Kittner).

Javeti Bris. Auf *Symphytum officinale*, *Achusa officinalis* und *arvensis*, ziemlich selten. Breslau, Liegnitz. V. L.

signatus Gyllh. S. Selten. Breslau. Trebnitzer Hügel. V. L.

vicinus Bris. An Dämmen, grasreichen Flusssufern etc. ziemlich selten. Breslau, Obernigk, Liegnitz. V. L.

rugulosus Herbst. Auf Cruciferen (*Sisymbrium*, *Erysimum*) ziemlich selten. Grafsch. Glatz. V. L.

Euphorbiae Bris. In der Ebene, an Dämmen auf *Euphorbia cyparissias*, ziemlich selten. Weissenrode bei Liegnitz (Gerhardt).

angulosus Boh. S. In der Ebene sehr selten. Breslau. (Letzner).

obsoletus Gyllh. S. Bis jetzt nur von Letzner im Altvater 3500' hoch gefangen.

Napi Gyllh. S. In der Ebene an Flusssufern, ziemlich selten. Ohlau, Breslau, Obernigk, Dyhernfurt. V. L.

neutralis Gyllh. S. Auf Cruciferen, ziemlich selten. Breslau, Trebnitzer Hügel, Liegnitz. V. L.

acneicollis Germ. Selten. Bögenberge, Charlottenbrunn, Hessberge V. L.

scapularis Gyllh. S. Auf Cruciferen, ziemlich selten. Ohlau, Breslau, Kanth, Liegnitz. V. L.

suturellus Gyllh. S. Sehr selten. Breslau (Letzner).
(*Ceuthorhynchideus* Duval).

horridus Fabr. Auf *Carduus*-Arten, selten. Altvater, Reichenstein (v. Bodemeyer), Grafsch. Glatz, Waldenburger Geb. V. L.

quercicola Fabr. Auf Eichensträuchern, sehr selten. Hessberge, Brechelsdorf bei Jauer. V. L.

terminatus Herbst. Selten, Breslau, Trebnitzer Hügel, Bögenberge. V. L.

Phytobius Schönherr.

(*C. Eubrychius* Thoms).

velatus Beck. Auf *Myriophyllum* bei Teschen. (Heczko).

velaris Gyllh. Auf *Poligonum*-Arten, zuweilen häufig. Ohlau, Breslau, Trebnitzer Hügel, Kanth, Liegnitz, Hirschberger Thal. V. L.

muricatus Bris. In der Ebene, an Teichen und Flusssufern, ziemlich selten. Liegnitz (Gerhardt).

Baris Germar.

analis Oliv. Nach einer Ueberschwemmung der Oder bei Breslau gefangen. (Schwarz).

Calandra Clarville.

**Oryzae* Linn. Boskowitz in einer Specereiwaarenhandlung mit Reis eingeführt (zahlreich Kittner).

Cossonus Clairville.

**cylindricus* Sahlb. Auf einer Weide bei Ustron in grösserer Anzahl. (Kotula).

Rhyncolus Creutzer.

exiguus Boh. S. Im niederen Gebirge, an Baumstutzen, selten Altvater. (Letzner).

reflexus Oliv. In hohlen Laubbäumen und unter deren Rinde, zuweilen ziemlich häufig. Breslau, Kanth, Glogau. V. L.

punctatulus Boh. S. In hohlen Laubbäumen, sehr selten; Breslau, Glogau, Liegnitz. V. L.

gracilis Rosenh. In anbrüchigen oder hohlen Laubbäumen, Baumstutzen, zuweilen ziemlich häufig. Altvater-Geb., Liegnitz, Riesengebirge, Breslau V. L.

Magdalinus Schönherr.

linearis Gyllh. An Fichten, Birken, Eichen, ziemlich selten.

flavicornis Gyllh. S. Auf Obstbäumen, im Frühjahr, selten. Trebnitzer Hügel, Breslau, Schweidnitz, Liegnitz. V. L.

Apion Herbst.

opeticum Bach. Im Vorgebirge und niederen Gebirge an Waldrändern, selten. Nach Letzner in österr. Schlesien.

cerdo Gerst. Ziemlich selten. Altvater-Geb., Steinkunzendorf im Eulengeb., Breslau, Glogau, (Quedenfeldt). V. L.

penetrans Germ. Auf Gesträuch, (Birken, Weiden), im Frühling und Spätsommer ziemlich häufig. Ratibor, Breslau, Trebnitzer Hügel, Kanth, Liegnitz, Hirschberger Thal, Bögenberge. V. L.

Caullei Wencker. Wie der Vorhergehende, aber seltener. V. L.

confluens Kirb. Auf Disteln, ziemlich selten. Reichenstein, Grafsch. Glatz, Liegnitz, Trebnitzer Hügel, V. L.

flavimanum Gyllh. S. Boskowitz, selten. (Kittner).

validum Germ. Im Vorgebirge, sehr selten. Grafsch. Glatz, Friedland bei Waldenburg. (Letzner).

elegantulum Germ. Selten. Trebnitzer Hügel. Liegnitz, Grafschaft Glatz. V. L.

elongatum Germ. In Gebüsch, sehr selten. Bögenberge, Panten bei Liegnitz (Gerhardt).

sulcifrons Herbst. Im Vorgebirge und den Gebirgsthälern. (Larve in den zellenartigen Anschwellungen von der *Artimisia campestris*), selten. Gräfenberg. Reichenstein, Grafsch. Glatz, Bögenberge. V. L.

Schmidtii Bach. Selten. Grafsch. Glatz, Hornschloss. V. L.

Gyllenhalii Kirb. Auf Wickenarten, sehr selten. Trebnitzer Hügel, Schossnitz bei Kanth. V. L.

filirostre Kirb. Im Vorgebirge und niederen Gebirge, ziemlich selten. Trebnitzer Hügel, Liegnitz, Hessberge, Waldenburger Gebirge, Grafschaft Glatz. V. L.

Sunderalli Boh. S. Auf Kleearten (*Trifolium alpinsae*), sehr selten.

Waltoni Steph. Im Vorgebirge, auf Birken, selten. Wartha, Bügenberge, Liegnitz. V. L.

rubens Steph. Selten. Trebnitzer Hügel, Liegnitz, Hirschberger Thal, Waldenburger Geb. V. L.

affine Kirb. Auf Ampfer, ziemlich selten. Breslau, Trebnitzer Hügel. V. L.

Scolytidae.

Hylastes Erichson.

Trifolii Müller. In der Ebene und im niederen Gebirge, die Larve in den Wurzeln des *Trifolium pratense*, *Spartium scoparium*, *Cytisus* etc. selten. Breslau, Wohlau, Liegnitz, Riesen-Geb. V. L.

Phloeophthorus Wollaston.

rhododactylus Marsh. Am Altvater 2 St. (Letzner.) Im Freistädter Walde 1 St. (Kotula).

arsalis Först. Unter der Rinde von *Spartium scoparium*, selten Ohlau, Breslau, Trebnitzer Hügel, Görlitzer Haide. V. L.

Scolytus Geoffroy.

Ratzeburgii Janson. Unter der Rinde von *Ulmus campestris* und *suberosa*, selten. Ohlau, Breslau, Trebnitzer Hügel. V. L.

pygmaeus Herbst. Unter der Rinde der Rüstern, der Pflaumen- und Apfelbäume. Nicht selten.

castaneus Ratzb. In der Ebene unter der Rinde der Eichen, sehr selten. Breslau (Letzner).

Bostrychus Fabricius.

nigritus Gyllh. Unter der Rinde von Fichten, Kiefern, Tannen, Lärchen, ziemlich selten. (Letzner).

Xylocleptes Ferrari.

bispinus Duft. In der Ebene, in den Stengeln der *Clematis Vitalba*, unter der Rinde der Fichten und Eichen, selten. Ustron, Troppau, Südadhänge des Altvater-Geb. (Letzner).

Pityophthorus Eichhoff.

micrographus Gyllh. Unter der Rinde von Tannen, Fichten, Weimuthskiefern etc. zuweilen ziemlich häufig. Altvater-Geb. (Letzner.)
exculptus Ratzb. Unter der Rinde der Kiefern und Fichten, selten. Trebnitzer Hügel, Birnbäumel, Panten bei Liegnitz. V. L.

Xyleborus Eichhoff.

eurygraphus Rtzb. Unter der Rinde der Kiefern, selten. Brieg, Trebnitzer Hügel, Görlitzer Haide. V. L.

Rhinomaceridae.

Rhynchites Herbst.

sericeus Herbst. Auf Eichensträuchern, selten. Glatz, Liegnitz, Hessberge, Bögenberge, Ohlau. V. L.

Anthribidae.

Tropideres Schönherr.

dorsalis Thunb. Unter der Rinde an schadhafte Stellen der verschiedensten Laubbäume, an Reissigzäunen etc. sehr selten. Hessberge (Gerhardt).
undulatus Panz. Wie der Vorhergehende, selten. Liegnitz, Lüben, Glogau, Breslau, Schweidnitz. V. L.
Edgreni Schh. Wie *T. dorsalis*. Matzdorf bei Lähn. (Gerhardt).
sepicola Herbst. Gleiche Lebensweise, aber sehr selten. Breslau, Trebnitzer Hügel, Festenberg, Liegnitz, Bögenberge, Hirschberger Thal. V. L.

Choragus Kirby.

piceus Schaum. Unter der Rinde vertrockneter Obstbäume, Eichenstränche, an Reissigzäunen etc. selten. Glogau, Dyhernfurt, Breslau, Liegnitz. V. L.

Bruchidae.

Bruchus Linné.

imbricornis Panz. In Gebirgstälern, auf Wiesen, sehr selten. Wolfshau (Gerhardt).
affinis Fröhl. Auf Blüten, in Erbsen etc. ziemlich selten. Breslau, Trebnitzer Hügel, Liegnitz, Lüben. V. L.
pubescens Germ. In Blüten und Früchten von *Sarothamnus vul-*

garis, sehr selten. Ustron (Letzner.) Umgegend von Hainau (v. Rottenberg).

Cerambycidae.

Callidium Fabricius.

rufipes Fabr. An Eichen- und Schlehensträuchern, sehr selten. Fürstenthum Troppau und Teschen (Letzner), Breslau (Jänsch), Pauten bei Liegnitz (Gerhardt).

melancholicum Fabr. An Eichen, sehr selten. Kottwitz bei Ohlau, Breslau (v. Hahn).

Obrium Latreille.

fautharinum Linn. Auf Blüthen, sehr selten. Ustron, Reichenstein, Grafschaft Glatz (Letzner).

Morimus Serville.

cunereus Muls. Ein grosses Exemplar aus Seibenschütz (Kittner).

Exocentrus Mulsant.

punctipennis Muls. An Reisigzäunen, in den Zweigen der Eichen etc. zuweilen ziemlich häufig. Ohlau, Breslau, Liegnitz (Beckern, Kunitz, häufig, Gerh.) V. L.

Saperda Fabricius.

**Phoca* Fröhl. Laubsdorf 3 Stücke (Michow).

Phytoecia Mulsant.

**rufimana* Schrank. Nikolsburg (Kittner).

**ephippium* Fabr. Boskowitz auf Wiesen nicht sehr selten. (Kittner).

molybdaena Dalm. Boskowitz auf Wiesen, selten. (Kittner).

**virescens* Fabr. Altvater (Letzner).

Necydalis Linné.

abbreviatus Panz. An Eichen, Buchen, Ulmen, Maulbeerbäumen, sehr selten. Glatz, Liegnitz (v. Rottenberg). V. L.

Pachyta Serville.

Judolia Muls.

7signata Küst. Auf einer Wiese bei Althammer in mehreren auf einander folgenden Jahren (Schwab).

Leptura Linné.

hastata Fabr. Im Vorgebirge, auf Blüthen, selten. Abhänge des Altvater- und Reichensteiner-Geb., Lindewiese, Friedeberg, Jauernig. (Letzner).

**cincta* Fabr. Altvater-Geb. (Letzner).

sanguinosa Gyll. Nach Redtb. in Schlesien heimisch. (Faun. austr.)

Anoplodera Mulsant.

**rufipes* Schaller. Auf blühenden *Cornus sanguinea* einige Stücke bei Teschen (Kottula).

Cortodera Mulsant.

**quadriguttata* Fabr. Freistädter Schwarzwald 1 Stück (Kottula).

Grammoptera Serville.

analis Panz. Kauden im Mai auf jungen Birken, selten (Roger).

femorata Fabr. An Kiefern, sehr selten. Trebnitzer Hügel, Neumarkt (Pfeil), Liegnitz (Gerhardt.) V. L.

Chrysomelidae.

Donacia Fabricius.

Sparganii Ahr. In sumpfigen Gegenden, auf *Sparganium simplex*, selten, Breslau, Heinrichau (häufig v. Bodemeier).

simplicifrons Lac. Auf *Carex*-Arten, ziemlich selten. Brieg, Breslau, Dyhernfurt, Glogau, Kanth. V. L.

**tomentosa* Ahr. Auf dem Altvater geköschert (Weise).

Lema Fabricius.

flavipes Suffr. In der Ebene und in den Thälern des Gebirges, in waldigen Gegenden auf Weiden, Gräsern, in Blüthen etc. sehr selten. Altvater-Geb., Grafschaft Glatz, Liegnitz (Panten, unter Kiefern, Gerh.) V. L.

Crioceris Geoffroy.

quatuordecimpunctata Scop. Bei Schweidnitz 1 Ex. (Heinze).

Cryptocephalus Geoffroy.

duodecimpunctatus Fabr. Auf Eichen, Haseln und Birken, sehr selten. Pantener Höhen bei Liegnitz (Gerhardt).

janthinus Germ. Auf Birken, selten. Trebnitzer Hügel, Breslau, Nimkau, Mühlgaß bei Steinau, Liegnitz, Bögenberge. V. L.

fallax Suffr. Auf Pappelsträuchern, sehr selten. Breslau (v. Rottenberg).

ochroleucus Fairm. Liegnitz (1 St. v. Rottenberg, 1 St. Gerhardt).

digrammus Suffr. Auf Birken und Weiden, selten. Altvater-Geb., Grafschaft Glatz, Riesen-Geb., Schmiedeberg (Zeller.) V. L.

querceti Suffr. Auf Birken, selten. Grafschaft Glatz, Hirschberger Thal, Glogau (Zeller.) V. L.

saliceti Zebe. Auf Weiden (*Salix caprea*), selten. Altvater-Geb., Grafschaft Glatz. V. L.

frontalis Marsh. Auf Weiden und Birken, ziemlich selten. Grafsch. Glatz, Liegnitz, Nimptsch, Trebnitzer Hügel, Breslau. V. L.

Chrysomela Linné.

Gypsophilae Küst. An sandigen Orten. Breslau, Trebnitzer Hügel, Herrnsstadt, Birnbäumel. V. L.

carnifex Fabr. An sandigen Orten, namentlich der rechten Oderseite. Kallinowitz bei Gogolin, Breslau, Glogau, Birnbäumel. V. L.

Oreina Chevr.

speciosa Linn.

**var. venusta* Suffr. Im Gesenke häufig auf *Doronicum austriacum* (Weise).

Entomoscelis Redtenbacher.

**Adonidis* Fabr. Ogradzon bei Teschen auf einem Kartoffelfelde auf *Erysimum Meirantoides* sehr zahlreich (Kotula).

Phratora Redtenbacher.

atrovirens Cornelius. Auf *Salix purpurea* und *Populus tremula* etc. selten. Breslau, Trebnitzer Hügel, Nimptsch. V. L.

laticollis Suffr. Wie der Vorhergehende, ziemlich selten. Grafschaft Glatz, Trebnitzer Hügel, Ohlau, Breslau. V. L.

Adimonia Laicharting.

circumdata Duftsch.

var. *Florentina* Redt. Bei Plumenau (Wanke), Teschen (Letzner).

interrupta Oliv. Festenberg, Trebnitzer Hügel, Breslau, Jauer, Pantener Höhen bei Liegnitz, Görlitz. V. L.

suturalis Thoms. Breslau, Waldenburger-Geb., Bögenberge, Reichenstein (Schwarz), Liegnitz (Gerhardt), Mühlgaß bei Raudten (von Rottenberg.) V. L.

Phyllobrotica Redtenbacher.

adusta Fabr. Creutz Teschen, sehr selten.

Luperus Geoffroy.

betulinus Fourer. Auf Birken, Weiden etc. ziemlich selten. Ohlau, Breslau, Trebnitzer Hügel, Panten bei Liegnitz, Strehlen. V. L.

Crepidodera Allard.

ventralis Ill. Ziemlich selten. Waldenburg am Altvater, Abhänge des Eulen-Geb., Pantener Höhen bei Liegnitz. V. L.

transversa Marsh. Auf *Cirsium*-Arten, zuweilen ziemlich häufig, jedoch meist einzeln. (Letzner).

aurata Marsh. Auf Pappeln und Weiden überall häufig. (Letzner).

Graptodera Allard.

Hippophaës Aubè. Sehr selten. Ratibor (Kelch), Grafschaft Glatz, (Zebe).

pussilla Duftschm. Auf verschiedenen Pflanzen überall häufig. (Letzner).
cognata Kutsch. Ziemlich häufig (Letzner).

Aphthona Allard.

pallida Bach. Im Vorgebirge 2 Ex. (Letzner).

flaviceps All. Sehr selten.

pygmaea Kutsch. An grasreichen Flussufern, feuchten Wiesen etc. ziemlich selten. Breslau, Obernigk. V. L.

atrovirens Först. Sehr selten. Ustron, Altvater-Geb. (Letzner).

lacertosa Rosenh. Auf trockenen Grasplätzen in der Grafsch. Glatz, selten. (Kutschera, Wiener ent. Monatsch. V. p. 290).

herbigrada Curt. Im Gebirge, an trockenen Hügeln, sehr selten. Grafsch. Glatz. V. L.

hilaris All. Auf Wiesen, sehr häufig, durch das ganze Gebiet. (Letzn.)

Phyllotreta Foudras.

procera Redt. Sehr selten. Liegnitz (Gerhardt).

dilatata Thoms. Auf Cruciferen, nicht häufig. V. L.

Plectroscelis Redtenbacher.

subcaerulea Kutsch. In der Ebene und in Gebirgstälern. In der Oderniederung ziemlich zahlreich. (Letzner).

Balanomorpha Foudras.

obtusata Gyll. In der Ebene, an trockenen, sandigen Flussufern, auf Rainen etc. Ufer der Oder (häufig, Letzner).

Apteropeda Redtenbacher.

globosa Ill. Ziemlich häufig. Altvater-Geb., Grafschaft Glatz (Letzner).

Hypnophila Foudras.

**obesa* Walzl. Am Altvater sehr häufig geköschert. (Weise).

impuncticollis All. Auf unbewaldeten Gebirgskämmen unter Moos, Steinen etc. ziemlich häufig. Riesen-Geb. (Letzner, Schwarz), Spitze des Schneeberges (Schwarz).

Thyamis Stephens.

nigra Hoffm. Kunstadt, selten (Kittner).

atriceps Kutsch. In der Ebene, an den Ufern der Flüsse und der Tümpel, ziemlich selten. Breslau, Lissa (Letzner).

pectoralis Foudr. Auf Rainen, an Dämmen, selten.

Ballotae Marsh. Auf *Marrubium vulgare*, sehr selten. Dörfer in der Umgebung Breslau's (Letzner).

Absinthii Kutsch. Auf *Artemisia Absinthium* und *campestris*, ziemlich selten. Breslau, Lissa, Neumarkt, Wohrlau. V. L.

gravidula Kutsch. Bis jetzt nur im Altvater-Geb. sehr selten.

minuscule Foudr. Sehr selten. Ustron (Letzner).

nana Foudr. An sandigen Orten, ziemlich selten. Ohrlau, Breslau, Birnbäumel. V. L.

ferruginea Foudr. In der Grafschaft Glatz bei Melling selten. (Letz.).

laevis Duftschm. Boskowitz, selten (Kittner).

quadripustulata Fabr. Kunstadt, selten (Kittner).

Medicaginis All. In der Ebene auf *Medicago sativa*, zuweilen ziemlich häufig. Ohrlau, Breslau, Liegnitz (Letzner).

menticola Kutsch. Im Gebirge, selten. Ustron, Altvater-Geb. (Letzner).

Lycopi Foudr. Kutsch. In der Ebene, an Wassergräben, auf *Lycopus europaeus*, *Mentha aquatica* etc. selten. Breslau, Kanth. (Letzner).

canescens Foudr. In der Ebene, an trockenen Hügeln, ziemlich selten. Breslau, Obernigk. (Letzner).

**Nasturtii* Fabr. Kunstadt, selten (Kittner).

suturalis Marsh. In der Ebene, selten. Breslau, Liegnitz (Gerhardt.) V. L.

Dibolia Latreille.

cryptocephala E.H. Auf *Orobanchis niger*, *Salvia pratensis* etc. zuweilen ziemlich häufig. Breslau, Trebnitz, Ohrlau, Brieg, Eulengebirge. V. L.

Schillingii Letzner. Auf *Salvia officinalis*, zuweilen ziemlich häufig. Breslau, Jordansmühle, Nimptsch, Strehlen. V. L.

Cynoglossi E. H. Auf *Stachys recta*, *Cynoglossum officinale* etc. selten. Brieg, Breslau, Neumarkt, Liegnitz, Landeshut. V. L.

depressiuscula Letzn. In der Ebene, selten. (Letzner).

Psylliodes Latreille.

nigricollis Marsh. In der Ebene, auf Raps, sehr selten. Breslau (im August, Letzner), Münsterberg (v. Bodemeyer).

pyritosus Kutsch. Hirschberger Thal (nur einige Exemplare Letzner), Bögenberge bei Schweidnitz.

cupreatus Duftschm. Auf Kohllarten, zuweilen häufig. Ustron, Kosel, Grafsch. Glatz, Breslau. V. L.

instabilis Foudr. Im Vorgebirge, namentlich auf Kalkboden, selten. Setzdorf, Lindewiese bei Freiwaldau. (Letzner).

chalconeris Ill. In der Ebene, auf Distelarten (*Carduus nutans*, *acanthoides*, *arispus*), nicht selten. Ohlau, Breslau, Neumarkt, Glogau, Liegnitz, Nimptsch. V. L.

luteolus Müll. Auf Salanum-Arten (nach Kutschera auch auf der Kartoffel) selten. Breslau. Kanth, Nimptsch. V. L.

Cassida Linné.

languida Cornelius. In der Ebene auf Tanacetum, Achillea millefolium etc. ziemlich häufig. In der Oder-Niederung. (Letzner).

rufovirens Suffr. Auf Sandhügeln, unter Corynephorus, Carex ericetorum etc. ziemlich selten. V. L.

azurea Fabr. Auf Silene inflata, selten. Jauernig, Reichenstein. V. L.
lucida Suffr. Im mähr. schl. Gesenke von Weise geköschert.

margaritacea Schall. Hin und wieder in Gärten auf Gnaphalium margaritaceum, selten. Glatz, Hirschberger Thal, Liegnitz, Glogau, Trebnitzer Hügel, Breslau. V. L.

obsoleta Ill. Auf Stellaria holostea und graminea, überall häufig. (Letzner).

atrata Fabr. Auf Feldern, unter Queckenhaufen etc. sehr selten. Breslau, Herrnsstadt. V. L.

Erotylidae.

Engis Fabricius.

**bipustulata* Fabr. An Baumschwämmen, unter Rinden, überall ziemlich häufig. Paskau, Altvater.

Triplax Paykull.

Platichna Thoms.

bicolor Marsh. In Baumschwämmen, sehr selten. Grafsch. Glatz (Zebe.)

Endomychidae.

Dapsa Latreille.

trimaculata Motsch. In Baumpilzen, sehr selten und bis jetzt nur im Fürstenthum Teschen. V. L.

Lycoperdina Latreille.

Bovistae Fabr. In Staupilzen (*Lycoperdon Bovista*), im Mulm alter Weiden, im Frühlinge und Herbst, selten. Birnbäumel, Breslau, Zopten-Gebirge, Hessberge. V. L.

var. immaculata Latr. Wie der Vorhergehende.

Symbiotes Redtenbacher.

pygmaeus Hampe. An Eichen, in Kellern an alten Weinfässern, Brechelsdorf bei Jauer (in einer hohlen Pappel, Schwarz). V. L.

Coccinellidae.

Coccinella Linné.

notata Laich. Auf Nesseln, sehr selten. Gross-Beckern bei Liegnitz (Gerhardt), Breslau V. L.

divaricata Oliv. Im Gebirge auf Blüthen, sehr selten. Reichensteiner Geb. (Zapfen).

magnifica Redtb Ustron, auf Spargel bei Bielitz (1 St. Kotula).

**hieroglyphica* Linn. Boskowitz, selten (Kittner).

Hyperaspis Redtenbacher.

quadrimaculata Redt. Sehr selten, Teschen. (Letzner).

campestris Herbst.

var. concolor Suffr. Wie *campestris*, jedoch sehr selten.

Scymnus Kugelman.

Redtenbacheri Muls. In Gebirgsthälern, ziemlich selten. Altvater (Letzner).

Rhizobius Stephens.

nigriventris Thoms. Selten. Breslau, Liegnitz (Schwarz) V. L.

Alexia Stephens.

globosa Sturm. In Baumschwämmen, fauligem Holze. Altvater-Gebirge, Grafsch. Glatz. V. L.

Corylophidae.

Sacium le Conte.

pusillum Gyll. In faulem Holze, Modererde, unter Laub etc. selten. Grafsch. Glatz, Breslau, Liegnitz, Bögenberge. V. L.

Arthrolips Wollaston.

piceus Comolli. In fauligem Holze, sehr selten. Ustron (Letzner).

Orthoperus Stephens.

atomarius Heer. Woll. An fauligem Holze, zuweilen selbst in Häusern, ziemlich selten. Breslau, Strehlen. V. L.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn](#)

Jahr/Year: 1871

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Leder Hans (Hanns)

Artikel/Article: [Erster Nachtrag zu Edm. Reitter's Uebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Schlesien 86-139](#)