

Diagnosen neuer Staphyliniden

aus dem

Caucasus und aus Lenkoran.

Von
Dr. E. Eppelsheim
in Grünstadt.

1. *Leptusa rufescens* n. sp.

Elongata, linearis, nitida, subtilius pubescens, rufa, antennis pedibusque rufo-testaceis, abdomine ante apicem nigricante; thorace transverso aequali; elytris hoc longioribus crebre subrugose punctatis; abdomine anterieus crebrius, posterius parcius punctato. Long. 1 $\frac{1}{3}$ lin.

Mas. Abdominis segmento dorsali penultimo medio carina tenui longitudinali instructo.

Die neue Art ist systematisch neben *Lept. fumida* zu stellen und wurde von Leder im Gebirge von Talysch bei Lirik in geringer Anzahl erbeutet.

2. *Aleochara diversicornis* n. sp.

Nigro-picea, nitida, parcius aureo-pubescens, capite nigro, antennis tenuioribus brunneis, basi pedibus anoque rufo-testaceis; elytris lateritiis lateribus infuscatis abdomineque apicem versus angustato parcius fortiter oblique punctatis. Long. 1 $\frac{1}{3}$ —1 $\frac{1}{2}$ lin.

Von Leder bei Lenkoran aufgefunden.

3. *Lomechusa teres* n. sp.

Angustior, ferruginea, capite, thoracis disco abdomineque ante apicem nigris; capite opaco, thorace antersum arcuatim angustato disco nitido, sublaevigato,

medio canaliculato; elytris lateribus oblique profundius impressis. Long. 3 lin.

Trotz grosser habitueller Aehnlichkeit mit *Lom. strumosa* bietet das eben diagnosirte Thier doch manche Unterschiede dar, welche sicherlich die Erhebung derselben zu einer selbstständigen Art rechtfertigen. Es ist diese bei gleicher Länge mit *Lom. strumosa* nur halb so breit und in allen Theilen schlanker und schmaler. Die Fühler sind schlanker, das vorletzte Glied fast noch um die Hälfte länger als breit. Der Kopf ist schmaler, nach hinten weniger verengt, der Scheitel deutlich, sparsam, ziemlich grob aber seicht punktirt, bei *strumosa* glatt. Das Halsschild ist an der Basis entschieden schmaler als die Flügeldecken, an den Seiten in regelmässigem Bogen gerundet, — während bei *strumosa* die Seiten von der Basis bis fast zur Mitte nahezu gradlinig verlaufen und sich dann jäh nach vorn und innen verengen — und die Hinterecken sind breiter abgerundet und stehen weniger nach hinten vor als bei *strumosa*; ferner ist das Halsschild gleich dem Kopfe dunkler als bei der letzteren, auf der ganzen Scheibe bis zum aufgewulsteten Seitenrand schwarz, glänzend, fast unpunktirt, nur längs des Hinterrandes einzeln, nicht fein aber oberflächlich punktirt. Die Flügeldecken sind gegen die Hinterecken zu angebräunt und an den Seiten von den Schulterecken an in schräger Richtung gegen den Hinterrand deutlich eingedrückt, viel tiefer und entschiedener als bei *L. strumosa*. Der Hinterleib ist länger und schlanker als bei dieser Art, in Punktirung und Behaarung kaum abweichend.

Von Leder in zwei Exemplaren im Herbst 1879 auf der Passhöhe des Kasbek bei Ameisen entdeckt.

4. *Myrmedonia cinctipennis* n. sp.

Nigra, nitida, laevigata, parce longius aureo-pubes-cens, thorace antennisque rufis, elytris basi, sutura apiceque flavis, pedibus testaceis. Long. 2 lin.

Das einzige mir vorliegende Stück, welches von Leder im Gebirge von Talysch bei Rasano gefunden wurde, scheint ein ♀ zu sein, da es weder Eindrücke auf Kopf- und Halsschild zeigt, noch irgend welche Auszeichnung auf den Hinterleibs-Segmenten hat.

5. *Oxypoda erythrocer*a n. sp.

Elongata, parum nitida, tenuiter sericco-pubes-cens, nigro-fusca, antennis longioribus apicem versus haud incrassatis, elytris, pedibus anoque rufo-testaceis; thorace

transverso basi impresso elytris tertia parte brevior.
Long. 1 $\frac{1}{3}$ lin.

Im Gebirge von Talysch bei Lirik in 2 oder 3 Stücken von Leder gesammelt.

6. *Oxypoda caspia* n. sp.

Elongata, fusca, griseo-pubescentis, antice parum nitida, abdomine nitidior ferrugineo, segmento 5^o capiteque nigris, antennis, pedibus anoque rufo-testaceis; thorace transverso subaequali elytrisque hoc parum longioribus dense minus subtiliter rugulose punctatis; abdomine apicem versus angustato crebre subtilius punctato. Long. vix 1 lin.

Von Leder in wenigen Exemplaren bei Lenkoran aufgefunden.

7. *Homalota (Aleuonota) mirabilis* n. sp.

Elongata, fusca, capite nigro, abdomine rufo-brunneo, antennis pedibusque testaceis; capite rotundato, exserto, thorace subquadrato medio obsolete longitudinaliter impresso elytrisque hoc paullo longioribus crebre fortius punctatis, subtiliter flavo-pubescentibus; abdomine laevigato. Long 1 $\frac{2}{3}$ —2 lin.

Mas: Capite fortius punctato, elytris anterieus utrinque juxta suturam plicato-carinatis, abdominis segmentis secundo tertioque medio, sexto anteapicem tuberculo rotundato munitis, septimo apice crenulato.

Von Leder in einem Pärchen bei Lirik im Gebirge von Talysch entdeckt.

8. *Coproporus (?) pumilio* n. sp.

Rufo-testaceus, nitidulus, dense subtilissime punctatus et aureo-pubescentis, antennis compressis pedibusque testaceis, illis articulo tertio secundo multo minore; palpis maxillaribus articulo quarto subulato, praecedente triplo angustiore; abdomine latius marginato. Long. $\frac{1}{2}$ lin.

Von Leder in wenigen Exemplaren bei Lenkoran gesammelt.

9. *Conurus nigropictus* n. sp.

Rufus, nitidulus, antennis fuscis basi apiceque pedibusque testaceis, capitis dimidio posteriore, thoracis

fascia basali lobata, clytrorum macula scutellari triangulari, pustula media subtransversa limboque apicali abdominisque cingulo medio nigris; clytris thorace dimidio fere longioribus abdominique lateribus parce nigro-setosis. Long. 1 lin.

Von Leder in zwei Exemplaren im Gebirge von Talysch bei Lirik entdeckt.

10. *Bryoporus vittatus* n. sp.

Oblongus, niger, nitidus, thorace clytrisque rufis, his vitta lata interna nigra, parce indistincte punctatis, dimidio posteriore longitudinaliter sulcatulis; antennis tenuioribus fuscis basi, pedibus abdominisque segmentorum marginibus late rufo-testaceis, abdomine basi segmentorum parce sat fortiter punctato. Long. 2 lin.

Von der Grösse und Gestalt der mittleren Exemplare des *Mycetoporus punctus*, aber dieser Gattung angehörig, durch die Färbung und die Sculptur der Flügeldecken besonders ausgezeichnet. Kopf und Hinterleib sind schwarz, der letztere mit breit rothbraunem Hinterrand der Segmente, das Halsschild und die Flügeldecken lebhaft roth, diese in ihrer inneren Hälfte schwarz, so dass zwei breite schwarze Streifen gebildet werden, welche durch die rothe Naht von einander geschieden sind; die Fühler sind braun, ihre Wurzel und die Beine rothgelb. Die Fühler sind ziemlich schlank, nach der Spitze leicht verdickt, Glied 3 etwas länger und schlanker als 2, 4 länger als breit, von den folgenden die ersten so lang als breit, die letzten nur wenig breiter als lang, das Endglied fast von der Länge der beiden vorhergehenden zusammen, eiförmig, stumpf zugespitzt. An dem schwarzen Kopfe stehen die Augen weniger vor als bei *Bryop. rugipennis*. Das Halsschild ist breiter als bei dieser Art, so breit wie bei *Mycet. punctus*, hinten so breit als die Flügeldecken, vorn fast um die Hälfte schmaler, die Hinterwinkel breit abgerundet, die vorderen und hinteren Randpunkte wenig vom Rande entfernt, die vorderen äusseren dem Rande nach etwas näher gerückt als die inneren. Die Flügeldecken sind fast um die Hälfte länger als das Halsschild, schwach und zerstreut punktirt, in ihrer hinteren Hälfte von 5—6 parallelen ziemlich stark vertieften Längsstrichen durchzogen, die Punkte der Mittelreihe 5—6 an der Zahl. Der Hinterleib ist nach der Spitze stark vereengt, sparsam graugelb behaart, an der Basis der einzelnen Segmente sparsam mässig stark punktirt, auf der hinteren Hälfte glatt. Die Beine sind hell rothbraun.

Von *Bryop. rugipennis* unterscheidet sich diese Art ausser der Färbung durch etwas grössere und in der Mitte breitere Gestalt, durch schlankere Fühler, weniger vorstehende Augen, breiteres Halsschild, andere Sculptur der Flügeldecken und schwächere Pnnktirung des Hinterleibs.

Von Leder in einem einzigen Exemplar im Herbst 1879 auf der Passhöhe des Kasbek aufgefunden.

11. *Ocypus (Anodus) rufipes* n. sp.

Angustus, gracilis, subdepressus, alatus, griseo-pubescentis, niger, parum nitidus, capite thoraceque nigro-aeneis, nitidis, antennis fuscis basi, mandibulis pedibusque rufis; clytris thorace medio subcarinato perparum longioribus. Long. 5½—6½ lin.

Mas: Abdominis segmento ventrali 7^o postice medio latius triangulariter exciso, 6^o late obsolete emarginato.

Von Leder bei Lenkoran gesammelt.

12. *Lathrobium impressifrons* n. sp.

Nigrum, nitidum, capite elytrorum latitudine, fronte in utroque sexu impressa, clytris thorace oblongo parum longioribus rufis basi nigris, crebrius minus subtiliter punctatis; pedibus testaceis, Long. 3 lin.

Mas: Fronte profundius foveata, abdominis segmento 7^o ventrali posterius subtriangulariter impresso — impressione utrinque nigro-scabriuscula, lateribus elevatis postice obtuse subdentatis — apice medio late emarginato, lateribus profunde sinuato.

Von Leder in einem Pärchen bei Lirik im Gebirge von Talysch aufgefunden.

13. *Lathrobium Lederi* n. sp.

Subcylindricum, nigro-piceum, nitidum, densius griseo-pubescentis, ore antennisque rufis, pedibus testaceis; capite orbiculato thorace latiore thoraceque oblongo crebre fortiter, clytris hujus longitudine et latitudine profunde interius subseriatim, abdomine parcius subtiliter punctatis. Long. 3½ lin.

Mas: Abdominis segmento 6^o ventrali medio fovea lata lateribus elevatis recta instructo, 7^o apice profunde rotundatim exciso, antice angustius subimpresso 3^o, 4^o et 5^o medio breviter obsolete canaliculatis.

Von Leder im Gebirge von Talysch bei Lirik und Rasano gesammelt und meinem verehrten Freunde in Dankbarkeit dedicirt.

14. *Stenus erythrocnemus* n. sp.

Niger, nitidus, dense punctatus, densius albido-pubescent, femoribus basi anguste, tibiis medio tarsisque rufo-testaceis, his apice fuscis; palpis testaceis, articulo 3^o basi excepta, nigro; elytris fortiter punctatis macula posteriore fulva. Long. 2½ lin.

Das ♂ ist mir bis dahin noch unbekannt.

Von Leder in zwei weiblichen Exemplaren aufgefunden, das eine von Tiflis, das andere von Lenkoran stammend.

15. *Trogophloeus dilaticollis* n. sp.

Niger, nitidus, elytris nigro-piceis, antennarum articulo primo pedibusque rufo-piceis; capite medio subcarinato; thorace late cordato, anterieus lateribus angulato-dilatato, 7-foveolato, foveola posteriore lunata. Long. 1½ lin.

Von Leder bei Lenkoran gesammelt.

16. *Thinobius (Thinophilus) nodicornis* n. sp.

Elongatus, angustus, linearis, depressus, nitidulus, capite oblongo-quadrato thoraceque transverso fuscis, elytris hoc duplo longioribus, antennarum basi pedibusque pallide testaceis, abdomine nigro; antennis crassiusculis articulo 4^o includentibus multo latiore. Long. ½ lin.

Es liegt mir nur ein einziges von Leder bei Lenkoran gesammeltes Stück zur Beschreibung vor.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [22_1](#)

Autor(en)/Author(s): Eppelsheim Eduard

Artikel/Article: [Diagnosen neuer Staphylinidien aus dem Caucasus und aus Lenkoran 11-16](#)