Zur Flechtenflora

von

Mähren und Oesterr. Schlesien

Von **Josef Paul**, Apotheker in Mährisch-Schönberg.

Auf meinen botanischen Exkursionen, welche hauptsächlich der Moosflora galten, nahm ich auch einige Flechten mit. Nur der Umstand, dass ausser einer Aufzählung von Prof. Spitzner im XXXI. Band dieser Schriften bisher nichts über Flechten veröffentlicht wurde und dass ich durch ein Augenleiden an weiteren mikroskopischen Arbeiten behindert bin, veranlasst mich, nachfolgende Funde der Öffentlichkeit zu übergeben, mit dem Wunsche, dass recht bald einige jüngere Kräfte sich finden möchten, um diese Aufzählung zu ergänzen.

Die älteren Funde hat Herr Dr. Pötsch, weiland Stiftsarzt in Kremsmünster, die neueren, Herr Militärapotheker Em. Senft in Wien revidirt. Herr Senft hatte überdies die Güte, mehrere Flechten, welche ich nicht mehr selbst bearbeiten konnte, zu bestimmen, wofür ich ihm hier meinen besten Dank ausspreche.

Die Anordnung und Nomenklatur ist die von Prof. Berthold Stein in der Krystogamenflora von Schlesien, II. Band, 2. Hälfte, befolgte. Die mit * bezeichneten Arten sind bisher in diesen Schriften noch nicht aufgezählt.

I. **Urflechten.**

1. **Strauchflechten.**

A. Scheibenfrüchtige.

Usnea barbata (L.) a. **florida** L. Schönberg: Frankstädter Wald, Rabenseifner Wald, in der Traussnitz.

Forma **hirta** Ach. Schönberg: Kirchelwald, Bürgerwald — Gesenke: Am Berggeist auf Sorbus etc. häufig.

b. **dasypoga** Ach. Schönberg: Kirchelwald, Bürgerwald, Königsgrund, Frankstädter- und Rabenseifner Wald. — Gesenke: Wald vom Berggeist zum Backofenstein etc.

Usnea cornuta Kbr. (wenigstens dieser Art am nächsten stehend.) Schönberg: Kirchelwald.

Bryopogon jubatum (L.) a. **prolixum** (Ach.) Schönberg: Wald beim Rauchbeerstein.

b. **implexum** (Hoffm.) Schönberg: Rauchbeerstein, Rabenseifner Wald.

c. **chalibeiforme** (L.) Schönberg: In Wäldern.

Evernia divaricata (L.) Schönberg: Kirchelwald, Bürgerwald.

Evernia prunastri (L.) a. **vulgaris** Kbr. Schönberg: Kirchelwald, Frankstädter Wald, oberm Annahof, Bürgerwald, Rabenseifner Wald, Rauchbeerstein. Gesenke: Auf Sorbus am Bergegeist.

Evernia furfuracea (L.) Schönberg: Bürgerwald, Kirchelwald, Frankstädter Wald, oberm Annahof, Rabenseifner Wald, Rauchbeerstein. — Ges.: Am Wege zu den Dreibrunnen.

Ramalina calicaris (L.) Schönberg: Bürgerwald, Frankstädter Wald, Rabenseifner Wald.

Ramalina fraxinea (L.) a. **ampliata** (Schaer.) Schönberg: Bürgerwald, oberm Annahof, am Wege von Zöptau nach Marschendorf auf Sorbus.

b. **fastigiata** (Perh.) Schönberg: Oberm Annahof und am Wege von Zöptau nach Marschendorf mit var. a. auf Sorbus, Bürgerwald, Frankstädter Wald, Rabenseifner Wald. — Ges.: Tafelsteiner des Altvaters.

Ramalina farinacea (L.) Schönberg: Kirchelwald, Bürgerwald, f. **multifida** Esch. Schönberg: Rabenseifner Wald.

***Thamnolia vermicularis** (Sw.) Ges.: Am Fuhrmannstein. (lag Direktor Lukas.)

Stereocaulon tomentosum (Fr.) Schönberg: Kirchelwald. Ges.: Auf der Hochschar.

Stereocaulon incrustatum Flk. Ges.: Bei den Dreibrunnen.

***Stereocaulon paschale** (L.) Ges.: Hohe Heide.

Cladonia turgida (Ehrh.) Schönberg: Raulshöhe.

Cladonia gracilis (L.) Schönberg: Am Bradlstein.

a. **chordalis** Flk. Schönberg: Kirchelwald. — Ges.: Altvater und Tafelsteine.

form. **aspera** Flk. Ges.: Beim Franzens-Jagdhaus, den Dreibrunnen, auf der Hochschar.

c. **macroceras** Flk. forma **ceratostelis**. — Ges.: Auf dem Hochschar; grüne Steine, oberer Berggeist, Hochbergstein, Backofenstein, Dreibrunnen form. **tubaeformis**. — Ges.: Grüne Steine, oberer Berggeist, Hochbergstein, Backofenstein mit Vorwieger.

Cladonia verticillata (Hoffm.) Schönberg: Bradlstein.

Cladonia degenerans Flk. Schönberg: Kirchelwald, Bürgerwald, Bradlstein.

***Cladonia decorticata** (Fl.) Th. Fr. Ges.: Auf dem Ammichstein.

***Cladonia cariosa** (Ach.) Schönberg: Eisenbahndamm beim Wasserwerk, Strassengraben bei Oberleithner Weberei, am Taubenberg, bei Marschendorf.

***Cladonia pityrea** Flk. Schönberg: Bradlstein.

Cladonia pyxidata (L.) a. **neglecta** Flk. Schönberg: Taubenberg, Bürgerwald (f. *lophura*), Zöptau beim Paraplui. — Ges.: Auf dem rothen Berg, Brünnelhaide.

b. **Pocillum** (Ach.) Schönberg: Bürgerwald, Frankstädter Wald, Ullersdorf bei der Liechtensteinwarte, von Altstadt nach Goldenstein. — Ges.: Berggeist, Backofenstein, Falkenfelsen beim Altvater, Hochschar, Köpernik etc. gemein. Schlesien: Nesselkopf bei Gräfenberg.

c. **chlorophaea** Flk. (= *Clad. fimbriata* var. *Körb.*) Schönberg: Saum des Angerwaldes.

Cladonia fimbriata (L.) Schönberg: Kirchelwald, Bürgerwald, Karlshöhe, Rabenstein, zwischen Altstadt und Goldenstein. Becher-, rüssel- und spießförmig in allen Varietäten gemein. Schlesien: Gräfenberg bei Hirschenbad. — Ges.: Hochschar, rother Berg, Franzens Jagdhaus etc.

***Cladonia coccifera** (L.) Schönberg: Kirchelwald, Heukoppe. — Mähr.-Trübau: f. *pleurota* im Hellgraben. — Ges.: Altvater, Tafelstein etc.

***Cladonia deformis** (L.) Ges.: Hohe Haide, Kessel.

Cladonia digitata (L.) Schönberg: Bürgerwald, Haidstein. — Ges.: Beim Franzens Jagdhaus; grosser und kleiner See, Hochschar, rother Berg, Falkenfelsen, Köpernik, Reilig Berg, Brünnelhaide. — Schlesien: Wald bei Reihwiesen.

Cladonia macilenta (Ehrh.) Schönberg: Haidstein, Bradlstein, Wald bei Altstadt. — Ges.: Winkelsberg, Hochschar.

***Cladonia bellidiflora** Ach. Schönberg: Am Taubenberg, kaum 400 m hoch (tefte Senft). — Ges.: Ammichstein.

Cladonia uncinata Hoffm. Schönberg: Am Wege zum Rauchbeerstein. Ges.: Altvater.

Cladonia squamosa (Hoffm.) b. **asperella** Flk. Schönberg: Heukoppe im Kirchelwald, Frankstädter Wald, Bradlstein, Rauchbeerstein. Ges.: Köpernik, Hochschar, Hochbergstein, Backofenstein, hin und wieder Steine bei Karlsbrunn.

***Cladonia delicata** (Ehrt.) Schönberg: Im Kichelwald.

***Cladonia caespititia** Flke. Schönberg: Bürgerwald beim Kesselbrünnel.

Cladonia furcata (Huds.) a. **crispata** (Ach.) Schönberg: Kichelwald, Taubenberg, Frankstädter Wald.

b. **racemosa**. forma **erecta** Fw. 2. **polyphylla** (Flk.) Schönberg: Bürgerwald, Frankstädter Wald, Rauchbeerstein. 1. **regalis** (Fw.) Schönberg: Rauchbeerstein, form. **recurva** (Hoffm.) Schönberg: Karlshöhe, Kirchelwald. Ges.: Tafelsteine des Altvaters.

c. **subulata** (L.) Schönberg: Bei Oberleitners Weberei, Kirchelwald, Taubenberg.

***Cladonia rangiformis** Hoffm. (**pungens** Ach.) Schönberg: Kirchelwald, Bürgerwald.

***Cladonia rangiferina** (L.) [a. **vulgaris** Schönberg: Kirchelwald, Bradlstein. f. **incrassata** Rbh. — Ges.: Hochbergstein, Backofenstein, Hörndlstein, Hochschar, Köpernik. f. **alpestris**, Ges.: Auf dem Fuhrmannstein.

Cladonia uncialis (L.) Fr. Ges.: Auf dem Altvater.

B. Staubfrüchtige.

***Sphaerophorus coralloides** Pers. Ges.: Beim Oppafall.

Sphaerophorus fragilis (L.) Ges.: Köpernik, Brünnelhaide, Tafelsteine des Altvaters.

2. Blattflechten.

A. Scheibenfrüchtige.

Cetraria Islandica (L.) a. **platyna** Ach. Ges.: gemein, Altvater, hohe Haide, Hochschar, etc. Uebergang zu **subulata** Ges.: Backofenstein, Hochbergstein.

b. **subulata** (Fr.) Ges.: Hochschar, forma **dealbata** Senft Ges.: Am Sonntagsberg bei der Hochschar; ganz ausgebleichte Form. f. **crispa** Ges.: Auf dem Köpernik.

***Cetraria hiascens** Fr. Schönberg: Saum des Kirchelwaldes bei 400 m Seehöhe. Nach brieflicher Mittheilung des Herrn Senft stimmt diese Pflanze auch in den chemischen Reaktionen ganz überein, besitzt aber doch Uebergänge zu *Cetraria Islandica*. Herr Dr. Pötsch erklärte sie seinerzeit schliesslich doch für eine Varietät der *Islandica* die auch bei Karlsbad vorkommen soll.

***Cetraria cucullata** (Bell.) Ges.: Altvater, Franzens-Jagdhaus, Peterstein.

Cetraria glauca (L.) Schönberg: Frankstädter und Rabenseifner Wald.

Cetraria pinastri (Scop.) Schönberg: Kirchelwald. — Ges.: Dreibrunnen.

Sticta pulmonaria (L.) Schönberg: Auf dem Rabenstein. — Ges.: Auf dem rothen Berg etc. häufig.

Parmelia perlata (L.) Schönberg: Rauchbeerstein. f. **sorediata** Schaer. Schönberg: Schwarze Steine bei Zöptau.

Parmelia tiliacea Hoffm. Schönberg: Bürgerwald, Wiesenberg.

Parmelia saxatilis (L.) a. **retiruga** (DC.) Schönberg: Kirchelwald, Bürgerwald, Rauchbeerstein, Rabenstein. Ullersdorf: Hutberg.

b. **sulcata** Tayl. Schönberg: Beim Paraplui, Zöptau. — Ges.: Köpernik, Tafelsteine des Altvaters.

c. **omphalodes** (L.) Ges.: Peterstein, Felsen der Brünnelhaide.

d. **panniformis** (Ach.) Schlesien: Harrichstein bei Freiwaldau.

Parmelia physodes (L.) a. **vulgaris** Kbr. Schönberg: Bürgerwald, Kirchelwald, Rabenseifner Wald, Frankstädter Wald, Rauchbeerstein. f. **labrosa**, Schönberg: Kirchelwald, Bürgerwald. — Ges.: Auf Sorbus am Berggeist.

Parmelia encausta (Sw.) b. **intestiniformis** (Vill.) Auf den Schwalbensteinen des Spieglitzer Schneeberges (Dir. Lukas leg.)

Parmelia olivacea (L.) Schönberg: Taubenberg, Kokeschstein. f. **saxatilis** Rabh. Schönberg: Rabenstein. f. **glabra** (Schär) Nyl. Schönberg: Felsen beim Blaudaer Höfel, Kokeschstein.

Parmelia aspidiota (Ach.) Schönberg: Auf Prunus am Wege zum Blaudahöfel und auf Fichten daselbst. f. **exasperata** DC. Schönberg: Am Kirschberg, Angerwald, Blaudahöfel.

Parmelia Fahlunensis (L.) Ges.: Auf dem Köpernik, Tafelsteine des Altvaters.

Parmelia stygia (L.) a. **genuina** Kbr. Ges.: Peterstein, Tafelsteine des Altvaters, Hinundwieder-Steine bei Karlsbrunn.
b. **lanata** (L.) Ges.: Tafelsteine des Altvaters, Backofenstein.

Parmelia caperata (L.) Schönberg: Kirchelwald, Frankstädter Wald. Zöptau: Beim Paraplui.

Parmelia conspersa (Ehrh.) Schönberg: Kokeschstein, Felsen beim Blaudaer Höfel.

Menegazzia pertusa (Schrk.) **terebrata** (Hoffm.) Krb. Ges.: Auf Baumrinden am Wege zum rothen Berg.

Physcia ciliaris (L.) Schönberg: Bürgerwald, beim Blaudaer Höfel, Hohe Warte bei Zöptau etc. gemein.

Physcia stellaris (L.) Schönberg: An Gartenzäunen die v. **fornicata** Bürgerwald. b. **adscendens** Fr. Schönberg: An Gartenzäunen. f. **adpressa** Th. Fr. Schönberg: Angerwiesen auf Populus.

Physcia caesia (Hoffm.) Schönberg: Felsen des Krönesberges, Steinbrücke über den Grenzgraben.

Physcia pulverulenta (Schreb.) Schönberg: Beim Bergwirthshaus, Oberleithners Weberei, Blaudahöfel, Kirchelwald, Bürgerwald.

b. **pityrea** (Ach.) Schönberg: Felsen des Taubenberges.

***Physcia obscura** (Ehrh.) um Schönberg, f. **cycloselis** (Ach.) f. **lithothea** Schönberg: Felsen des Taubenberges.

***Xanthoria parietina** (L.) Schönberg: Ueberall gemein.

***Xanthoria lichnea** (Ach.) Schönberg: Auf Tilia beim Blaudahöfel.

b. **fallax** (Hepp) Ges.: Auf dem Peterstein.

Nephromium laevigatum (Ach.) a. **genuinum** Kbr. Schönberg: Kirchelwald. f. **sorediatum** Schönberg: Saum des Kirchelwaldes.

b. **papyraceum** Hoffm. Schönberg: Kirchelwald f. **sorediatum** Schaer. Schönberg: Kirchelwald, beim Blaudaer Höfel, schwarze Steine bei Zöptau.

Peltigera aphotosa (L.) Schönberg: Kirchelwald, Königsgrund, Bürgerwald, Bradlstein. — Ges.: Hochschar, Tafelsteine des Altvaters, beim Hirschbrunnen am grossen Hirschkamm.

Peltigera malacea Fr. Schönberg: Bürgerwald. Zöptau: Beim Paraplui.

Peltigera rufescens Hoffm. Schönberg: Am Angerdamm, Kirchelwald, Bürgerwald. — Ges.: Hochschar, im kleinen Kessel. f. **praetexta** Flk. Ges.: Auf dem rothen Berg.

Peltigera canina (L.) Schönberg: Gemein, im Bürgerwald, Kirchelwald, Rabenstein, Zöptau etc.

Peltigera polydactyla Hoffm. Schönberg: Am Angerdamm, Kirchelwald, Bürgerwald. — Ges.: Am Weg zum Kessel, Amreichstein, Backofenstein, Schäferheide.

Peltigera horizontalis (L.) Schönberg: Kirchelwald, Bürgerwald.

***Peltigera venosa** (L.) Schönberg: Kirchelwald, Rabenseifner Wald.

***Gyrophora cylindrica** (L.) Ges.: Felsen der Brünnelhaide, Tafelsteine des Altvaters, Backofenstein, Köpernik etc., sehr verbreitet. f. **denudata** Tan. et Borr. Ges.: Brünnelhaide.

Gyrophora polyphylla (L.) Schönberg: Felsen ober Brattersdorf.

***Gyrophora deusta** (L.) Ges.: Beim Dreibrunnen, Oppafall, Tafelsteine des Altvaters.

B. Kernfrüchtige.

Endocarpon miniatum (L.) a. **vulgare** Kbr. Schönberg: Felsen des Taubenberges, Rabenstein.

b. **complicatum** (Sw.) Ges.: Im Kessel.

***Endocarpon fluviatile** (Web.) Ges.: Im Wasser des wilden Steingrabens unterm Altvater.

3. Krustenflechten.

A. Scheibenfrüchtige.

a. Rundfrüchtige.

***Pannaria brunnea** (Sw.) Schönberg: Kirchelwald, Bürgerwald. f. **coronata** (Hoffm.) Schönberg: Steinbruch vor dem Kirchelwald.

***Pannaria microphylla** (Sw.) Mass. Schönberg: Auf Serpentinfels bei Nikles.

***Gasparinia murorum** Hoffm. a. f. **major** (Whbg.) Schönberg: Auf Felsen beim Paraplui Zöptau.

***Placodium saxicolum** (Poll.) Schönberg: Steinerne Gartenmauer Hermesdorf, Taubenberg, Felsen beim Blaudaer Höfel.

a, 2. **diffractum** Ach. Schönberg: Am Rokeschstein.

***Calopisma vitellinum** (Ehrh.) Schönberg: Auf Dachschindeln, Kirschbäumen.

b. **xanthostigma** Pers. Schönberg: Auf einem steinernen Brückel am Kirchelweg.

***Calopisma aurantiacum** Lghtf. Schönberg: Auf der Karlshöhe.

***Calopisma pyraceum** (Ach.) Kbr. Schönberg: Auf Populus nigra bei Oberleithners Weberei.

***Calopisma cerinum** (Ehrh.) Ges.: Brünnelhaide, auf Sorbus.

***Calopisma ferruginea** Huds. Schönberg: Felsen des Krönesberges, Steinbrücklam Kirchelweg. f. **muscicolum** (Schaer.) Ges.: Auf dem Peterstein.

***Dimerospora cyrtella** (Ach.) Schönberg: Auf Salix.

***Rinodina exigua** (Ach.) Schönberg: Auf Salix.

***Lecanora atra** Huds. Ges.: Felsen der Brünnelhaide, Falkenfelsen.

***Lecanora recedens** (Kbr.) Stein. Ges.: Felsen der Brünnelhaide.

***Lecanora subfusca** (L.) Schönberg: Auf Gartenplanken, Angerwiesen.

a. **rugosa** (Pers.) Schönberg: Beim Blaudahöfel.

b. **coilocarpa** (Ach.) Schönberg: Taubenberg auf Felsen.

c. **enteroleuca** Schönberg: Beim Blaudahöfel, überhaupt sehr häufig.

***Lecanora cenisia** Ach. Schönberg: Am Kokeschstein, Haidstein. — Ges.: Auf dem Köpernik.

***Lecanora pallida** (Schreb.) a. **angulosa** (Schreb.) Schönberg: Auf Prunus in Gärten, Alnus bei der Oberleithner Bleiche, Tilia beim Johnsdorfer Teich, Blaudaer Höfel.

b. **cinerella** Flke. Schönberg: Auf Alnus bei der Oberleithner Weberei, Planken am Angerdamm, Blaudaer Höfel. f. **coeruleata** Ach. Schönberg: Planken am Angerdamm.

***Lecanora sordida** Pers. Schönberg: Steinbruch vor dem Kirchelwald, Felsen beim Blaudaer Höfel und ober der Brattersdorfer Kirche.

***Lecanora badia** Pers. Ges.: Brünnelhaide auf Felsen.

***Lecanora polytropa** (Ehrh.) Ges.: Am Falkenfelsen, beim Franzens-Jagdhaus, Tafelsteine des Altvaters, Köpernik, Felsen der Brünnelhaide.

***Lecanora varia** (Ehrh.) Schönberg: Holzsaun der Oberleithner Bleiche.

***Ochrolechia androgina** Ges.: Auf dem Köpernik. Hinundwieder-Steine bei Karlsbrunn.

***Imadophila aeruginosa** (Scop.) Ges.: Franzens-Jagdhaus, rother Berg, Kailigberg, Hochschar, Ammichstein, häufig.

***Aspicilia cinerea** (L.) Schönberg: Am Kokeschstein, Steinbruch in Blauda. — Ges.: Beim Franzens-Jagdhaus, Tafelsteine des Altvaters.

***Aspicilia Myrini** Fr. Schönberg: Steinbruch am Saum des Kirchelwaldes.

***Aspicilia alpina** Sent. Schönberg: Am Mittelstein.

***Urceolaria scruposa** (L.) Schönberg: Steinbrückl am Grenzgraben, Felsen vor dem Blaudaer Höfel.

***Pertusaria amara** Schönberg: Bürgerwald.

Pertusaria communis DC. a. **pertusa** (L.) Ges.: Auf dem rothen Berg.

b. **violosa** (Wallr.) Ges.: Beim rothen Berg-Wirthshause.

***Pertusaria leioplaca** (Ach.) a. **tetraspora** Th. Fr. Ges.: Auf dem rothen Berg.

***Psora demissa** Rutstr. Am Kamm des Gesenkes.

***Bacidia rubella** (Ehrh.) a. **luteola** Schrad. f. **vulgaris** Kbr. Schönberg: Im Bürgerwald.

***Bacidia muscorum** (Sw.) f. **viridescens** Mass. Schönberg: In einem Strassengraben, Ullersdorf: Steinerne Gartenmauer.

Biatora granulosa (Ehrh.) **decolorans** Kbr. Ges.: Felsen ober dem Franzens-Jagdhaus und auf Wegen am Kamm der Sudeten.

Biatora Strasseri A. Zahlbr. Schönberg: Im Kirchelwald am 14. April 1879 gefunden. War bisher nur von Einem Standorte aus Nieder-Oesterreich bekannt!!

***Biatora fusca** (Schaer.) b. **atropusca** (Fw.) Schönberg: Hohlweg hinterm Kesselbrünnel im Bürgerwald.

***Biatora lygaea** Ach. Ges.: Auf Felsen der Brünnelhaide.

***Biatora ambigua** Mass. Schönberg: Im Bürgerwald.

***Baeomyces roseus** Pers. Schönberg: Im Kirchelwald etc.

***Sphyridium byssoides** (L.) b. **carneum** Flk. Schönberg: Bm Grenzgraben im Bürgerwald, Reitzbeergraben im Kirchelwald.

***Buellia myriocarpa** (DC.) **punctata** Kbr. a. **punctiformis** (Hoffm.) Schönberg: Auf Larix im Bürgerwald, f. **stigmatea** Ach. Schönberg: Steinernes Brückel am Kirchelweg.

b. **chloropolia** (Fr.) Schönberg: Bürgerwald.

***Buellia parasema** (Ach.) a. **disciformis** (Fr.) f. **rugulosa** Ach. Schönberg: Auf Planken am Angerdamm, auf Tilia beim Johnsdorfer Teich und auf Prunus im Frankstädter Wald. — Ges.: Brünnelhaide auf Sorbus.

***Catocarpus Körberi** Stein. Schönberg: Schafbaude oberm Annahof.

***Rhizocarpon geographicum** (L.) Ges.: Beim Franzens-Jagdhaus, Altvater etc. häufig. f. **contiguum** Fr. und **atrovirens** Fr. Ges.: Felsen der Brünnelhaide. f. **geronticum** Ach. Ges.: Beim Franzens-Jagdhaus, Tafelsteine des Altvaters.

***Lecidella sudetica** (Körb.) Stein. Ges.: Auf dem Köpernik.

***Lecidella lithophila** Ach. Ges.: Felsen der Brünnelhaide.

***Lecidella pillularis** (Rav.) **goniophila** Kbr. Ges.: Tafelsteine des Altvaters.

***Lecidella viridans** (Fw.) Schönberg: Am Kokeschstein.

***Lecidella sabuletorum** (Schreb.) g. **enteroleuca** (Fr.) Stein. Schönberg: Beim Blaudahöfel, im Bürgerwald. — Ges.: Auf dem rothen Berg, Köpernik auf Sorbus. f. **olivacea** Hoffm. Schönberg: Am Kokeschstein.

***Lecidella assimilata** (Nyl.) Ges.: Auf Wegen am Kamm des Gebirges.

***Lecidea fusco-atra** (L.) Schönberg: Am Kokeschstein, Felsen beim Blaudaer Höfel. Ges.: Ohne näheren Fundort.

Lecidea macrocarpa (DC.) a. **platycarpa** (Ach. Kb.) Schönberg: Auf Felsen im Kirchelwald. Ges.: Auf dem Peterstein, Felsen der Brünnelhaide. f. **phaea** Fw. Schönberg: Steinbruch vor dem Kirchelwald. — Ges.: Tafelsteine des Altvaters. f. **sterica** Ach. Ges.: Auf dem rothen Berg. f. **oxydata** Kbr. Ges. Auf dem Peterstein.

***Lecidea crustulata** Ach. Schönberg: Steinbruch vor dem Kirchelwald, Taubenberg.

***Arthrosporium accline** (Fw.) Schönberg: Auf Salix.

b. Strich- oder Fleckfrüchtige.

***Opegrapha varia** (Pers.) f. **lichenoides** Pers. Schönberg: auf Tilia in den Blaudaer Gründeln.

***Graphis scripta** (L.) a **vulgaris** Kbr. Schönberg: Bürgerwald. f. **abietina** Schar. Schönberg: Bürgerwald, f. **limita** Pers. und a. **hebraica** Ach. Ges.: Auf dem rothen Berg etc., überhaupt gemein.

B. Staubfrüchtige.

***Cyphelium aciculare** Hw. Schönberg: Auf Tilia in den Blaudaer Gründeln.

***Coniocybe furfuracea** (L.) Schönberg: Beim Kesselbrünnel im Bürgerwald.

C. Kernfrüchtige.

***Trombium epigaeum** (Pers.) Wallr. Schönberg: Wegrand im Bürgerwald.

***Pyrenula nitida** (Schrad.) Ges.: Auf dem rothen Berg.

II. Gallertflechten.

A. Scheibenfrüchtige.

***Synechoblastus flaccidus** Ach. Schönberg: Im Kirchwald, am Rabenstein.

Leptogium lacerum (Hw.) Schönberg: Wald oberm Königsgrund, auf Felsen des Bürgersteines.

III. Fadenflechten.

***Thermutis velutina** Kbr. Schönberg: Am Haidstein.

Berichtigungen.

				Lese :	Statt :
Seite 81	Zeile 15	von unten	Tafelsteine		Tafelsteiner
" 81	" 11	" unten	leg.		lag.
" 81	" 6	" unten	Karlshöhe		Raulshöhe
" 82	" 2	" oben	oberm		oberer
" 82	" 4	" oben	Voriger		Vorwieger
" 82	" 11	" oben	beim		boim
" 82	" 20	" unten	Nesselkoppe		Nesselkopf
" 82	" 6	" unten	Keilig		Reilig
" 82	" 3	" unten	Winkelsdorf		Wickelsberg
" 82	" 1	" unten	teste		tefte
" 83	" 6	" oben	Hin und wieder		hin und wieder
" 84	" 3	" unten	aspidota		aspidiota
" 86	" 8	" oben	Ammichstein		Amreichstein
" 87	" 3	" oben	Kokeschstein		Rokeschstein
" 88	" 9	" oben	Keiligberg		Kailigberg
" 88	" 8	" unten	Bei Biatora	Strasseri ist beizufügen:	
			determ Senft.		
" 89	" 2	" oben	Beim statt Bm.		
" 89	" 9	" oben	fehlt zwischen	Prunus und im der	Beistrich.
" 89	" 11	" oben	soll Körberi	fett gedruckt sein.	
" 89	" 5	" unten	lese steriza	statt sterica.	

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn](#)

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: [44](#)

Autor(en)/Author(s): Paul Josef

Artikel/Article: [Zur Flechtenflora von Mähren und Oesterr. Schlesien 80-90](#)