

Beitrag zur Flora von Mähren.

Von **Albin Wildt.**

1. *Quercus Streimii* Heuffel (*lanuginosa* \times *sessiliflora*) bei Malomieřitz (Brünn).

2. *Populus canescens* Ait. (*tremula* \times *alba*) zwischen Tracht und Unter-Wisternitz; ferner gehören hierher die zwei großen Bäume beim Löscher Bahnhofe in Czernowitz (Brünn). Letztere sind weiblichen Geschlechtes.

3. *Thesium linifolium* var. *latifolium* m. Das Herbar Freyn hat als *Th. bavarum* Schrk. zweierlei. Die eine Pflanze viel kräftiger und derber, von Orb im Spessart leg. Kesselmeyer, ist sicher richtig bestimmt, die andere (aus Böhmen) ist von dieser verschieden, stimmt ganz mit jener Pflanze, die ich in den Vorjahren unter typischen *Th. linifolium* bei Eibenschitz gesammelt habe, und unterscheidet sich von letzterem nur durch 4—5 mm breite, dreinervige Blätter. Diese breitblättrige Pflanze sah auch ich bisher als *Th. bavarum* Schrk. an, bezeichne sie jedoch jetzt in obiger Weise, weil nach Beck Flora v. N. Oe. pag. 601 *Th. linifolium* nie über 3 mm breite Blätter hat.

4. *Loranthus europaeus* Jacq. am Hadiberge (Brünn) häufig.

5. *Rumex Hydrolapathum* Huds. bei Chirlitz ziemlich reichlich.

6. *Rumex stenophyllum* Ledeb. Heuer endlich im Salzboden bei Ottmarau (Brünn) in circa 10 Stücken aufgefunden.

7. *Rumex pratensis* Koch (*crispus* \times *obtusifolius*) bei Schimitz (Brünn) spärlich, bei Unterwisternitz (Polau) reichlich.

8. *Rumex sanguineus* L. bei Kostel und Eisgrub.

9. *Polygonum dumetorum* L. Bei Czernowitz (Brünn) unter normalen Individuen einige mit fast ungeflügelten Früchten.

10. *Polygonum lapathifolium* var. *danubiale* Kern. Heuer auf dem in Frühling überschwemmt gewesenen Schwarzauf der Grilowitzgasse in Brünn.

11. *Mercurialis annua* L. Im September d. J. ein Sturzfeld bei Chirlitz (Brünn) unter Ausschluß jeder anderen Art vollständig grün deckend.

12. *Chenopodium opulifolium* L. var. *muconulatum* Beck Flora v. N. Oe. pag. 331 bei Obergerspitz (Brünn).

13. *Salsola Kali* L. bei Rebeschowitz (Brünn, Culot, Adjunkt^{am} bot. Garten in Brünn).

14. *Herniaria glabra* var. *setulosa* Beck Flora von N. Oe. pag. 347 bei Nebowid (Brünn).

15. *Cerastium caespitosum* Gilib. var. *glandulosum* Boenn. bei Kiritein (Brünn).

16. *Cerastium brachypetalum* Desp. bei Hajan (Tkany)*, im Schreibwalde (Brünn, Jellinek)*; var. *tauricum* Spreng. bei Jehnitz (Brünn, Makowsky)*, bei Adamsthal (Theimer)* und bei Lelekowitz.

17. *Cerastium semidecandrum* L. (Fritsch, Excurs. Flora II. Aufl., pag. 219) für Brünn bisher bloß bei Rebeschowitz nachgewiesen, aber sicherlich auch an anderen Stellen mit pannischer Flora.

18. *Cerastium glutinosum* Fr. bei Brünn verbeitet. Das Vorkommen von *Cerastium pumilum* Fr. bleibt hier noch zu erweisen, da meine Stücke (von der Schwedenschanze) eine sichere Bestimmung nicht gestatten.

19. *Silene dichotoma* Ehrh. vereinzelt bei Jundorf und Ottmarau (Brünn), hingegen stand sie heuer massenhaft in den Kleefeldern von Czernowitz und Nebowid (Brünn).

20. *Dianthus Pontederiae* Kern. am Hadiberge, bei Schimitz und Sobieschitz (Brünn).

21. *Aristolochia Clematitis* L. bei Nebowid (Brünn).

22. *Anemone grandis* Wender, war heuer selbst bei Nebowid, wo sie früher auch mit ganzen Blättern vorkam, nur mit weniger geteilten zu finden.

23. *Ranunculus testiculatus* Cr. bei Ober-Gerspitz (Brünn) spärlicher als im Vorjahr.

24. *Papaver Argemone* L. bei Wostopowitz (Brünn).

25. *Fumaria Vaillantii* Loisl. mit obigem.

26. " *rostellata* Knauf. bei Czernowitz (Brünn).

*) Nach Belagstückchen im Herbare des naturforschenden Vereines; wo alle als *C. brachypetalum* Desp. bestimmt worden sind.

27. *Barbarea arcuata* Rchb. bei Tracht (Auspitz).
28. *Roripa amphibia* Bess. bei Chirlitz (Brünn).
29. *Arabis pauciflora* Garke in Rziczkatiale (Brünn), selten.
30. *Draba verna* L. Nach dem in der österr. bot. Zeitschrift 1911, S. 384, enthaltenen Schlüssel (von Emil Wibral, Graz) ergeben sich nach meinem Materiale die Standorte für:
 - a) *Erophila majuscula* Jord. bei Bisenz, am Hadiberge (Brünn) und Bohdaletz (Bez. Neustadtel); ist die häufigste aller.
 - b) *Erophila stenocarpa* Jord. im Sande bei Dubnian (Göding); dort sehr häufig.
 - c) *Erophila Ozanoni* Jord. bei Eibenschitz.
- Weitere Formen bleiben zu suchen namentlich in Lokalitäten mit pontischer Flora.
- Viola odorata* × *cyanea*. Das von mir kultivierte Stück blühte in den Vorjahren violettblau, heuer waren dessen Blumenblätter weiß mit lilafarbenem Rande.
31. *Geranium pyrenaicum* L. beim Barmherzigen-Kloster in Brünn.
32. *Ribes rubrum* L., verwildert, bei Czernowitz (Brünn).
33. *Poterium muricatum* Spach, eingeschleppt, bei Czernowitz (Brünn).
34. *Prunus Mahaleb* L. ssp. *Cupaniana* Asch. & Gr. Syn. VI., 2, pag. 157, verwildert, auf der Juranshöhe bei Brünn.
35. *Prunus spinosa* L. var. *coaetanea* Wimm. & Grab. im Schreibwalde (Brünn).
36. *Prunus Cerasus* L. var. *acida* C. Koch. Asch. & Gr. Syn. VI., 2, pag. 149, verwildert, um die Mordowna bei Schimitz (Brünn).
37. *Prunus insititia* L. var. *nigra* Arch. & Gr. Syn. VI., 2, pag. 122, verwildert, bei Czernowitz (Brünn).
38. *Lathyrus vernus* L. var. *albiflorus* Alef. im Schreibwalde bei Brünn.
39. *Dorycnium germanicum* Rouy bei Nebowid (Brünn).
40. *Tetragonolobus scandalida* Scop. bei Ottmarau (Brünn).
- Daphne Mezereum* L. fruchtet im botanischen Garten in Brünn reichlich, obgleich sie dort im November und Dezember blüht.

41. *Epilobium hirsutum* \times *parviflorum* bei Keltschan (Gaya).

42. *Oenanthe aquatica* Poir. neben *Cytisus supinus* auf ganz trockenem Boden blühend, auf den Polauer Bergen.

43. *Primula officinalis* L. var. *canescens* Opiz häufig mit der typischen Art am Hadiberge (Brünn, Dr. Podpéra). Besonders groß und blaß blühende Stücke dieser Varietät sah ich früher als *P. officinalis* \times *elatior* an.

44. *Symphytum officinale* L. var. *angustifolium* Opiz. im ehemaligen Schwarzabett bei Brünn.

45. *Lycopsis arvensis* L. bei Nebowid (Brünn).

46. *Atropa Belladonna* L. ist im dichten Jungwalde am Rande des neu angelegten Weges von Adamstal nach Wranau plötzlich und zahlreich aufgetreten, aber auch schon viel seltener; vielleicht zu medizinischen Zwecken genommen worden.

47. *Kickxia spuria* Dum. bei Ottmarau (Brünn, Culot, Adjunkt am botan. Garten in Brünn).

48. *Veronica beccabunga* L. var. *tenerrima* Schmidt bei Kostel und Siluvka, heuer aber auch am überschwemmt gewesenen Ufer der Schwarza bei Brünn. (S. Post 9.)

49. *Veronica aquatica* Bernh. var. *glandulifera* Čel. bei Tracht (Bez. Auspitz.) und Kostel. Es ist das die in der Fruchtform sehr schwankende und stets kümmerliche Pflanze, die ich bisher als *V. anagalloides* Guss. angesehen habe.

Veronica opaca Fr. Da auch die Pflanze von Rejnochowitz (leg. Gogela im Herbar des Dr. v. Teuber) *V. polita* Fr. ist, kennt man für *V. opaca* noch keinen Standort in Mähren.

50. *Utricularia vulgaris* L. in Eisenbahngraben bei Rakwitz.

51. *Orobanche major* L. bei Kloboutschek (Butschowitz), nicht selten.

52. *Phelipaea laevis* L. ein Stück bei Jundorf (Brünn).

53. *Nepeta pannonica* L. bei Kloboutschek (Butschowitz).

54. *Prunella hybrida* Knauf. (*vulgaris* \times *laciniata*) am Hadiberge (Brünn).

55. *Salvia pratensis* L. var. *dumetorum* Andrz. bei Ober-Gerspitz (Brünn).

56. *Salvia elata* Host. (*pratensis* \times *nemorosa*) bei Eisgrub, Kloboutschek (Butschowitz), bei Holasek und Czernowitz

(Brünn). Hier auch ein Stück, das der var. *ambigua* Čel. angehört.

57. *Thymus Marschallianus* Willd. var. *collinus* M. B. (Beck Flora von N. Oe. pag 997.) am Hadiberge, auf der stranská skála und Königsfeld (Brünn), auch am Wetternik (Butschowitz).

58. *Thymus Lövyanus* Opiz (Exkursflora von Fritsch II. Auflage) auf der stranská skála bei Brünn, selten. Nach den bisher verwendeten Floren konnte man diese Pflanze dem Th. *Serpillum* L. oder dem Th. *Marschallianus* Willd. beizählen.

59. *Thymus glabrescens* Willd. Enum. plant. hort. Berol. Suppl. 42 (1813) var. *hirticaulis* H. Br. n. sp. Das so bezeichnete, von Petrak ausgegebene Exsikkat stimmt genau mit der Pflanze von Kromau. Ich sah sie bisher für Th. *calvifrons* Borb. an.

60: *Thymus lanuginosus* L. in sehr kräftigen Stücken auf den Polauer Bergen.

61. *Plantago maritima* L. var. *Peisonis* Beck Flora von N. Oe. pag. 1092 bei Ottmarau (Brünn).

62. *Vinca minor* L. bei Tetschitz (Brünn), sicher wildwachsend.

63. *Cynanchum Vincetoxicum* R. Br. auf den Polauer Bergen, wohl in der var. *laxum* Gren. & Godr.

64. *Galium verum* L. var. *Wirtgeni* F. Schultz bei Ottmarau (Brünn).

65. *Galium spectabile* Beck Flora von N. Oe. pag. 1123 (*verum* × *Mollugo*) am Fuße der Polauer Berge und bei Jehnitz (Brünn).

66. *Knautia arvensis* Coult var. *agrestis* Beck Flora von N. Oe. pag. 1146 bei Sobieschitz (Brünn).

67. *Campanula bononiensis* L. auf den Pausramer Hügeln.

68. *Inula Oculus Christi* L. auf dem Hügel hinter dem Preußenfriedhofe bei Königsfeld.

69. *Achillea setacea* W. & K. bei Rebeschowitz (Brünn, Culot, Adjunkt am botanischen Garten hier).

70. *Achillea collina* Becker var. *pannonica* Scheele nicht typisch bei Polau.

71. *Senecio Jacobaea* L. var. *hydrophilus* Beck Flora von N. Oe. pag. 1222 bei Nennowitz und Mokrahora (Brünn).

72. *Echinops sphaerocephalus* L. im Straßengraben in Sobieschitz (Brünn) und in Fröllersdorf (Grußbach).

73. *Cirsium pannonicum* Gaud. bei Kloboutschek (Butschowitz).

74. *Cirsium brachycephalum* Jur. ist vom vorjährigen Standorte, Kostel, schon bis Rakwitz vorgedrungen.

75. *Centaurea Jacea* L. var. *pannonica* Hajek bei Eisgrub, noch besser ausgesprochen bei der Nordbahnstation Auspitz.

76. *Sonchus asper* Hill. var. *pungens* Bisch. Beck Flora von N. Oe. pag. 1322 bei Grußbach.

77. *Sonchus palustris* L. wurde von Prof. Zimmermann bei Eisgrub entdeckt und gedeiht, von dort in den botan. Garten in Brünn verpflanzt, sehr gut.

78. *Hydrocharis morsus ranae* L. bei Kostel, seltener bei Eisgrub.

79. *Stratiotes aloides* L. männlich bei Eisgrub, weiblich bei Kostel.

80. *Muscari comosum* Mill. bei Morbes und Czernowitz (Brünn); an Wegrändern auch mit kurzgestielten, unfruchtbaren Blüten.

81. *Polygonatum verticillatum* (L.) All. Ein Nest mit fruchtenden Stücken in circa 450 m Seehöhe bei Kiritein (Brünn) von Dr. v. Teuber aufgefunden.

82. *Scirpus silvaticus* L. var. *ramosus* Boen. unter dem typischen bei Holasek (Brünn).

83. *Carex flacca* Schreb. bei Knezwes (Kunstadt).

84. *Panicum sanguinale* L. var. *ciliare* Koel bei Eisgrub.

85. *Setaria glauca* R. & Sch. bei Czernowitz (Brünn).

86. *Agrostis alba* L. var. *flagellaris* Beck Flora von N. Oe. pag. 60 bei Popitz (Auspitz).

87. *Agrostis canina* L. var. *mutica* Gaud. bei Iglau.

88. *Ventenata dubia* F. Schultz bei Nebowid (Brünn).

89. *Sieblingia decumbens* Bernh. bei Sobieschitz (Brünn) sehr selten.

90. *Molinia coerulea* L. var. *littoralis* Host. Asch. und Gr. Syn. II, 1., pag. 338 bei Kloboutschek (Butschowitz).

91. *Sclerochloa dura* Beauv. bei Ottmarau (Brünn).

92. *Poa palustris* L. var. *levis* Asch. & Gr. Syn. II. 1, pag. 48 bei Wlkosch (Gaya).
93. *Festuca arundinacea* Schreb. am Kuhberge bei Brünn.
94. *Bromus ramosus* Huds. ssp. *euramosus* Asch. und Gr. Syn. II, 1., pag. 575 bei Kloboutschek (Butschowitz) und auf den Pausramer Hügeln.
95. *Bromus inermis* Leys. var. *aristatus* Schur. Asch. und Gr. Syn. II, 1., pag. 590 bei Ober-Gerspitz (Brünn.)
96. *Nardus stricta* L. bei Kiritein (Brünn) selten.
97. *Agropyrum caninum* R. & Sch. var. *gracilius* Lang. Asch. & Gr. Syn. II, 1, pag. 643 auf den Polauer Bergen. *Phoenix daeckylifera* L. Etwa 15 Stücke von 20 cm Höhe bei Czernowitz (Brünn), wo Kehricht abgelagert wurde.
98. *Orchis latifolia* L. var. *majalis* Kitt. *genuina* Asch. & Gr. Syn. III, pag. 734 bei Kiritein (Brünn) und bei Zwittau; var. *ampla* Asch. & Gr. pag. 735 bei Zwittau; var. *pinguis* Asch. & Gr. bei Watzenowitz (Gaya).
99. *Orchis incarnata* L. var. *lanceolata* Asch. und Gr. Syn. III, pag. 716 bei Czernowitz (Brünn); var. *serotina* Hausskn. Asch. & Gr. pag. 718 bei Kiritein (Brünn).
100. *Acorus Calamus* L. zwischen Grußbach und Fröllersdorf, vereinzelt noch bei Rzeczkowitz (Brünn).
101. *Arum maculatum* L. auf den Polauer Bergen.
102. *Spirodela polyrrhiza* Schleich. bei Kostel und Eisgrub mit
103. *Lemna gibba* L., jedoch seltener als obige.

Brünn im Dezember 1911.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [50](#)

Autor(en)/Author(s): Wildt Albin

Artikel/Article: [Beitrag zur Flora von Mähren 56-62](#)