

Nennenswerte Pflanzenfunde aus Mähren

Von A. Wildt.

Rumex sanguineus L. bei Těšditz (Bez. Brünn).

Rumex obtusifolius × *sanguineus* bei Eisgrub.

Kochia scoparia Schrad. eingeschleppt bei Schimitz und bei Brünn.

Cerastium pumilum Curt. auf der stranska skala bei Brünn.

Sagina procumbens L. alljährlich zwischen den Pflastersteinen des Museumshofes in Brünn.

Anemone nigricans Fritsch. am Steinberge bei Brünn.

Myosurus minimus L. bei Jundorf (Bez. Brünn, stud. Jaumann).

Ranuncullus reptans L. bei Namješt (Dr. Teuber und Thenius).

Caltha laeta Sch. N. K. bei Zöptau.

Papaver dubium L. bei Czernowitz bei Brünn.

Alyssum montanum L. var. *Wildtii* Podpěra. *Planta elata, caulibus usque 25 cm attingentibus, erectis, ex rhizomate pluricipiti crebris, subcanescentibus, foliis lineare spathulatis, superioribus linearibus 15 × 1.5 mm, basalibus florendi tempore nullis, racemo repando, laxo, pedunculis fructiferis 8–9 mm longis, siliculis rotundo ellipticis, 3 mm longis, 2.5 mm latis.* Bei Dubnian (Bez. Gaya).

Biscutella laevigata L. bei Ewanowitz (Bez. Brünn).

Coronopus vesicarius Musch. und Thell. bei Bisterz (Bez. Brünn, stud. Jaumann).

Rosa Waitziana Trattl. bei Jundorf (Bez. Brünn).

Rosa gallica L., var. *subglandulosa* Borb. (Beck Fl. v. N.=Österr S. 780) bei Sokolnitz.

Lathyrus megalanthus Steudel am Steinberge bei Brünn.

Lotus tenuis W. und Kit. bei Chřlitz (Bez. Brünn).

Trinia Kitaibelii M. B. noch immer am alten Standorte bei Göding (Bily)

Heracleum Sphondilium L., var. *chloranthuin* Borb.; Neumayer um Brünn verbreitet, während die Pflanze mit strahlenden Blüten bei Brünn fehlt.

Chimaphila umbellata Nutt. bei Bilowitz (Bez. Brünn, stud. Jaumann).

Limosella aquatica L. bei Schebetein, (stud. Jaumann).

Melampyrum cristatum L. bei Kohotowitz (Bez. Brünn).

Orthantha tutea Kern., wie obige.

Salvia austriaca Jacq. bei Sokolnitz, (Dr. Teuber).

Salvia nemorosa × *pratensis* bei Holasek (Bez. Brünn).

Thymus parviflorus Opiz am Kuhberge bei Brünn.

Thymus Hackelianus Opiz auf der stranska skala, auf den Polauer Bergen und bei Sokolnitz.

Mentha parietariæfolia Becker bei Czernowitz bei Brünn.

Galium asperum × *austriacum* am Hadiberge bei Brünn.

Rudbeckia laciniata L. an der Zwitta bei Obrzan, blühend.

Achillea ptarmica L. bei Eichhorn (Bez. Brünn, stud. Jaumann).

Triglochin palustre L. bei Czernowitz bei Brünn, schon sehr spärlich.

Allium atrovioleaceum Boiss., eingeföhleppt im Getreide bei Sokolnitz.

Majanthemum bifolium L. mit drei bestens ausgebildeten Blättern bei Kohotowitz (Bez. Brünn).

Juncus Tenegeia Ehrh. bei Ung.-Hradisch, (Dr. Teuber u. Thenius).

Carex disticha Huds bei Morbes (Bez. Brünn).

Carex tomentosa L. bei Morbes (Bez. Brünn).

Carex dioica × *stellulata* bei Zwittau, (Dr. Teuber).

Glyceria nemoralis Uecht. und Körn. bei Jundorf (Bez. Brünn, Dr. Suza).

Festuca capillata Lam. bei Ewanowitz (Bez. Brünn, Weighart).

Festuca heterophylla Lam. bei Eichhorn (Bez. Brünn, stud. Jaumann).

Triticum caninum L. var. *pauciflorum* Schur bei Adamsthal (Bez. Brünn) und auf den Polauer Bergen.

— var. *pseudocaninum* Schur. bei Czernowitz (Bez. Brünn).

Elymus europaeus L. bei Odos (Bez. Brünn, stud. Jaumann).



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn](#)

Jahr/Year: 1922

Band/Volume: [59](#)

Autor(en)/Author(s): Wildt Albin

Artikel/Article: [Nennenswerte Pflanzenfunde aus Mähren 12-13](#)