

Systematisches Verzeichniss

der in den Straten bei Bujtur auf Unter-Pestesser Dorfs-
Gebiet unweit Vajda-Hunyad vorkommenden fossilen
Tertiär-Mollusken-Gehäuse

von

J. L. Neugeboren.

(Fortsetzung).

Cancellaria Gesslini Basterot.

Hörnes Taf. XXXV. Figur 3.

Höchst selten. Ein einziges Stück, — ein ganz kleines Jugendexemplar in meiner Sammlung.

Cancellaria spinifera Grateloup.

Hörnes Taf. XXXV. Fig. 6—8.

Sehr selten. Ein Exemplar in der Ackner'schen Sammlung. In dem Verzeichniss als *Cancellaria ampullacea Brocchi* aufgeführt, wohin sie jedoch nicht gehört.

Cancellaria cancellata Lamarck.

Hörnes Taf. XXXIV. Figur 20, 21 und 22.

Sehr selten in den Sammlungen vorhanden. Gewöhnlich nur in Einem Exemplare.

Geschlecht *Pleurotoma Lamarck.*

Pleurotoma cataphracta (?) Brocchi.

Hörnes Taf. XXXVI. Fig. 6—9.

Nach Dr. Fr. Zikeli unter den von Herrn G. Mannlicher eingesendeten Stücken.

Pleurotoma interrupta Brocchi.

Hörnes Taf. XXXVI. Fig. 19.

Nicht eben selten.

Ausser der typischen Form liegt mir in zwei Exemplaren eine höchst interessante Varietät vor, woran die Längenrippen ganz verschwunden sind, so dass die Oberfläche der Schale nur die Querstreifung behalten hat.

Pleurotoma asperulata Lamarck.

Hörnes Taf. XXXVII. Fig. 1—5.

Sehr selten; nur ein Stück in der Sammlung des Herrn Ackner. In dem Verzeichnisse unter dem Namen *Pl. tuberculosa Bast.* aufgeführt.

Pleurotoma Schreibersi Hörnes.

Hörnes Taf. XXXVII. Fig. 10—13.

Höchst selten; ein Stück in der Sammlung des Herrn Ackner, das mir zur Prüfung und Vergleichung vorgelegen. Weitere Belege fanden sich in keiner mir zugänglich gewesen Sammlung.

Pleurotoma granulato-cincta (?) Münster.

Hörnes Taf. XXXVII. Fig. 14—17.

Nach Dr. Fr. Zikeli unter den von Herrn G. Mannlicher eingesendeten Stücken.

Pleurotoma Jouanetti Des-Moulin.

Hörnes Taf. XXXVIII. Fig. 1—6.

Nicht eben selten.

Pleurotoma semimarginata Lamarck.

Hörnes Taf. XXXVIII. 7 u. 8.

Selten.

Pleurotoma turricula Brocchi.

Hörnes Taf. XXXVIII. Fig. 11.

Sehr selten. Ein einziges Exemplar in meinem Besitze.

Pleurotoma Reevei Bellardi.

Hörnes Taf. XXXIX. Fig. 10 u. 11.

Häufig.

Pleurotoma dimidiata Brocchi.

Hörnes Taf. XXXIX. Fig. 2 u. 3.

Sehr selten. Nur zwei Stücke in der Sammlung des Herrn Ackner.

Pleurotoma recticosta (?) Bellardi.

Hörnes Taf. LI. Fig. 11.

Nach Dr. Fr. Zikeli unter den von Herrn G. Mannlicher eingesendeten Stücken.*)

Pleurotoma pustulata Brocchi.

Hörnes Taf. XXXIX. Fig. 21.

Nicht eben selten.

*) Für das Vorkommen von *Pl. cataphracta*, *Pl. granulato-cincta* und *Pl. recticosta* war ich nicht in der Lage weitere Belege beibringen zu können; nicht unwahrscheinlich, dass das von Herrn Zikeli für *Pleur. granulato-cincta* gehaltene Stück eine *Pl. Schreibersi* war.

Pleurotoma obeliscus Des-Moulin.

Hörnes Taf. XXXIX. Fig. 19.

Sehr selten.

Pleurotoma obtusangula.

Hörnes Taf. XL. Fig. 7 und 8.

Sehr selten. Ein Exemplar in meiner Sammlung.

Pleurotoma submarginata Bonelli.

Hörnes Taf. XL. Fig. 9.

Sehr selten.

Pleurotoma anceps Eichwald.

Hörnes Taf. XL. Fig. 11.

Sehr selten. Einige Exemplare wurden von mir unter meinen Minutien aufgefunden.

Pleurotoma harpula Brocchi.

Hörnes Taf. XL. Fig. 12.

Sehr selten. In der Ackner'schen Sammlung ein Exemplar Unrichtig in dem öfter erwähnten Verzeichniss als *Fusus harpula* aufgeführt.

Pleurotoma Vauquelini Payraudeau.

Hörnes Taf. XL. Fig. 18.

Sehr selten. Wurde von mir unter den Minutien aufgefunden.

Pleurotoma Suessi Hörnes.

Hörnes Taf. XL. Fig. 13.

Sehr selten. Von mir unter den Minutien aufgefunden.

Geschlecht Cerithium Brugière.

Cerithium minutum Serres.

Hörnes Taf. XLl. Fig. 8 u. 9.

Sehr selten.

Cerithium lignitarum Eichwald.

Hörnes Taf. XLll. Fig. 1—3.

Sehr selten. Unter andern auch in der Sammlung des Herrn Ackner.

Cerithium Duboisi Hörnes.

Hörnes Taf. XLll. Fig. 4 und 5.

Sehr selten. In der Ackner'schen Sammlung.

Cerithium Bronni Partsch.

Hörnes Taf. XLll. Fig. 12.

Sehr selten.

Cerithium crenatum Brocchi.

Hörnes Taf. Taf. XLII. Fig. 13 und 14.

Nicht selten.

Cerithium pictum Basterot.

Hörnes Taf. XLII. Fig. 15 u. 16.

Sehr selten; nur einzelne Exemplare wurden von mir in den Sammlungen gesehen.

Cerithium spina Partsch.

Hörnes Taf. XLII. Fig. 15.

Nicht selten. Unter den Minutien, welche durch Schlemmung der zersetzten lehmigen Masse gewonnen werden.

Cerithium scabrum Olivi.

Hörnes Taf. XLII. Fig. 16 und 17.

Nicht selten unter den Minutien.

Cerithium Schwartzi Hörnes.

Hörnes Taf. XLII. Fig. 18.

Sehr selten. Von mir unter den Minutien aufgefunden.

Cerithium perversum Linné.

Hörnes Taf. XLII. Fig. 20.

Fragmente davon fand ich unter den Minutien.

Cerithium bilineatum Hörnes.

Hörnes Taf. XLII. Fig. 22.

Sehr selten. Von mir unter den durch Schlemmung erhaltenen Minutien gefunden.

b) *Phytophaga.*

Familie Turbinacea.

(Les Turbinacées Lamarck).

Geschlecht *Turritella* Lamarck.

Turritella Rieperi* (?) *Partsch.

Hörnes Taf. XLIII. Fig. 2.

Sehr selten. Exemplare davon unter den von Herrn Mannlicher eingesendeten Stücken. Weitere Belege hiefür fehlten in den mir zugänglichen Sammlungen.

Turritella vermicularis Brocchi.

Hörnes Taf. XLIII. Fig. 17 u. 18.

Sehr selten. In der Sammlung des Herrn Ivuly, Gutsbesitzers in Bujtur.

Turritella turris Basterot.

Hörnes Taf. XLIII, Fig. 15 und 16.

Nicht gerade selten.

Turritella Archimedis Brongnart.

Hörnes Taf. XLIII. Fig. 13 u. 14.

Sehr häufig; die von Dr. Hörnes unter Fig. 13 abgebildete sehr zierliche Varietät am häufigsten.

Turritella bicarinata Eichwald.

Hörnes Taf. XLIII. Fig. 8 bis 12.

Sehr selten. In der Bielz'schen und in meiner Sammlung.

Turritella subangulata Brocchi.

Hörnes Taf. XLIII. Fig. 5, 6 u. 7.

Sehr selten. Einzelne Exemplare in den Sammlungen des Herrn Ober-Landesgerichtsrathes Nahlik und Herrn Albert Bielz, so wie in meiner Sammlung.

Geschlecht *Monodonta* Lamarck.

Monodonta Araonis Basterot.

Hörnes Taf. XLIV. Fig. 7.

Sehr selten.

Monodonta angulata (?) Eichwald.

Hörnes Taf. XLIV. Fig. 9 u. 10.

Eine kleine trochusartige Form meiner Sammlung dürfte dieser Art vielleicht beizuzählen sein.

Sehr selten. Zwei Stücke in meiner Sammlung, von der Grösse der Schalen dieser Art, wie ich sie bei Lapugy gefunden habe

Geschlecht *Xenophora* Fischer.

Xenophora Deshayesi Michelotti.

Hörnes Taf. XLIV. Fig. 12.

Sehr selten. In meiner Sammlung ein Exemplar, das ich der Güte des Herrn Appellations-Rathes Joh. v. Nahlik verdanke.

Xenophora testigera Bronn.

Hörnes Taf. XLIV. Fig. 14.

Sehr selten. Ein Exemplar in meiner Sammlung, ein zweites in der Sammlung des Herrn Ackner.

Geschlecht *Trochus* Linné.

Trochus fanulum Gmelin.

Hörnes Taf. XLV. Fig. 1.

Sehr selten. Ein Stück in meiner Sammlung, das ich der Güte des Herrn A. Bielz verdanke.

Trochus patulus Brocchi.

Hörnes Taf. XLV. Fig. 14.

Nicht selten.

Familie S c a l a r i a.

(Les Scalarieres Lamarck).

Geschlecht S s a l a r i a Lamarck.

Scalaria torulosa Brocchi.

Hörnes XLVI. Fig. 13 a u. b.

Selten. Einige Exemplare in meiner Sammlung.

Geschlecht Vermetus Adanson.

Vermetus intortus (?) Lamarck.

Hörnes Taf. XLVI. Fig. 16.

Fragmente dieser Art glaube ich aus den Straten von Bujtur erhalten zu haben.

Geschlecht Siliquaria Bruguière.

Siliquaria anguina Linné.

Hörnes Taf. XLVI. Fig. 18.

Nicht gerade selten, doch meistens nur als Fragmente.

Geschlecht Caecum Fleming.

Caecum trachea Montague.

Hörnes Taf. XLVI. Fig. 19.

Von mir unter den Minutien aufgefunden.

Familie P l i c a c e a.

(Les Plicacés Lamarck).

Geschlecht Pyramidella Lamarck.

Pyramidella plicosa Bronn.

Hörnes Taf. XLVI. Fig. 20.

Sehr selten. Unter den Minutien meines Vorrathes aufgefunden.

Geschlecht Odontostoma Fleming.

Odontostoma plicatum Montague.

Hörnes Taf. XLIII. Fig. 26.

Sehr selten. Von mir unter den Minutien aufgefunden.

Geschlecht Turbonilla Leach.

Turbonilla gracilis Brocchi.

Hörnes Taf. XLIII. Fig. 28.

Sehr selten. Von mir unter den Minutien aufgefunden.

Turbonilla pusilla Philippi.

Hörnes Taf. XLIII. Fig. 30.

Sehr selten. Ein einziges Exemplar in meiner Sammlung.

Turbonilla subumbilicata Grateloup.

Hörnes Taf. 43, 29.

Sehr selten. Ich besitze erst zwei Stücke.

Familie Macrostromata.

(Les Macrostomes Lamarck).

Geschlecht Sigaretus Lamarck.

Sigaretus haliotoideus Lamarck.

Hörnes Taf. XLVI. Fig. 27.

Sehr selten. Ein leider sehr beschädigtes Exemplar in meiner Sammlung, das ich der Güte des Herrn Albert Bielz verdanke.

Familie Neritacea.

(Les Neritacés Lamarck).

Geschlecht Natica Adanson.

Natica millepunctata Lamarck.

Hörnes Taf. XLVII. Fig. 1 und 2.

Die Flecken meistens sehr verblasst.

Natica redempta Michelotti.

Hörnes Taf. XLVII. Fig. 3.

Selten.

Natica Josefina Risso.

Hörnes Taf. XLVII. Fig. 4 und 5.

Nicht selten. Meistentheils kleine Exemplare.

Natica helicina Brocchi.

Hörnes Tafel XLVII. Fig. 6 u. 7.

Nicht selten.

Geschlecht Nerita Linné.

Nerita picta Ferussac.

Hörnes Tafel XLVII. Figur 14.

Sehr kleine Exemplare; meistentheils ganz verblasst.

Familie Peristomiana.

(Les Peristomiens Lamarck).

Geschlecht Chemnitzia d'Orbigny.

Chemnitzia perpusilla Grateloup.

Hörnes Taf. XLIII. Fig. 19.

Sehr selten.

Geschlecht **Eulima** *Risso.*

Eulima polita *Linné.*

Hörnes Taf. XLIX. Fig. 22.

Selten.

Geschlecht **Rissoina** *d'Orbigny.*

Rissoina decussata *Montagues.*

Hörnes Taf. XLVIII. Fig. 1.

Sehr selten.

Rissoina pusilla *Brocchi.*

Hörnes Taf. XLVIII. Fig. 4.

Selten.

Geschlecht **Rissoa** *Treminville.*

Rissoa Mariae d'Orbigny.

Hörnes Taf. XLVIII. Fig. 9.

Nicht gerade selten.

Rissoa Venus d'Orbigny.

Hörnes Taf. XLVIII. Fig. 10.

Nicht eben selten.

Rissoa scalaris *Dubois.*

Hörnes Taf. XLVIII. Fig. 12.

Sehr selten.

Rissoa Montagnei *Payraudeau.*

Hörnes Taf. XLVIII. Fig. 13.

Sehr selten.

Rissoa Moulinsi d'Orbigny.

Hörnes Taf. XLVIII. Fig. 14.

Sehr selten.

Rissoa costellata *Grateloup.*

Hörnes Taf. XLVIII. Fig. 21.

Sehr selten.

Rissoa inflata *Andrzejowski.*

Hörnes Taf. XLVIII. Fig. 22.

Sehr selten.

Rissoa angulata *Eichwald.*

Hörnes Taf. XLVIII. Fig. 23.

Sehr selten.

Sämmtliche Peristomianen in dem Vorrathe meiner Minuten.

B. Gasteropoda (sensu strictiori Partsch).

Familie Bullacea.

(Les Bulléens Lamarck).

Geschlecht Bulla Linné.

Bulla utricula Brocchi.

Hörnes Taf. L. Fig. 2.

Selten.

Bulla milliaris Brocchi.

Hörnes Taf. L. Fig. 3.

Selten.

Bulla conulus Deshayes.

Hörnes Taf. L. Fig. 4.

Selten.

Bulla Lajonkaireana Basterot.

Hörnes Taf. L. Fig. 9.

Selten.

Bulla convoluta Brocchi.

Hörnes Taf. L. Fig. 7.

Selten.

Sämmtliche Arten von *Bulla* in dem Vorrathe meiner Minutien.

Familie Calyptraeaea.

(Les Calyptraciens Lamarck).

Geschlecht Crepidula Lamarck.

Crepidula unguiformis Lamarck.

Hörnes Taf. L. Fig. 12.

Sehr selten. In Ackners und in meiner Sammlung.

Geschlecht Calyptraea Lamarck.

Calyptraea Chinensis Linné.

Hörnes Taf. L. Fig. 17 u. 18.

Sehr selten. In Ackner's und in meiner Sammlung.

Calyptraea Lapugyensis Neugeb.

Neugeboren: Beiträge zur Kenntniss der Tertiär-Mollusken von Ober-Lapugy.

Sehr selten. Wurde von mir unter meinen Minutien aufgefunden.

Geschlecht *Capulus* Montfort.

***Capulus Hungaricus* Linné.**

Hörnes Taf. L. Fig. 19.

Sehr selten. In Ackner's Sammlung.

Geschlecht *Fissurella* Bruguière.

***Fissurella Graeca* Linné.**

Hörnes Taf. L. Fig. 27.

Nach einigen von mir aufgefundenen Fragmenten. Auch in Ackner's Sammlung. In Ackner's Verzeichniss als *Fissurella costaria Deshayes* aufgeführt.

Familie *Maldaniacea*.

(Les Maldaniens Lamarck).

Geschlecht *Dentalium* Linné.

***Dentalium Bouéi* Deshayes.**

Hörnes Taf. L. Fig. 31.

Sehr selten. Ein Exemplar befand sich in der an die geol. Reichsanstalt eingesandten Suite.

***Dentalium incurvum* Renier.**

Hörnes Taf. L. Fig. 39 a u. b.

Nicht selten.

***Dentalium entalis* Linné.**

Hörnes Taf. L. Fig. 38. a und b.

Selten. In der von mir geschlemmten erdigen Masse wurden 5 bis 6 Exemplaren aufgefunden.

C. Pteropoda.

Geschlecht *Vaginella* Daudin.

***Vaginella depressa* Daudin.**

Hörnes Taf. L. Fig. 42.

Sehr selten. In der Ackner'schen Sammlung.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1860

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Neugeboren Johann Ludwig

Artikel/Article: [Systematisches Verzeichniss der in den Straten bei Bujtur auf Unter-Pesteser Dorfs- Gebiet unweit Vajda-Hunyad](#)

vorkommenden fossilen Tertiär-Mollusken-Gehäuse 19-28