©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at

Systematisches Verzeichniss der Land- und Süsswasser-Mollusken des österreichischen Kaiserstaates

von

E. A. BIELZ.

(Fortsetzung aus dem vorigen Jahrgange Nr. 12).

13. Buliminus Kutschigi *Pfr.*

Aufenthalt wie bei den Gattungsverwandten:
Dalmatien (Narenta, Ragusa, Laeroma*).

14. B. microtragus *Parr.*

Aufenthalt wie bei den vorstehenden Arten:
Dalmatien (Lacroma, Budua, Castel-Lastua*).

XII. Cionella *Jeffr.*

a) Zua *Leach.*

1. C. lubrica *Müll.*

Syn. Bulimus lubricus Aut.

Am feuchten Boden unter Moos, abgefallenem Laub und Steinen:
Böhmen.
Mähren und Schlesien.
Galizien und Bukovina.
Siebenbürgen.
Ungarn.
Oesterreich und Salzburg.
Steiermark. — Kärnthen. — Krain und Küstenland.
Tirol.
Lombardo-Venetien.
Dalmatien.
Kroatien und Slavonien.

var. nitens *Kok.*
Oesterreich.
Kärnthen. — Krain.

var. lubricella *Zgl.*
Fast in allen Kronländern an trocknen, sonnigen Bergen.

*) Wohl meist vom Meere angeschwemmt.

©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at

b) Azeca *Leach.*

2. C. pupaeformis *Cantr.**)

Syn. dentiens Rossm.

Unter feuchtem Laub am Boden:
Dalmatien (Castel-Lastua, Cattaro, Ragusa, Spalato, Zara, Insel Melada und Lesina).

XIII. Acicula *Risso.*

1. A. Hohenwarthi *Rossm.*

Unter Steinen tief in der Erde:
Krain (Laibach).
Küstenland (bei Triest).
Lombardo-Venetien?
Dalmatien (Dobrota, Dubovica, Insel Lesina).

2. A. veneta *Charp.***)

Syn. A. Jani Betta***).

Wie die Vorige:
Tirol.
Lombardo-Venetien.

3. A. vitrea *Risso (E. A. Bielz).*

Syn. Achatina acicula Müll. — Caecilianella eburnea Bourg. (Risso olim).

Unter der Erde an faulen Wurzeln; häufig auch im Angeschwemmten der Flüsse:
Böhmen.
Mähren und Schlesien.
Galizien.
Siebenbürgen.
Ungarn.
Kärnthen.
Krain und Küstenland.
Tirol.
Lombardo-Venetien.
Dalmatien.
Kroatien und Slavonien.

---

*) Die C. Menkeana C. Pfr., welche an verschiedenen Orten Deutschlands vorkommt, dürfte auch noch in den nordwestlichen Kronländern (Böhmen, Mähren und Schlesien) aufgefunden werden können.

**) Was ich aus Tirol und Ober-Italien gesehen habe, kann ich nur für diese Art und nicht die echte A. Hohenwarthi halten.

***) E. de Betta: Esame critico intorno e tre molluschi del genere Glandina.

©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at

XIV. Stenogyra *Shuttl.*

1. St. decollata *L.*

Syn. Bulimus decollatus Aut.

Unter abgefallenem Laub und Steinen:
Lombardo-Venetien (Euganeeische Hügel bei Padua).
Dalmatien (Zara, Spalato, Insel Lissa).

XV. Balea *Prid.*

a) Balea *s. str.*

1. B. fragilis *Dr.*

An Felsen, Mauern und bemoosten Baumstämmen; hauptsächlich auf Urgebirgen:
Böhmen?
Mähren und Schlesien.
Ungarn (beim Schlosse Gyimes nächst Neutra).
Oesterreich (am Schneeberg) und Salzburg.
Steiermark.
Kärnthen.
Krain.
Tirol (in Nord- und Südtirol ziemlich weit verbreitet).
Lombardo-Venetien (Belluno).

b) Baleo-Clausilia *A. Schmidt.*

2. B. Haueri *E. A. Bielz.*

An Conglomeratfelsen mit Jurakalk-Geröllen:
Siebenbürgen (Dongokö im Bodsauer Gebirge).

3. B. cyclostoma *E. A. Bielz.*

An Conglomeratfelsen:
Siebenbürgen (Felsenwand des Vurfu Oberschii am Südabhang des Bucsecs im Burzenländer Gebirge bei 7000′ Höhe).

4. B. glauca *E. A. Bielz.*

An Conglomeratfelsen und Kalkwänden der Juraformation:
Siebenbürgen (Bodsauer Gebirge Teszla und Szt.-Domokoser Gebirge Tarkö, Egyeskö, Öcsém, Nagy-Hagymás).

var. striolata (Cl. latens *Friv.*)
Siebenbürgen (Szt.-Domokoser Gebirge Öcsém, Tarkö).

var. costata.
Siebenbürgen (Bodsauer Gebirge an Conglomeratfelsen im Walde zwischen dem Teszla und Csukás).

var. minor.
Siebenbürgen (an den Felsenspitzen des Csukás im Bodsauer Gebirge bei 6200′ Höhe).

©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at

5. B. lactea *E. A. Bielz.*

An Conglomeratfelsen:
Siebenbürgen (am Südabhange des Bucsecs).

var. glorifica *Parr.*

Siebenbürgen (mit der Stammform jedoch an andern Felsenpartien).

6. B. livida *Mke.*

An Conglomerat- und Kalkfelsen der Juraformation:
Siebenbürgen (am Nordabhange des Bucsecs im Burzenländer Gebirge und an der Piatra arsze im Bihar-Gebirge).

XVI. Clausilia *Dr.*

a) Alopia *H. et A. Adams.*

1. Cl. canescens *Parr.*

Auf Kalkfelsen der Juraformation:
Siebenbürgen (auf dem Piatra mare im Burzenländer Gebirge).

var. glabrata.

Siebenbürgen (auf dem Piatra mare*).

2. Cl. elegans *E. A. Bielz.*

An Conglomeratfelsen mit Kalkgeröllen der Juraformation:
Siebenbürgen (am Südabhange des Königsteins bis in die Walachei, wo sie in der Gebirgsschlucht Dumbrovicsora ihren Hauptfundort hat).

var. cerasina *A. Schmidt.*

Wie die Stammform.

var. intercedens *A. Schmidt.*

Wie die Stammform, wahrscheinlich an einer andern Lokalität.

3. Cl. bogatensis *E. A. Bielz.*

An Conglomeratfelsen mit Kalkgeröllen der Juraformation:
Siebenbürgen (im Perschaner Gebirge auf dem Felsen der Krizbaer Heldenburg, in der Bogater Schlucht, Piatra Cserbului und Dabis bei Ober-Komona, Koltzu Pestere bei Ober-Venetzie).

var. laevigata.

Siebenbürgen (an den Felsen bei der Homorod-Almascher Höhle).

---

*) Kommt auch noch in der Walachei westlich vom Altdurchbruche auf den Kalkfelsen Repetele, südöstlich vom Duscher Passe vor.

©Siebenbürgischer Verein f. Naturwissenschaften Hermannstadt (Sibiu); download unter www.biologiezentrum.at

4. Cl. angustata ***E. A. Bielz.***

An Conglomeratfelsen mit Kalkgerölle der Juraformation:
Siebenbürgen (Perschaner Höhenzug: Piatra neagra und Piatra Girbova bei Ober-Venetzie und Kucsulata; Piatra Dabis, Csetatea und Callecata bei Ober-Komona).

5. Cl. Meschendorferi ***E. A. Bielz.***

An Kalkfelsen der Juraformation:
Siebenbürgen (Perschaner Höhenzug: an der Ostseite des Zeidener Berges).

6. Cl. regalis ***M. Bielz.***

An Kalkfelsen der Juraformation:
Siebenbürgen (Burzenländer Gebirge bei Unter-Tömösch und Bácsfalu).

var. **minor.**
Wie die Stammform: bei Ober-Tömösch.

7. Cl. plumbea ***Rossm.***

An Kalkfelsen der Juraformation:
Siebenbürgen in der nächsten Umgebung von Kronstadt über Rosenau und Törzburg hinaus bis an den Fuss des Bucsecs.

var. **cornea** ***A. Schmidt.***
Wie die Stammform: stellenweise bei Kronstadt und Törzburg.

8. Cl. straminicollis ***Parr.***

An Kalkfelsen der Juraformation:
Siebenbürgen (am Südabhange des Bucsecs beim Kloster Skit la Jalomitza).

var. **controversa** (rechts- und linksgewunden).
Siebenbürgen am nördlichen Fusse des Königsteins in der Zerneschser Felsenschlucht).

(Fortsetzung folgt.)



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.

Jahr/Year: 1866

Band/Volume: 17

Autor(en)/Author(s): Bielz Eduard Albert

Artikel/Article: Systematisches Verzeichnis der Land- und Süsswasser-Mollusken des österreichischen Kaiserstaates 14-18