

Verhandlungen und Mittheilungen

des siebenbürgischen

Vereins für Naturwissenschaften

zu

HERMANNSTADT.

XVIII.

Februar 1867.

N^{ro.} 2.

Inhalt: J. Barth: Systematische Aufzählung der im grossen Kockelthale zwischen Mediasch und Blasendorf wildwachsenden Pflanzen. — G. O. Kisch: Meteorologische Beobachtungen zu Bistritz. — L. Reissenberger: Meteorologische Beobachtungen zu Hermannstadt im Monate Januar 1867.

Systematische Aufzählung

der im grossen Kockelthale zwischen Mediasch und Blasendorf
wildwachsenden Pflanzen

von

JOSEF BARTH,

v. A. B. Pfarrer in Langenthal.

Mit dem vorliegenden systematischen Verzeichnisse — enthaltend die Dicotyledonen — übergebe ich den Freunden siebenbürgischer Botanik das Resultat meiner weitem botanischen Forschungen auf dem Florengebiete zwischen Mediasch und Blasendorf und zwar auf den Gemeindegebieten von Mediasch, Eibesdorf, Klein-Kopisch (Kis-Kapus), Wurmloch, Frauendorf, Arbegen, Marktschelken, Kleinschelken, Abtsdorf (Csicso-Holdvilág), Scholten, Donnersmarkt (Monora), Tür, Blasendorf (Balásfalva), Langenthal, Feigendorf (Mikeszász), Klein- und Gross-Probstdorf.

Auch in dieses Verzeichniss habe ich nur diejenigen Pflanzenspezies aufgenommen, die ich als „gute“ erkannte und von deren Vorkommen in dem vorgezeichneten Florengebiete ich mich selbst an ihren Standorten überzeugen konnte. Dagegen aber habe ich auch alle jene Pflanzen, welche nach den Citaten in den vortrefflichen botanischen Werken von Baumgarten *), Fuss **) und Schur ***) in diesem Gebiete vorkommen sollen,

*) J. Ch. G. Baumgarten: Enumeratio Stirp. magno Transs etc. III. Tom. Vindebonae 1816.

**) M. Fuss: Flora Transsilvaniae excursoria. I. Tom. Cibinii 1866.

***) Ferd. Schur: Enumeratio plantarum Transs. etc. I. Tom. Vindobonae 1866.

die ich trotz aller Mühe nicht wieder habe auffinden können, zu berücksichtigen für nothwendig befunden, weil ich an der Gewissenhaftigkeit der Angaben dieser Gewährsmänner nicht im Geringsten im Zweifel sein konnte.

Wie das Verzeichniss zeigt, habe ich bei einem mehrjährigen Sammeln und Beobachten auch in diesem Gebiete einige, bisher in Siebenbürgen nur an wenigen Orten beobachtete, seltenere Pflanzen, wie z. B. *Astragalus vesicarius*, *Linosyris villosa*, *Omphalodes scorpioides*, u. a. aufgefunden und angeführt. Ich will damit nur andeuten, dass auch dieses Gebiet auf seinem speciellen Terrain noch mehrere seltenere Arten herbergen dürfte. Längere und eindringlichere Forschungen dürften zeigen, dass meine obige Muthmassung zur Wahrheit werden wird und ich werde nicht ermangeln, meine diesbezüglichen Entdeckungen in einem Nachtrage später zur gefälligen Kenntniss zu bringen.

Bei der systematischen Aufzählung der Pflanzen in diesem Verzeichniss bin ich der De Candolle'schen Methode, wie diess Fuss und Schur in den obengenannten Werken gethan, gefolgt, weil diese Anordnung zu diesem Behufe mir am zweckmässigsten zu sein schien und weil eine etwaige Vergleichung und Benutzung derartiger Arbeiten, wie die vorliegende, die Uebersicht um ein Bedeutendes erleichtert.

Endlich wolle der geneigte Leser noch auf einige „Nachträge“ zum Verzeichniss der „Monocotyledonen“, wie auch auf einige sinnstörende Fehler ebendasselbst, welche am Schlusse dieses Verzeichnisses angeführt sind, gefälligst achten.

So möge denn auch diese geringe Arbeit noch als ein kleiner Beitrag zum grossen botanischen Gebäude, das durch die Werke der Meister Baumgarten, Fuss und Schur so nahe der Vollendung gebracht, gelten und alle Freunde siebenbürgischer Pflanzenkunde aneifern, im Sinne des Beschlusses der naturhistorischen Section des Vereins für siebenbürgische Landeskunde, — ddo. Sächsisch-Reen, 23. August 1857 — ihre Gegend genau zu durchforschen und das Resultat ihrer Forschungen zu veröffentlichen.

D i c o t y l e d o n e a e .

I. RANUNCULACEAE FUSS.

- Clematis integrifolia* L. — Auf Bergwiesen und Ackerrändern bei Marktschelken im „Winzerthal“; bei Donnersmarkt auf dem „Flecken“ und bei Tür; nicht selten.
- Cl. recta* L. — Auf buschigen Hügel- und Bergwiesen bei Mediasch, Wurmloch, Frauendorf, Marktschelken, Donnersmarkt, Langenthal, Klein- und Gross-Probstdorf und sonst; häufig.

- Cl. vitalba L.* — An Hecken, Zäunen und in Gebüsch im ganzen Gebiet; häufig.
- Thalictrum aquilegifolium L.* — Auf Hügel- und Bergwiesen zwischen Gebüsch bei Mediasch und Donnersmarkt auf dem „Flecken“; nicht selten.
- Th. minus L.* — Auf Bergwiesen, an Zäunen und Weingartenhecken bei Mediasch, Marktschelken, Scholten, Donnersmarkt, Tür, Blasendorf, Langenthal, Feigendorf, Klein- und Gross-Probstdorf; nicht selten.
- Th. majus L.* — An der Kockel zwischen Weidengebüsch bei Mediasch und Blasendorf.
- Th. angustifolium L.* — Auf feuchten Wiesen bei Mediasch, Frauendorf, Donnersmarkt, Kleinprobstdorf; häufig.
- Th. flexuosum Rchb.* — An sonnigen Berglehnen bei Mediasch am „Ober-Ungerberg“ zwischen Akaziengebüsch; nicht selten.
- Hepatica nobilis Mneh.* (*H. triloba Schur* En. pl. Tr. 7). — In Gebüsch und Wäldern bei Mediasch im „Grevlen“, hinter der Burg, im Leyrisch, Bussderthal, Blasengrund, Keppenbergr, Weberln“, u. s. w.; bei Marktschelken, Abtsdorf, Scholten, Donnersmarkt, Blasendorf und Langenthal; häufig.
- Pulsatilla vulgaris Mill.* — Auf trocknen sandigen Hügeln und Bergen im ganzen Gebiet; häufig.
- P. nigricans Bgt.* n. 1076. (*P. pratensis Mill.* — *Fuss* Fl. Tr. n. 44. — *Schur* En. pl. Tr. n. 22). — Bei Mediasch nach *Bgt.* u. a. O.
- Anemone silvestris L.* — An sonnig-buschigen Hügeln, Bergen, an Waldrändern bei Mediasch.
- A. nemorosa L.* — In Gebüsch und Wäldern bei Mediasch, Eibesdorf, Wurmloch, Marktschelken, Scholten, Donnersmarkt, Blasendorf, Langenthal, Klein- und Gross-Probstdorf; sehr häufig.
- A. ranunculoides L.* — Ebendasselbst und in Gemeinschaft mit Voriger, sehr häufig.
- Adonis autumnalis L.* — Auf Saatäckern bei Blasendorf und Feigendorf; selten.
- A. aestivalis L.* — Auf Saatäckern bei Mediasch, Wurmloch, Marktschelken, Scholten, Donnersmarkt, Langenthal, Feigendorf, Klein-Probstdorf und sonst; nicht selten.
- A. vernalis L.* — An sonnigen, trocknen, kalkhaltigen Berglehnen im ganzen Gebiet, häufig.
- Myosurus minimus L.* — Bei Kleinkopisch am sandigen Bachufer gegen Wurmloch.
- Ranunculus Ficaria L.* (*Ficaria ranunculoides Roth.*, *Bgt.* n. 1096. — *Fuss* Fl. Tr. n. 67. — *Schur* En. pl. Tr. n. 78). — In Gebüsch und Graspärten im ganzen Gebiet, häufig.

- R. divaricatus** *Schrk.* — (*Batrachium circinatum* Tr. *Fuss* Fl. Tr. n. 74. — *B. divaricatum* *Schur* En. pl. Tr. n. 70). — In Teichen und Sümpfen bei Mediasch, Frauendorf, Blasendorf, Langenthal und Gross-Probstdorf; häufig.
- R. Lingua** *L.* — In Sümpfen bei Abtsdorf.
- R. auricomus** *L.* — In Gebüschern, Hecken und an Wald-rändern im ganzen Gebiet, häufig.
- R. acris** *L.* — Auf feuchten Wiesen bei Mediasch, Kleinkopisch, Wurmloch, Frauendorf, Marktschelken, Abtsdorf, Donnersmarkt, Klein- und Gross-Probstdorf; häufig.
- R. polyanthemus** *L.* — Auf Bergwiesen und in Feldbaumgärten bei Mediasch, Wurmloch, Arbeggen, Marktschelken, Donnersmarkt, Klein- und Gross-Probstdorf.
- R. repens** *L.* — Auf feuchten Wiesen, in Gräben und in Gebüschern im ganzen Gebiet, häufig.
- R. bulbosus** *L.* — Auf feuchten Aeckern, an den Kockelufem bei Mediasch, Kleinkopisch, Frauendorf, Blasendorf, Klein- und Gross-Probstdorf.
- R. sceleratus** *L.* — In Gräben, Sümpfen, an Fluss- und Teichufem bei Mediasch, Kleinkopisch, Frauendorf, Kleinschelken, Abtsdorf, Donnersmarkt, Blasendorf, Langenthal, Klein- und Gross-Propstdorf; häufig.
- R. arvensis** *L.* — Auf Saatäckern bei Mediasch, Langenthal, Klein- und Gross-Probstdorf.
- Caltha palustris** *L.* — Auf feuchten sumpfigen Wiesen bei Mediasch, Wurmloch, Marktschelken, Klein- und Gross-Probstdorf; häufig.
- Trollius europaeus** *L.* — Auf schattig-feuchten Waldwiesen bei Wurmloch im „Wiesengrund“, häufig.
- Helleborus purpurascens** *W. K.* — In Gebüschern und Feldbaumgärten im ganzen Gebiet, häufig.
- Isopyrum thalictroides** *L.* — In schattigen Gebüschern bei Mediasch, Wurmloch, Arbeggen, Marktschelken, Donnersmarkt, Klein- und Gross-Probstdorf; nicht selten.
- Nigella arvensis** *L.* — Auf Aeckern und Wiesen bei Mediasch, Marktschelken, Langenthal, Klein- und Gross-Probstdorf.
- Aquilegia vulgaris** *L.* — In Gebüschern bei Langenthal im „Grevlenloch“, selten.
- Delphinium consolida** *L.* — (*Ceratosanthus Consolida* *Schur* En. pl. Tr. n. 160). — Auf Aeckern, Schutt und an Wegen im ganzen Gebiet.
- Aconitum moldavicum**, *Hacq.* (*A. septentrionale* *Bgt.* n. 1054). — Auf buschigen Hügeln und in Feldbaumgärten bei Mediasch im „Leyrisch, Blasengrund, Keppenbergl, Weinsbuchen und Stämperwald“, mit violetten und gelblich weissen Blüten; nicht selten.

- A. Camarum Jacq.** — Auf buschigen Hügeln bei Mediasch, Wurmloch, Marktschelken, Scholten und Donnersmarkt; häufig.
- A. Anthora L.** — Auf buschigen Hügeln und in Feldbaulgärten bei Mediasch im vordern „Grevlen“ und an der „Bruckenburg“; bei Donnersmarkt auf dem „Flecken“; nicht selten.
- Actaea spicata L.** — In schattigen Wäldern bei Mediasch im „Rosengrund, Weberln und Leyrisch“; bei Wurmloch, Abtsdorf, Scholten, Langenthal, Feigendorf, Klein- und Gross-Probstdorf; nicht selten.
- Cimicifuga foetida L.** — Auf buschigen Hügeln und an Wald-rändern bei Mediasch auf den „Neuwiesen“ und bei Gross-Probstdorf im „Flooseln“; nicht selten.

II. PAPAVERACEAE DEC.

- Papaver Rhoëas L.** — Auf Schutt und Saatäckern im ganzen Gebiet nicht zu häufig.
- P. dubium L.** — Auf sandigen Aeckern, Rainen und an Weinbergwegen bei Mediasch, Langenthal und Klein-Probstdorf, mit weissen und rothen Blüten; nicht selten.
- P. somniferum L.** (*P. setigerum Schur* En. pl. Tr. n. 207). — Auf Gartenschutt bei Mediasch, Langenthal und Klein-Probstdorf.
- Glaucium corniculatum Curt.** (*G. phoeniceum Bgt.* n. 1021). — Auf Aeckern, sandigen Hügeln, an Wegen bei Mediasch, Frauendorf, Arbegen, Marktschelken, Abtsdorf, Langenthal, Feigendorf und Kleinprobstdorf; nicht selten.
- Chelidonium majus L.** — An Hecken, Zäunen, Mauern im ganzen Gebiet, häufig.

III. FUMARIACEAE DEC.

- Corydalis cava Schweig.** (*Fumaria cava Bgt.* n. 1457). — In Wäldern, Gebüsch, Hecken und Feldbaulgärten bei Mediasch, Wurmloch, Scholten, Donnersmarkt, Langenthal, Klein- und Gross-Probstdorf; häufig.
- C. solida Sm.** (*F. solida Bgt.* n. 1458). — An denselben Orten und in Gemeinschaft mit Voriger, aber nicht so häufig.
- Fumaria officinalis L.** — Bei Mediasch nach *Fuss* Fl. Tr. n. 214.
- F. Vaillantii Lois.** — Auf Aeckern, Hügeln, an Wegen und in Weinbergen bei Mediasch, Eibesdorf, Frauendorf, Kleinschelken, Langenthal, Klein- und Gross-Probstdorf; nicht selten.
- F. parviflora Lam.** — Bei Mediasch nach *Fuss* Fl. Tr. n. 218.

IV. CRUCIFEREAEE FUSS.

- Nasturtium officinale R. Br.** (*Sisymbrium Nasturtium Bgt.* n. 1340.) — An Gräben, Bächen und Flüssen bei Mediasch Kleinkopisch, Frauendorf, Kleinschelken, Abtsdorf, Donnersmarkt, Blasendorf, Langenthal und Klein-Probstdorf.
- N. amphibium R. Br.** (*Sis. amphib. Bgt.* n. 1343. — *Roripa amphibia Fuss* Fl. Tr. n. 222. — *Schur* En. pl. Tr. n. 237.) — Ebendasselbst.
- N. austriacum Crtz.** (*Camelina austriaca Bgt.* n. 1284. — *R. austriaca Fuss* Fl. Tr. n. 221. — *B. austriacus Schur* En. pl. Tr. n. 242). — Auf feuchten Wiesen bei Langenthal und Klein-Probstdorf.
- N. pyrenaicum R. Br.** (*Sis. pyr. Bgt.* n. 1344. — *R. pyrenaica Fuss* Fl. Tr. n. 228. — *B. pyrenaicus Schur* Eu. pl. Tr. n. 233). — Auf Bergwiesen bei Marktschelken, Donnersmarkt und Langenthal; häufig.
- Barbarea vulgaris R. Br.** (*Erýsimum Barbarea Bgt.* n. 1373). — Auf feuchten Wiesen bei Mediasch, Frauendorf, Kleinschelken, Langenthal und sonst.
- Turritis glabra L.** — Auf sonnigen, steinigen Wiesen, Hügeln und Aeckern bei Mediasch, Eibesdorf, Wurmloch, Marktschelken, Kleinschelken, Klein- und Gross-Probstdorf.
- Arabis sagitta DeC.** — In Gebüsch an steinigen Abhängen bei Klein-Probstdorf im „Neutergrund“, häufig.
- A. hirsuta Scop.** (*Turritis hirsuta Bgt.* n. 1377). — Auf sonnigen Wiesen, Rainen und Hügeln bei Mediasch, Klein- und Gross-Probstdorf; nicht selten.
- A. arenosa Scop.** (*Sisymbrium arenosum Bgt.* n. 1347). — Auf sandigen Stellen: in Gebüsch, Wäldern, auf Aeckern, Mauern u. s. w. Bei Mediasch, Kleinkopisch, Frauendorf, Arbeggen, Marktschelken, Langenthal, Klein- und Gross-Probstdorf; häufig.
- A. Turrita L.** — In schattigen, steinigen Gebüsch und Wäldern bei Langenthal im „Martinsloch“ und bei Klein-Probstdorf im „Neutergrund“; nicht selten.
- Cardamine impatiens L.** — In schattigen Wäldern und Gebüsch bei Mediasch, Marktschelken, Scholten, Langenthal, Klein- und Gross-Probstdorf; nicht selten.
- C. pratensis L.** — Auf feuchten Wiesen bei Mediasch im „Meschner Grund“, sehr häufig; bei Klein- und Gross-Probstdorf, selten.
- Dentaria glandulosa W. K.** — In schattigen Wäldern bei Mediasch, Eibesdorf, Abtsdorf, Scholten, Donnersmarkt, Langenthal, Feigendorf, Klein- und Gross-Probstdorf.

- D. bulbifera L.** — Ebendasselbst, aber nicht so häufig als Vorige.
- Hesperis runcinata W. K.** (*H. inodora Bgt. n. 1402.* — *Schur En. pl. Tr. n. 299.* — *Deilosma runcinatum Fuss Fl. Tr. n. 275.*) — Auf Bergwiesen und in Gebüsch bei Scholten im „Ungerwald“; bei Donnersmarkt auf dem „Flecken“ und bei Tür; nicht selten.
- Sisymbrium officinale Scop.** (*Valarum officinale Schur En. pl. Tr. n. 319.*) — An Wegen, auf Schutt im ganzen Gebiet, häufig.
- S. Loeselii L.** (*Leptocarpea Loeselii Schur En. pl. Tr. n. 318.*) — An Wegen, auf Mauern und Schutt bei Mediasch, Langenthal, Klein- und Gross-Probstdorf.
- S. strictissimum L.** (*Norta strictissima Schur En. pl. Tr. n. 316.*) — An Hecken, Gebüsch und Waldrändern bei Mediasch, Marktschelken, Kleinschelken, Donnersmarkt, Blasendorf, Langenthal, Klein- und Gross-Probstdorf, nicht selten.
- S. junceum M. B.** (*Erysimum junceum Bgt. n. 1370.* — *Norta juncea Schur En. pl. Tr. n. 317.*) — An steinigen kalkigen Hügeln und Bergen bei Mediasch am „Weberln Berg“; bei Klein- und Gross-Probstdorf.
- Sophia multifida Gilib.** (*Sis. Sophia Bgt. n. 1348.* — *Discurea Sophia Schur En. pl. Tr. n. 320.*) — Auf Schutt, Mauern und an Wegen im ganzen Gebiet, häufig.
- Alliaria officinalis Andrz.** (*Sis. Alliaria Bgt. n. 1353.*) — In Hecken, Gebüsch und in Feldbaumgärten im ganzen Gebiet.
- Arabidopsis Thaliana Schur.** (*Arabis Thaliana Bgt. n. 1381.*) — Auf sandigen Aeckern, Wiesen, Hügeln und Bergen bei Mediasch und Klein-Probstdorf; häufig.
- Erysimum cheiranthoides L.** — Bei Marktschelken nach *Fuss Fl. Tr. n. 295.*
- E. odoratum Ehrh.** (*E. Cheiranthus Bgt. n. 1365.*) — Auf steinigen Hügeln, an Waldrändern und in Gebüsch bei Mediasch, Frauendorf, Donnersmarkt, Langenthal, Tür, Klein- und Gross-Probstdorf; nicht selten.
- E. repandum L.** — Auf Aeckern, Sandwiesen und Schutt bei Marktschelken, Blasendorf und Klein-Propstdorf; nicht selten.
- Sinapis arvensis L.** — Bei Mediasch nach *Fuss Fl. Tr. n. 315.*
- S. orientalis Murr.** (*Conringia orientalis Schur pl. Tr. n. 341.*) — Auf Saat- und Brachäckern bei Marktschelken, nicht selten.
- Sinapis alba L.** — Bei Mediasch nach *Fuss Fl. Tr. n. 316.* —
- Erucastrum elongatum Rehb.** (*Eruca elongata Bgt. n. 1374.*) — An sonnig-trocknen und sandig-steinigen Hügel- und Berglehnen bei Mediasch, Eibesdorf, Frauendorf, Arbergen, Marktschelken, Kleinschelken, Abtsdorf, Scholten, Tür, Blasendorf, Langenthal, Feigendorf, Klein- und Gross-Probstdorf; häufig

- Diplotaxis muralis DeC.** (*Sisymbrium murale Bgt.* n. 1346). — An Wegen, Rainen, auf Aeckern und in Weinbergen bei Kleinkopisch, Tür, Blasendorf, Langenthal und Feigendorf; häufig.
- Alyssum calycinum L.** (*Adyseton calycinum Bgt.* n. 1314. — *Psilonema calycinum Schur* En. pl. Tr. n. 371). — Auf sandigen Aeckern, Triften und Hügeln bei Mediasch, Eibesdorf; Wurmloch, Marktschelken, Donnersmarkt, Blasendorf, Klein- und Gross-Probstdorf.
- Berteroa incana DeC.** (*Alyssum incanum Bgt.* n. 1306). — An sandigen Wegen, Flüssen, auf Wiesen und Schutt bei Mediasch, Eibesdorf, Wurmloch, Kleinkopisch, Langenthal, Klein-Probstdorf und sonst, häufig.
- Draba nemorosa L.** (*D. nemoralis Bgt.* n. 1302). — Auf sandig-trocknen Wiesen und Hügeln bei Mediasch und Klein-Probstdorf; nicht selten.
- D. verna L.** (*Erophila verna Fuss* Fl. Tr. n. 355). — Auf sandigen Feldern, Wiesen, Triften, Rainen und Hügeln bei Mediasch, Kleinkopisch, Wurmloch, Donnersmarkt, Kleinprobstdorf und sonst; stellenweise sehr häufig.
- Armoracia rusticana Fl. Wett.** (*Cochlearia Armoracia L.*) — An Gräben, Zäunen, und in Gärten bei Mediasch, Blasendorf und Langenthal.
- Camelina sativa Crtz.** (*C. sylvestris Schur* En. pl. Tr. n. 406.) — Auf Saatäckern, an unfruchtbaren Rainen und Hügeln bei Mediasch, Eibesdorf, Marktschelken, Kleinschelken, Donnersmarkt, Langenthal, Feigendorf, Klein- und Gross-Probstdorf.
- Thlaspi arvense L.** — Auf Aeckern, Schutt bei Mediasch, Marktschelken und Tür.
- T. perfoliatum L.** — Auf magern Aeckern und in Weinbergen bei Mediasch, Wurmloch, Donnersmarkt, Langenthal und Klein-Probstdorf; nicht selten.
- T. montanum L.** — Bei Mediasch nach *Fuss* Fl. Tr. n. 368. —
- Cardaria Draba Dsv.** (*Draba ruderalis Bgt.* n. 1299). — An Ackerrändern, Wegen, Flussufern im ganzen Gebiet, häufig.
- Lepidium ruderales L.** — An Wegen, Zäunen, auf Mauern und Schutt im ganzen Gebiet, häufig.
- Capsella Bursa Pastoris Moench.** — Auf Wiesen, Aeckern, Schutt, in Gärten und Weinbergen im ganzen Gebiet, gemein und in vielen Formen.
- Euclidium syriacum R. Br.** (*Bunias syr. Bgt.* n. 1291). — Auf sandigen Wiesen, an Wegen bei Gross-Probstdorf an der Kockel bei der „alten Mühle“.
- Isatis tinctoria L.** — An sonnig-trocknen kalkhaltigen Berglehnen bei Frauendorf, Marktschelken, Langenthal, Feigendorf, Klein- und Gross-Probstdorf; häufig.

- Myagrum perfoliatum L.** (*Cakile perfoliata Bgt. n. 1288*). — An Wegen, auf Aeckern und Schutt bei Mediasch, Marktschelken, Langenthal, Feigendorf und Klein-Probstdorf.
- Neslia paniculata Dsv.** (*Bunias paniculata Bgt. n. 1289*). — Auf Saatäckern bei Donnersmarkt, Langenthal und Klein-Probstdorf.
- Rapistrum perenne All.** (*Cakile perennis Bgt. n. 1286*). — Auf sandigen Aeckern, Hügeln, an Wegen, Ackerrändern bei Tür, Blasendorf, Langenthal, Feigendorf und Kleinprobstdorf; nicht selten.
- Laelia orientalis Dev.** (*Bunias orientalis L. Bgt. Nr. 1290*). — Auf Aeckern, Wiesen und in Obstgärten bei Mediasch, Donnersmarkt, Langenthal und Klein-Probstdorf; nicht selten.
- Crambe tatarica Jacq.** — An sandigen und sterilen Berglehnen bei Marktschelken, Tür, Blasendorf, Langenthal, Klein- und Gross-Probstdorf; nicht selten.
- Raphanistrum segetum Bgt.** — Auf Aeckern, Schutt und in Weinbergen im ganzen Gebiet, sehr häufig.

V. CISTINEAE DUNAL.

- Helianthemum vulgare Gaertn.** — Auf sonnigen Hügeln, Bergen, Abhängen und an Waldrändern im ganzen Gebiet, häufig.

VI. VIOLARIEAE DEC.

- Viola palustris L.** — Bei Mediasch nach *Fuss Fl. Tr. n. 422*.
- V. hirta L.** — In Gebüschern, Feldbaumgärten und Hecken bei Mediasch, Eibesdorf, Wurmloch, Marktschelken, Blasendorf, Langenthal, Klein- und Gross-Probstdorf; häufig.
- V. odorata L.** — In Hecken, Gebüschern, Feld- und Hausgärten in mehreren Formen im ganzen Gebiet sehr häufig.
- V. praecox Heuff.** (*V. alba Bess. — Schur En. pl. Tr. n. 489.*) — In Gebüschern und Wäldern bei Mediasch im „Leyrisch und Bussderthal“; bei Klein-Propstdorf in den „Schräven“; nicht selten.
- V. sylvestris Lam.** (*V. canina Bgt. n. 384*). — In Gebüschern und Wäldern bei Mediasch, Scholten, Langenthal, Klein- und Gross-Probstdorf; nicht selten.
- V. Riviniana Rehb.** — In schattigen Wäldern bei Mediasch im „Grevlen, Blasengrund, Weberln, Leyrisch, und Bussderthal“; bei Donnersmarkt im „Kirchenwald“; bei Langenthal, Klein- und Gross-Probstdorf; sehr häufig.
- V. canina L.** (*V. montana Bgt. n. 385*). — Auf grasigen Hügeln, in Gebüschern und Feldbaumgärten bei Mediasch, Langenthal, Klein- und Gross-Probstdorf; nicht selten.
- V. elatior Fr.** — In schattigen Wäldern bei Blasendorf im „Bischofswäldchen“.

- V. mirabilis* L. — In Gebüsch und Wäldern bei Mediasch, Wurmloch, Langenthal und Feigendorf.
V. tricolor L. — Auf Aeckern und Wiesen bei Mediasch, Kleinkopisch und Klein-Probstdorf.
V. tricolor, var. *arvensis* Murr. (*Viola bicolor* Bgt. n. 391. — *V. segetalis* Schur En. pl. Tr. n. 507). — Auf Aeckern im ganzen Gebiet, häufig.
V. tricolor, var. *Kitaibeliana* Schult. — Auf deren sandigen Hügeln und Bergabhängen bei Klein-Probstdorf; nicht selten.

VII. RESEDACEAE DEC.

- Reseda Luteola* L. (*Luteola resedoides* Fuss Fl. Tr. n. 452.) — An durren Rainen, Hügeln und an Flussufern. Bei Donnersmarkt über dem „Kirchenwald“; bei Blasendorf über den bischöflichen Weinbergen und bei Klein-Probstdorf an der Kockel; nicht selten.

VIII. DROSERACEAE DEC.

- Parnassia palustris* L. — Auf feuchten Triften, Hügeln und Bergabhängen bei Mediasch im „Ober-Ungergrund“ und bei Gross-Probstdorf; nicht selten.

IX. POLYGALEAE JUSS.

- Polygala major* Jacq. — Auf sonnigen Bergwiesen bei Mediasch, Eibesdorf, Wurmloch, Arbeggen, Marktschelken, Kleinschelken, Scholten, Donnersmarkt, Blasendorf, Klein- und Gross-Probstdorf; nicht selten.
P. vulgaris L. — Auf Wiesen, Weiden, in Gebüsch und an Waldrändern im ganzen Gebiet, nicht selten.
P. comosa Schkh. — An sonnig trocknen Berglehnen bei Scholten am „hohen Berg“, nicht selten.
P. amara L. — Bei Mediasch nach Fuss Fl. Tr. n. 463. *)—

X. SILENEAE DEC.

- Gypsophila fastigiata* L. (*G. arenaria* Bgt. n. 777). — An sonnig-trocknen, sandigen Hügeln und Bergabhängen bei Mediasch am „Zigeunerberg“, häufig. — Prachtexemplare!
G. muralis L. — Auf feuchten Aeckern, Holzschlägen und an Flussufern im ganzen Gebiet, häufig.
Kohlruschia prolifera Ficin. (*Dianthus prolifer* L. — Bgt. n. 788). — An trocknen, sandigen, unfruchtbaren Rainen, Hügeln und Abhängen bei Mediasch am Kokelufer gegen Darloss und an Rainen gegen den „Meschner Grund“; bei Frauendorf im „Hom“ und bei Klein-Probstdorf beim „Königs-sattel“; nicht selten.

*) Diese Pflanze ist näher zu besehen; ich glaube, die wahre *Polygala amara* L. kommt auf Mediascher Gebiet nicht vor!

- Dianthus Armeria L.** — Auf Waldwiesen, an Waldrändern und in Gebüsch bei Mediasch, Frauendorf, Arbeggen, Marktschelken, Donnersmarkt, Langenthal und Klein-Probstdorf.
- D. Carthusianorum L.** — Auf Wiesen, Hügeln und in Gebüsch im ganzen Gebiet, nicht selten.
- D. superbus L.** — Auf schattigen Waldwiesen bei Langenthal und Feigendorf.
- Vaccaria pyramidata Fl. W.** — Auf Saatäckern bei Donnersmarkt, Blasendorf und Gross-Probstdorf.
- Saponaria officinalis L.** — Auf Wiesen, an Hecken und Ufern bei Mediasch, Marktschelken, Kleinschelken, Scholten, Donnersmarkt, Langenthal, Klein- und Gross-Probstdorf; einzeln, zerstreut.
- Cucubalus bacciferus L.** — An Hecken, Zäunen und Gebüsch bei Mediasch, Arbeggen, Kleinschelken, Scholten, Donnersmarkt, Blasendorf, Langenthal, Klein- und Gross-Probstdorf; nicht selten.
- Silene inflata Sm.** (*Viscago Behen Bgt. n. 804*). — Auf Wiesen, Aeckern, in Gebüsch und an Waldrändern bei Mediasch, Wurmloch, Kleinschelken, Donnersmarkt, Langenthal, Feigendorf und Klein-Probstdorf.
- S. viscosa Pers.** (*Viscago glutinosa Bgt. n. 805*). — Auf Bergwiesen bei Mediasch, Wurmloch, Donnersmarkt, Langenthal und Klein-Probstdorf.
- S. otites Sm.** (*V. Otites Bgt. n. 808*). — Auf sandigen Hügeln, Rainen, Wiesen und Mauern bei Mediasch, Frauendorf, Kleinschelken, Donnersmarkt, Langenthal und sonst, nicht selten.
- S. dichotoma Ehrh.** — Bei Mediasch nach *Fuss Fl. Tr. n. 528*.
- S. italica Pers.** — An steinigen Hügeln und Waldrändern bei Langenthal im „Steinloch“, häufig. — Prachtexemplare!
- S. nutans L.** — Auf trocknen Wiesen, Hügeln und an Waldrändern bei Mediasch, Kleinkopisch, Wurmloch, Kleinschelken, Abtsdorf, Langenthal, Gross-Probstdorf und sonst, nicht selten.
- S. chlorantha Ehrh.** — Auf sandigen Hügeln und Bergen bei Mediasch, Arbeggen, Marktschelken, Scholten, Langenthal, Klein- und Gross-Probstdorf; nicht selten.
- S. Armeria L.** — Auf sandigen Wiesen und Hügeln bei Mediasch im evangel. „Leichgarten“ und bei Frauendorf im „Hom“.
- S. noctiflora L.** (*Melandryum noctiflorum Schur En. pl. Tr. n. 629*). — Auf Wiesen, Aeckern und an Wegen bei Mediasch, Langenthal und Kleinprobstdorf.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1867

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Barth Josef

Artikel/Article: [Systematische Aufzählung der im grossen Kockelthale zwischen Mediasch und Blasendorf wildwachsenden Pflanzen 21-31](#)