

Systematische Aufzählung
der im grossen Kockelthale zwischen Mediasch und Blasendorf
wildwachsenden Pflanzen

von

JOSEF BARTH,
 ev. Pfarrer A. B. in Langenthal.

- Viscaria vulgaris* *Rohl.* (*Lychnis Viscaria* *Bgt.* n. 867). — In Gebüsch, Wäldern und auf Waldwiesen bei Mediasch, Langenthal und Klein-Probstdorf; nicht selten.
- Coccyganthe Flos Cuculi* *Rchb.* (*C. pratensis* *Schur* *En. pl.* Tr. n. 631). — Auf feuchten Wiesen bei Mediasch, Wurmloch, Langenthal, Klein- und Gross-Probstdorf; nicht selten.
- Melandrium pratense* *Rohl.* (*Lychnis arvensis* *Bgt.* n. 869). — Auf Wiesen, Aeckern und an Zäunen bei Mediasch, Frauendorf, Arbegen, Abtsdorf, Langenthal und Klein-Probstdorf.
- Githago segetum* *Dsf.* (*Agrostemma Githago* *Bgt.* n. 864). — Auf Saatäckern im ganzen Gebiet einzeln, zerstreut.

XI. ALSINEAE DEC.

- Sagina procumbens* *L.* — Auf Aeckern, Weiden und auf Holzschlägen bei Mediasch, Kleinkopisch, Wurmloch, Marktschelken, Abtsdorf, Klein- und Gross-Probstdorf; nicht selten.
- Spergula arvensis* *L.* — Auf sandigen Maisäckern bei Mediasch am „Eibersberg“ und bei Wurmloch nicht selten.
- Lepigonum rubrum* *Whlbg.* (*Arenaria rubra* *Bgt.* n. 837). — Auf feuchten, sandigen Aeckern und Wiesen bei Kleinkopisch, Frauendorf und Blasendorf auf dem „Kimpu liberteti“; häufig.
- L. marginatum* *Koch.* (*Arenaria marina* *Bgt.* n. 838). — Auf Salzboden und salzigfeuchten Wiesen bei Marktschelken gegen Wassid und bei Tür beim Salzbrunnen; häufig.
- Moehringia trinervia* *Clairv.* — (*Arenaria trinervia* *Bgt.* n. 834). — In feuchten schattigen Gebüsch und Wäldern bei Mediasch und Kleinprobstdorf.
- Arenaria serpyllifolia* *L.* — Auf Aeckern und an Wegen bei Mediasch im Bussderthal, Meschner Grund und an sonnigen Rainen auf den „Krähenwiesen“, häufig.
- Eremogene procera* *Rchb.* (*Arenaria graminifolia* *Bgt.* n. 845). — Auf grasigen Bergen bei Mediasch auf dem „Hirseberg“ und bei Scholten auf dem „hohen Berg“; nicht selten.
- Holosteum umbellatum* *L.* — Auf sandigen Wiesen, Aeckern, Rainen und Hügeln bei Mediasch, Langenthal und Klein-Probstdorf; nicht selten.

- Dichodon anomalum** *Rchb.* (*Cerastium anomalum* *Bgt.* n. 873). — Auf feuchten, sandigen Wiesen und Aeckern bei Scholten, Donnersmarkt und Langenthal; nicht selten.
- Stellaria nemorum** *L.* — Bei Mediasch nach *Fuss* Fl. Tr. n. 604.
- St. media** *Vill.* — (*Alsine media* *Bgt.* n. 565). — Auf Aeckern, in Gärten, Weinbergen u. s. w. im ganzen Gebiet in mehreren Formen; häufig.
- St. Holostea** *L.* — In Wäldern und Gebüsch im ganzen Gebiet, häufig.
- St. graminea** *L.* (*Larbrea graminea* *Fuss* Fl. Tr. n. 611). — Auf Wiesen, Aeckern, in Gebüsch und Wäldern im ganzen Gebiet, nicht selten.
- Malachium aquaticum** *Fr.* (*Cerastium aquaticum* *Bgt.* n. 879.) — Auf feuchten Stellen, an Hecken, Zäunen, Quellen, Bächen und Gräben in mehreren Formen im ganzen Gebiet, nicht selten.
- Cerastium glomeratum** *Thuill.* (*C. vulgatum* *Bgt.* n. 872). — Auf feuchten Wiesen und Brachäckern bei Mediasch im „Meschner Grund“ und bei Donnersmarkt; nicht selten.
- C. brachypetalum** *Desp.* — Auf sandigen Aeckern, Rainen und Hügeln bei Mediasch auf der „Pfarrerswiese, Galgenberg“ und sonst, nicht selten.
- C. semidecandrum** *L.* — Bei Mediasch nach *Fuss* Fl. Tr. n. 619.
- C. glutinosum** *Fr.* — Auf sandigen Aeckern, Grasplätzen, Hügeln und Bergen bei Mediasch auf dem „Galgenberg, Vogelstange“ und sonst; bei Klein-Probstdorf gegen die „Burg“; häufig.
- C. triviale** *LK.* (*C. viscosum* *Bgt.* n. 874). — Auf Aeckern, Wiesen, an Wegen in mehreren Formen im ganzen Gebiet; nicht selten.
- C. sylvaticum** *W. K.* — In feuchten schattigen Wäldern und Feldbaumgärten bei Mediasch im „Leyrisch, Weberln“ und sonst, häufig.

XII. ELATINEAE CAMBES.

- Elatine Alsinastrum** *L.* (*Alsinastrum galiifolia* *Schur* En. pl. Tr. n. 730). — In und an Teichen und Lacken bei Frauendorf im „Gemeindewald“; bei Blasendorf am „Kerektó“ und bei Langenthal am „Weiher“; häufig.

XIII. LINEAE DEC.

- Linum flavum** *L.* (*Xantholinum flavum* *Fuss* Fl. Tr. n. 641). — Auf sonnigen Hügeln und Bergen bei Mediasch, Eibsdorf, Wurmloch, Frauendorf, Marktschelken, Abtsdorf, Scholten, Langenthal, Feigendorf, Klein- und Gross-Probstdorf; häufig.
- L. hirsutum** *L.* — Ebendasselbst, aber nicht so häufig.

- L. nervosum* W. K. — Auf trocknen Hügeln bei Tür. —
L. usitatissimum L. — Auf wüsten Aeckern verwildert bei Mediasch und Langenthal.
L. austriacum L. — An Wegen, Ackerrändern und auf Wiesen bei Mediasch, Eibesdorf, Arbegen, Kleinschelken, Scholten, Donnersmarkt, Langenthal, Klein- und Gross-Probstdorf; einzeln, zerstreut.
L. tenuifolium L. (*Cathartolinum tenuifolium* Rchb. — *Fuss* Fl. Tr. n. 653.) — An sonnig-trocknen Hügeln und Berglehnen bei Mediasch am „Zigeunerberg und Hirseberg;“ bei Marktschelken, Abtsdorf, Scholten am „hohen Berg“; bei Langenthal im „untern und obern Baierlen“; nicht selten.
L. catharticum L. (*C. pratense* Rchb. — *Fuss* Fl. Tr. n. 654. — *Schur* En. pl. Tr. n. 745). — Auf Wiesen und Triften bei Mediasch, Donnersmarkt Klein- und Gross-Probstdorf; häufig.

XIV. MALVACEAE JUSS.

- Malva sylvestris* L. — An Wegen, Flüssen, auf Triften und Aeckern im ganzen Gebiet nicht selten.
M. vulgaris Fr. (*M. rotundifolia* Bgt. n. 1435). — An Wegen, Bachufern, in Höfen u. s. w. im ganzen Gebiet, gemein.
M. borealis Wall. (*M. parviflora* Schur Sertum n. 579). — An Strassen, an Zäunen, auf Schutt bei Tür beim Salzbrunnen und bei Blasendorf; nicht selten.
Althea officinalis L. — Auf Wiesen, an Gräben Hecken und Zäunen bei Mediasch, Marktschelken, Klein- und Gross-Probstdorf; nicht selten.
A. cannabina L. — Auf buschigen Hügeln bei Klein-Probstdorf im „Hehves“, häufig.
A. hirsuta L. — Auf trocknen Hügeln bei Scholten am „hohen Berg“ und bei Langenthal am „Rabenkopf“.
A. rosea Willd. — (*Alcea rosea* L. — *Fuss* Fl. Tr. n. 665. — *Schur* En. pl. Tr. n. 753). — Auf etwas feuchten Wiesen zwischen Weidengebüsch bei Mediasch, Frauendorf, Marktschelken, Kleinschelken, Langenthal und sonst.
Lavatera thuringiaca L. (*Olbia thuringiaca* *Fuss* Fl. Tr. n. 666). — An Wegen, Rainen, Hügeln und Waldrändern bei Mediasch, Frauendorf, Abtsdorf, Donnersmarkt, Feigendorf und Klein-Probstdorf.
Hibiscus Trionum L. *) — Auf Saat- und Brachäckern bei Mediasch, Wurmloch, Kleinschelken, Abtsdorf, Scholten, Donnersmarkt, Tür, Blasendorf, Langenthal, Feigendorf, Klein- und Gross-Probstdorf und sonst, sehr häufig.

*) Die Behauptung von M. Salzer in seinen „Reisebildern aus Siebenbürgen“ pag. 48 unten, dass diese Pflanze im Grosskokegebiet nicht vorkomme, ist hiernach zu berichtigen.

XV. TILIACEAE JUSS.

- Tilia parvifolia Ehrh.* — Bei Mediasch, Blasendorf und sonst, angepflanzt.
T. grandifolia Ehrh. — Ebendasselbst, angepflanzt.

XVI. HYPERICINEAE DEC.

- Hypericum perforatum L.* — Auf Wiesen, Aeckern, in Gebüsch und Wäldern im ganzen Gebiet, nicht selten.
H. tetrapterum Fr. (*H. quadrangulare Bgt.* n. 1602). — An Quellen, in Sümpfen bei Mediasch, nicht selten.
H. elegans Steph. (*H. Kohlianum Bgt.* n. 1611. — *Schur* En. pl. Tr. n. 776). — Auf trocknen Hügeln und Bergen bei Kleinschelken, Marktschelken, Tür, Blasendorf, Langenthal, Feigendorf, Klein- und Gross-Probstdorf; häufig.
H. montanum L. — In schattigen Bergwäldern bei Mediasch, Langenthal und Klein-Probstdorf.
H. hirsutum L. — In Gebüsch, Wäldern und auf Bergwiesen bei Mediasch, Donnersmarkt auf dem „Flecken“ und bei Blasendorf im Bischofswäldchen“.

XVII. ACERINEAE DEC.

- Acer Pseudo-plantanus L.* — In Wäldern bei Wurmloch, Langenthal und Feigendorf.
A. plantanoides L. — In Wäldern bei Mediasch, Marktschelken, Langenthal, Klein- und Gross-Probstdorf.
A. campestre L. — In Wäldern, Gebüsch, an Hecken und Zäunen im ganzen Gebiet, häufig.
A. tataricum L. (*A. cordifolium Bgt.* n. 697). — In Wäldern und Gebüsch bei Mediasch, Abtsdorf, Scholten, Donnersmarkt, Langenthal, Feigendorf, Klein- und Gross-Probstdorf.

XVIII. HIPPOCASTANEAE DEC.

- Aesculus Hippocastanum L.* — Bei Mediasch auf der Promenade, angepflanzt.

XIX. AMPELIDEAE H. B. et K.

- Vitis Labrusca L.* — In Wäldern und Gebüsch bei Langenthal, Feigendorf, Klein- und Gross-Probstdorf; häufig.
Ampelopsis hederacea Mchx. — Bei Mediasch an alten Mauern, nicht selten.

XX. GERANIACEAE DEC.

- Geranium phaeum L.* — In Gebüsch, Wäldern, Hecken und Feldbaumgärten bei Mediasch, Wurmloch.
G. pratense L. — Auf feuchten Wiesen bei Mediasch, Eibsdorf, Donnersmarkt, Tür, Feigendorf und sonst nicht selten.
G. palustre L. — Auf sumpfigen Waldwiesen und in feuchten Gebüsch bei Mediasch, Wurmloch, Marktschelken, Abtsdorf und Feigendorf.

- G. sanguineum* L. — Auf sonnigen, buschigen Hügeln und Bergen bei Mediasch, Abtsdorf, Langenthal, Feigendorf, Klein- und Gross-Probstdorf; nicht selten.
- G. pusillum* L. — Auf Aeckern, in Gärten, an Zäunen, auf Schutt bei Mediasch, Kleinkopisch, Wurmloch, Kleinschelken, Scholten, Blasendorf, Langenthal und sonst.
- G. dissectum* L. — Auf sonnigen Aeckern bei Mediasch, Blasendorf, Langenthal, Feigendorf und sonst.
- G. columbinum* L. — An Wegen, auf Schutt und Brachäckern bei Mediasch und Klein-Probstdorf.
- G. rotundifolium* L. — Auf Aeckern, Triften, an Wegen und Zäunen bei Mediasch, Langenthal und Klein-Probstdorf.
- G. Robertianum* L. — In feuchten Gebüschern und Wäldern bei Mediasch, Eibesdorf, Wurmloch, Marktschelken, Scholten, Blasendorf, Langenthal, Klein- und Gross-Probstdorf und sonst; nicht selten.
- Erodium cicutarium* L'Herit. — Auf Wiesen, Triften, Aeckern und Schutt in mehreren Formen im ganzen Gebiet, häufig.

XXI. BALSAMINEAE A. RICH.

- Impatiens Noli tangere* L. — In feuchten schattigen Wäldern bei Mediasch im „Grevlen und Weinsbuchen“ am Bach, nicht selten.

XXII. OXALIDEAE DEC.

- Oxalis Acetosella* L. — In schattig feuchten Wäldern und Gebüschern bei Mediasch, Wurmloch, Frauendorf, Arbegen, Abtsdorf, Langenthal, Feigendorf, Klein- und Gross-Probstdorf; nicht selten.

XXIII. RUTACEAE JUSS.

- Ruta graveolens* L. — Bei Mediasch nach *Bgt.* n. 729. —
- Haplophyllum Biebersteinii* Spach. *Fuss* Fl. Tr. n. 721. (H. *Buxbaumii* Schur En. pl. Tr. n. 831). — Bei Blasendorf nach (Lerchenfeld herb. Transs. 1785) den obigen Citaten.
- Dictamnus Fraxinella* Pers. (D. *albus* *Bgt.* n. 728). — Auf sonnigen Hügeln und Bergen bei Mediasch, Wurmloch, Marktschelken, Scholten, Langenthal, Klein- und Gross-Probstdorf; nicht selten.

XXIV. CELASTRINEAE R. BR.

- Staphylea pinnata* L. — In Gebüschern und an Waldrändern bei Mediasch, Wurmloch, Abtsdorf, Scholten und Gross-Probstdorf.
- Evonymus europaeus* L. — In Gebüschern, an Hecken und Zäunen im ganzen Gebiet, häufig.
- E. verrucosus* Scop. — Ebendasselbst, aber nicht so häufig als Vorige.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1867

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Barth Josef

Artikel/Article: [Systematische Aufzählung der im grossen Kockelthale zwischen Mediasch und Blasendorf wildwachsenden Pflanzen 47-51](#)