

Verzeichniss

der Land- und Süsswasser-Mollusken Siebenbürgens.

Fortsetzung von Nro. 1.

Helix lamellata. *Bielz.*

Gehäuse sehr klein, horngelb, durchsichtig, glänzend; das Gewinde oben sehr flach spitzig, unten gewölbter, gegen den Nabel zusammengedrückt; Nabel ziemlich offen und tief; die 5 durch eine tiefe Nath vereinten Umgänge sind mit häutigen Rippen geziert; der letzte Umgang zeigt abwärts einen stumpfen Kiel; die Mündung ist gedrückt, mondförmig, breiter als hoch; der Mundsaum einfach, gerade aus und scharf. H. $\frac{1}{4}$ ''' ; Br. $1\frac{1}{4}$ ''' . — Diese Schnecke unterscheidet sich von *H. scarburgensis* Fust, Rossm. VII. VIII. p. 37. F. 533. durch eine niedere Höhe im Verhältniss zur Breite, und sonach durch ein flacheres Gewinde. — Fundort am Rothenthurmerpass an Felsen. Im October 1849 durch H. Daniel Czekelius in 2 Exemplaren entdeckt.

lucida. *Drap.* — Hermannstadt, Klausenburg, Gurariu, Kerz, Tömöcher Pass.

nitens. *L. Mich.* — Tömöcher Pass.

nitidosa. *Pfeiff.* — Kerzeschora, Tömöcher Pass.

pygmaea. *Drap.* — Hermannstadt.

rotundata. *Muell.* — " "

ruderata. *Stud.* — Praeschbe, Götzenberg, Heltau, Kerzeschora, Pojana niamzului.

rupestris. *Drap.* — Petrosz, Törzburger Pass.

aethyops. *Bielz.*

Thier: tiefglänzend, braunschwarz, nur die Spitzen der nicht sehr schlanken Fühler und die Fusssohlen büsterbraun ins Graue, Rücken mit länglichen Strichelchen grob gekörnt.

Gehäuse: etwas gedrückt, kugelig, aus $5\frac{1}{2}$ durch eine ziemlich tiefe Nath verbundenen, mit Querrunzeln bedeckten Umgängen, sehr dünn und zerbrechlich, glänzend, büsterbraun bis schwarz, gegen den Wirbel zu gelblich oder grünlich; bedeckt gegen Nabel, jedoch offen; Mundsaum zurückgebogen, mit einer nicht sehr starken, weissen Lippe belegt;

- Mündung mondförmig, beinahe breiter, wie hoch. H. $4\frac{1}{2}$ — $5''$, Br. $9''$. — Fundort: Auf dem Gebirge Negoi, Olán, am Bula Sec auf dem Arpascher Gebirge, Czibles (Bistritzer District).
- aculeata*. Müll. — Heltau, Hammersdorf.
- carthusianella* Drap. — Klausenburg, Szamosfalva, Reschinar, Veszöd, Kerz.
- circinata*. Stud. — Michelsberg.
- ericetorum*. Müll. — Deva, V. Hunyad, Rothberg, Csergid, Szátsva, Klausenburg, Szentelke, M. Solymos, Talmesch, Kerz, Hahnebach, Stolzenburg, Grossscheuern, Langendorf bei Mühlbaeh.
- cereoflava*. Bielz.
- G e h ä u s e**: etwas kugelig niedergedrückt, mit kegelförmig erhobenem Gewinde, ziemlich fest und undurchsichtig, ziemlich stark und regelmässig rippenstreifig, mit einem schwachen Kiel, der sich gegen die Mündung verliert, oben schön wachsgelb unten etwas heller; mit einer Andeutung von 3 Längsstreifen aus grauen Fleckenreihen; von den 5 gerundeten und durch eine ziemlich tiefe Nath vereinigten Umgängen ist der letzte gegen die Mündung hin allmählig erweitert; Mündung rund mondformig; Mundsaum geradeaus, scharf, innen mit einer schwachen, wenig ausgeprägten Lippe belegt; Nabel offen, aber nicht bis zur Spitze gehend, um denselben ist die letzte Windung etwas zusammengedrückt. H. $2\frac{1}{2}''$; Br. $5''$. Fundort BIRTHÄLM.
- fruticum*. Müll. — Hermannstadt, A. Szombath, Klausenburg, Hondorf, Ponor, Kerz, Kis Kend, Körnez, Csergid.
- hispida*. Müll. — Hermannstadt, A. Szombath, Kerz, Tömösher Pass.
- incarnata*. Müll. — Hermannstadt, Talmesch.
- leucozona*. Ziegl. — A. Szombath.
- lurida*. Ziegl. — Dees, BIRTHÄLM, Schässburg.
- sericea*. Drap. — Heltau, Michelsberg.
- strigella*. Drap. — Hermannstadt, Michelsberg, A. Szombath, Mergeln, BIRTHÄLM, Talmesch, Tömöscher Pass.
- striata*. Drap. — Thorda, Marktschelken, Csergid, BIRTHÄLM, Hermannstadt, Szász-Almar, Ditro, Szárhelgy, Reichesdorf, Kerz, Veszöd, Stolzenburg, Talmesch.
- tecta*. Ziegl. — A Szombath, Michelsberg, Schässburg, Gurariu, Kerzeschora. Tömöscher Pass.

umbrosa. *Partsch.* — Michelsberg.
 candidula. *Stud.* — Perschan, Ditro, Szárhegy.

B u l i m u s. *Brug.*

montanus. *Drap.* — Bâtsfalva, A. Szombath, Dregusch-Gebirge, Praeschbe, Czibles, Schässburg, Kerzschora, Tömöscher Pass.

assimilis, *Ziegl.* — Déés Romos.

obscurus. *Müll.* — Almás, Heltau, BIRTHÄLM, Hermannstadt, Hahnebach, Tömöscher Pass, Pojana niamzului.

revolutus. *Ziegl.* — Rosenau, Tömöscher Pass, Pojana niamzului.

radiatus. *Brug.* — Marienburg bei Kronstadt.

A c h a t i n a. *Lam.*

lubrica. *Brug.* — Hermannstadt, Schässburg, Kerzschora, Michelsberg, Hammersdorf.

P u p a *Drap.*

doliolum. *Brug.* — Hammersdorf, Michelsberg, Reschinar.

minutissima. *Hartm.* — Hermannstadt, Talmesch.

muscorum. *Nils.* — Hermannstadt, Hammersdorf, Schässburg, Michelsberg, Kerz, Talmesch.

dolium. *Drap.* — Hammersdorf, Michelsberg.

avena. *Drap.* — Poplaka, Petrosz, V. Hunyád, A. Rakos, Piatre arsze, Kronstadt, Rosenau, Tömöscher Pass.

frumentum. *Drap.* — Sz. Almas, BIRTHÄLM, Reichesdorf, V. Hunyád, Talmesch, Rosenau, Kerz, Langendorf.

secale. *Drap.* — Petrosz, Poplaka, Tömöscher Pass, Piatre arsze.

tridens. *Drap.* — BIRTHÄLM, Mediasch, Marktschelken, Reichesdorf, Kleinschenk, Mergeln, Hammersdorf, Hahnebach, Talmesch, Michelsberg, Kerz, Langendorf.

truncatella. *Pfeiff.* — Csaki Gorbo.

C l a u s i l i a. *Drap.*

bidens. *Drap.* — BIRTHÄLM, Heltau, Hahnebach, Michelsberg, Hermannstadt, Hammersdorf, Grossschenk (var. granatina), Talmatsch (var. granatina), Ponor (v. Parreyssüz), Romosz, Gurariu, Schässburg, Kerzschora (v. fimbriata.)

Bielzii *Parr.* —

T h i e r: büsterbraun, die oberen Fühler und Fusssohlen heller, Augen schwarz.

Gehäuse: spindelförmig, ziemlich bauchig, in eine nicht sehr schlanke, etwas stumpfe Spitze verschmälert; hellhornfarb ins graue und wie bereift (weiss angelaufen), matt, nur der Wirbel glänzend; 9—10 durch eine wenig vertiefte Nath geschiedene, schwach gewölbte Umgänge, welche durch weit auseinanderstehende, oben an der Nath durch weisse Streifelchen wie Papillen gezierten Rippen besetzt, und dazu rechts gewunden sind. Mündung eirund birnförmig, höher wie breit, ohne Einbug an der oberen Lamelle, ziemlich weit, mit einem schwachen Nabelritz, Mundsaum breit, zurückgebogen, wulstig, schmutzigweiss, innen bräunlich, wenig abstehend, die obere Lamelle klein, zurücktretend, unten bogenförmig, aufwärts stark vortretend, drei beinahe gleich lange, deutlich heraustretende Gaumenfalten, zwischen der zweiten und untern noch eine kleine punktförmige, Mondfalte fehlt; der Nacken etwas aufgetrieben, faltenstreifig, unten in einen kurzen, wenig deutlichen Kiel endigend. Das ganze Gehäuse zart, durchscheinend. H. 8^{'''}; Br. 2^{'''}. — V. Hunyád.

cerata. Rossm. — Michelsberg, Reschinar, Hermannstadt, Praeschbe.

elata. Ziegl. — A. Szombath, Hermannstadt, Michelsberg, Heltau, Reschinar, Girelsau; Ob. Sebes, Bungard, Westen, Kerzeschora, Zood, Tömösser Pass.

fallax. Rossm. — Heltau, Hermannstadt, Rothenthurmerpass, Reschinar, Michelsberg, Kérollyer Sauerbrunnen, Czibles, Schässburg, Gurariu.

filograna. Ziegl. — Boitza am Rothenthurm, Tömösch Pass, Talmesch.

fimbriata. Ziegl. — Kerzeschora.

frandigera. Parr. — Grossschenk, Talmesch.

livida. Menke. — Kronstadt, Piatre arsze.

macilentata. Rossm. — Tömösch Pass.

marginata. Rossm. — Rothenthurmerpass. A. Rákos, Kérollyer Sauerbrunnen, Ob. Sebes, Michelsberg, Kerzeschora, Talmesch, Reschinar.

pagana. Ziegl. — Petrosz.

plicata. Drap. — Grossschenk, Déés, Birthälm, Talmesch, Rothenthurmpass, Csicso, Schässburg, Tömösch Pass, Rosenau, Törzburger Pass, Hahnebach, Csáki Gorbo.

plicatula. Ziegl. — Ob. Sebes, Rothenthurmpass, Michelsberg, piatra arsze, Schässburg, Czibles, Gurariu, Kerzeschora, Talmesch, Tömöcher und Törzburger Pass.

plumbea. Rossm. — Deva, Kronstadt, Rosenau, Törzburg, Romosz, Perschan.

pumila. Ziegl. — Michelsberg, Hermannstadt, Hammersdorf, Talmesch, Bungard, Schässburg, Mediasch.

pusilla. Ziegl. — Hermannstadt, Birtihalm, Michelsberg, Bungard, Hahnbach, Rothenthurmpass, Mediasch, Tömöcher Pass.

regalis. Parr.

Thier: Kopf und Nacken dunkelbraun, Fühler heller, Augen schwarz.

Gehäuse: mit einem Nabelritz, spindelförmig, etwas bauchig mit verschmälerter Spitze, hellhornfarb, durchscheinend, nicht glänzend, und meist wie beduftet; die II. wenig gewölbten Umgänge durch eine ziemlich tiefe Nath verbunden, in welcher ein weisser Faden mit Papillen fortläuft, aus den Papillen kommen unregelmässige Rippenstreifen. Nacken etwas aufgetrieben, runzelig, weisslich. Mundsaum zurückgehoben, weiss, wulstig, verbreitert; Mündung birnförmig, obere Lamelle von dem Mundsaum zurücktretend, untere beträchtlich bogig. Im Gaumen unter der Nath eine lange Gaumenfalte, darunter eine kürzere divergirende und eine dritte punktförmige unter der kleinen undeutlichen Mondfalte, Spindelfalte vortretend. H. 8^{'''}. Br. 2^{'''}. — Tömöcher Pass.

rugosa. Parr. — Birtihalm, Ob. Sebes, Rothenthurmpass, Reschinar, Michelsberg, Csicso, Tömöcher Pass.

saturata. Ziegl. — Ponor, Michelsberg, Kerzeschora.

similis. Charp. — Hermannstadt, Michelsberg, Talmesch, Gurariu, Romosz, Tömöcher Pass, Czibles.

taeniata. Ziegler. — Ob. Sebes, Csicso, Praeschbe, Schässburg, Kerzeschora, Csaki Gorbo, Rothenthurm, Tömöcher und Törzburger Pass.

tenuilabris. Rossm. — Gyalu bei Klausenburg.

turgida. Ziegl. — Michelsberg, Praeschbe, Ob. Sebes, Hermannstadt, Dreguscher Gebirge, Tömöcher Pass, Kerzeschora.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1851

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Verzeichniss der Land- und Süßwasser-Mollusken Siebenbürgens \(Fortsetzung\). 55-59](#)