

Zur Kryptogamenflora Siebenbürgens

VON

Michael Fuss.

(Schluss.)

- Aecidium Asperifolii Pers.*, auf *Onosma* H. B.
 „ *Grossulariae DeC.*, auf *Ribes rubrum* H. B.
 „ *punctatum Pers.*, auf *Anemone ranunculoides* H. B. bei Stolzenburg F.
 „ *leucospermum DeC.*, auf *Anemone racemosa* H. B. bei Stolzenburg F.
 „ *Thesii Desv.*, auf *Thesium Linophyllum* bei Grossscheuern F.
 „ *Ranunculaceorum DeC.*, a. *Ranunculi* auf *Ranunculus binatus* bei Hermannstadt F.
 „ „ b. *Ficariae* auf *Ficaria ranunculoides* H. B.
 „ „ c. *Aquilegiae* auf *Aquilegia vulgaris* H. B.
 „ „ d. *Aconiti* auf *Aconitum paniculatum* beim Duscher Pass F.
 „ „ e. *Clematidis* auf *Clematis erecta* H. B. bei Grossscheuern F.
 „ *Falcaria DeC.*, auf *Critomus agrestis* H. B. bei Hammersdorf und Grossscheuern.
 „ *Euphorbiae Pers.*, auf *Euphorb. Cyparissias* H. B. bei Hermannstadt, Nenderf, Michelsberg, Thalheim, Hammersdorf, auf *Euphorb. salicifolia* bei Rothberg, BIRTHÄLM, auf *Euph. procera* bei Hermannstadt F.
 „ *elongatum Lk.* a. *Rhamni* auf *Rham. cathartica* bei Schässburg H. B.
 „ „ d. *Berberidis* auf *Berberis vulgaris* bei Schässburg H. B.
 „ *cornutum Pers.* d. *Sorbi* auf *Sorbus Aucuparia* H. B.
Cronartium asclepiadeum Fr., auf *Vincetoxicum officinale* bei Grossscheuern F.
Roestelia cancellata Rebent., auf *Pyrus communis* H. B.
Puccinia Graminis Pers., auf *Agropyrum repens* bei Grossscheuern F.

- „ *Circaeae Pers.*, auf *Circaea lutetiana* bei Nagy-Bunn H. B.
- „ *Betonicae DeC.*, auf *Betonica officinalis* bei Tallmesch F.
- „ *prunorum Lk.*, auf *Prunus domestica* im Herbst H. B. S. bei Grossscheuern sehr häufig F.
- „ *Anemones Pers.*, auf *Anemone nemorosa* H. B., auf *Pulsatilla vulgaris* bei Tallmesch F.
- Phragmidium incrassatum Lk.* a. *Rosarum* auf *Rosa centifolia* H. B. S. bei Grossscheuern F.
- „ „ b. *Ruborum* auf *Rubus idaeus* H. B. bei Grossscheuern F.
- „ *obtusum S. & K.* a. *Potentillae* auf *Potent. argentea* und *verna* H. B.
- Septaria Ulmi Fr.*, auf *Ulmus campestris* H. B.
- Tubercularia vulgaris Tode.*, auf *Pyrus malus*, *Prunus domestica*, *Ribes rubrum* bei Grossscheuern und Neudorf F.
- „ o. *Aesculi* auf *Aesculus Hippocastanum* S.
- Rhcodium cellare Pers.*, an einem in einem Keller stehenden Topfe in Hermannstadt F.
- Erineum betulinum Schum.*, auf *Betula alba* H. B.
- „ *populinum Pers.*, auf *Populus tremula* bei Schässburg HB.
- „ *alnenm Pers.*, auf *Alnus glutinosa* H. B.
- Phyllirium tiliaceum Pers.*, auf *Tilia europaea* H. B.
- „ *pyrinum Fr.*, auf *Pyrus malus* H. B.
- „ *acerinum Fr.*, auf *Acer campestre* und *platanoides* HB.
- „ *Vitis Fr.*, auf *Vitis vinifera* H. B. bei Grossscheuern F.
- Mysotrichum Chartarum S. & K.*, auf dem Löschpapier, worin ich Pflanzen trockne F.
- Pericillium glaucum Lk.*, auf faulenden Früchten F.
- Botrytis vulgaris Fr.*, auf faulenden Früchten F.
- Cladospirum Herbarum Lk.*, auf *Heracleum Spondylium* bei Grossscheuern F.
- Mucor Mucedo L.*, auf schimmelndem Brote F.
- Depazea juglandina Fr.*, auf *Juglans regia* bei Neudorf F.
- „ *cornicola DeC.*, auf *Cornus sanguinea* H. B.
- „ *salicicola Fr.*, auf *Salix triandra* bei Neudorf F.
- „ *convolvulicola DeC.*, auf *Calystigia Sepium* bei Neud. F.
- „ *vagans Er.*, e. *Scabiosaecola* auf *Succisa pratensis* bei Grossscheuern, Hermannstadt, auf *Scabiosa lancifolia* auf der Präschbe hinter Zood F.
- Asteroma radiosum Fr.*, auf *Rosa spinosissima* bei Grosssch. F.
- Leptothyrium Fragariae Lib.*, auf *Fragaria* im Pfarrgarten zu Grossscheuern F.

- Ascochyta quercina* Lib., auf *Quercus*-ästen bei Neudorf F.
 „ *Robiniae* Lib., auf *Robinia pseudoacacia* H. B.
Rhytisma punctatum Fr., auf *Morus alba* H. B.
 „ *acerinum* Fr.,? auf *Acer campestre* H. B. S.
 „ *salicinum* Fr., auf *Salix caprea* H. B.
Dothicha Ribesia Fr., auf *Ribes rubrum* bei Grossscheuern F.
Polystigma rubrum DeC., auf *Prunus domestica* H. B. bei Grossscheuern F.
 „ *betulinum* Lk., auf *Betula alba* bei Schässburg H. B.
 „ *Ulmi* Lk., auf *Ulmus campestris* H. B.
Sphaeria maculaeformis Pers., auf *Acer* H. B.
 „ *alnea* Lk., auf *Alnus glutinosa* H. B.
 „ *Bombarda* Batsch, auf faulendem Eichenholz H. B.
 „ *maculata* Wallr., auf *Pyrus torminalis* H. B.
 „ *Trifolii* Pers., auf *Trifolium pratense* bei Hermannst. F.
 „ *podagrariae* Roth, auf *Aegopodium podagraria* bei Schässburg H. B.
 „ *Coryli* Batsch, auf *Corylus Avellana* H. B.
 „ *myrialea* DeC., auf trocknen Eichenblättern bei Grossscheuern, Hermannstadt, Hammersdorf F.
 „ *imbriata* Pers., auf *Carpinus Betulus* bei Grosssch. F.
 „ *Anemones Rihst*, auf *Anemone racemosa* H. B.
 „ *ceuthocarpa* Fr., auf *Populus tremula* H. B.
 „ *Graminis* Pers., auf *Agropyrum repens* bei Grosssch. F.
 „ *ceratosperma* Tode, auf *Quercus*-arten bei Neudorf F.
 „ *disciformis* Hoffm., auf *agrus silvatica* bei Michelsb. F.
 „ *deusta* Hoffm., an Baumstämmen S.
Poronia punctata Lk., auf Kuhmist H. B.
Hypocylon vulgare Lk. auf faulenden Stämmen H. B.
Cordyceps ophioglossoides Lk., in Wäldern H. B.
Illosporium coccineum Fr., auf *Parmelia pulveracea* bei Hermannstadt F.
Perisporium populinum Wallr., auf *Populus tremula* H. B.
Erysibe macularis Schlecht., a. *Humuli* auf *Humulus lupulus* bei Neudorf F.
 „ *lamprocarpa* Lk. a. *Labiatarum* auf *Galeopsis Tetrahit* und *Lamium album* bei Grossscheuern F.
 „ *depressa* Lk. b. *Artemisiae* auf *Artemisia vulgaris* bei Grossscheuern F.
 „ *communis* Lk. f. *Cucurbitacearum* auf *Cucurbita pepo* bei Grossscheuern F.
 „ „ h. *Convolvulacearum* auf *Convolvulus arvensis* bei Grossscheuern F.
Spermoedia Clavus Fr. a. *Secalis* auf *Secale cereale* bei Grossscheuern F.

- Spermoedia Clavus* *Fr.* b. *Triticici* auf *Agropyrum repens* bei Grossscheuern F.
- Sclerotium durum* *Pers.*, an trocknen Stengeln H. B.
- „ *Tulipae* *Lib.*, auf *Tulipa Gesneriana* bei Grosssch. F.
- Lycagola Epidendron* *Fr.*, an alten Baumstämm. bei Schässb. H. B.
- Trichia chrysosperma* *DeC.*, an morschen Baumstämmen H. B.
- „ *fallax* *Pers.*, an morschen Stämmen H. B.
- Didymium farinaceum* *Fr.*, an morschem Holze H. B.
- Tulostoma mammosum* *Fr.*, auf Bergwiesen bei Reys H. B.
- Lycoperdon Bovista* *L.*, auf Bergwiesen bei Neudorf F.
- „ „ *var. giganteum* auf Wiesen bei Grossscheuern F.
- Geaster hygrometricus* *Pers.*, auf dem Götzenberg bei Michelsberg F.
- Cyathus Crucibulum* *Hoffm.*, auf faulendem Holze H. B.
- „ *Olla* *Pers.*, im Gesträuch H. B. S. bei Grossscheuern F.
- „ *striatus* *Wild.*, in Wäldern H. B.
- Phallus impudicus* *L.*, bei Hermannstadt F.
- Eridia Auricula Judae* *Fr.*, auf *Sambucus niger* H. B.
- Typhula girans* *Fr.*, auf faulenden Pflanzentheilen H. B.
- Calocera cornea* *Fr.*, an Baumstämmen H. B.
- Clavaria pistillaris* *L.*, in Buchenwäldern bei Nagy-Bum H. B.
- „ *fragilis* *Holmsk.*, auf Bergwiesen bei Nagy-Bum H. B.
- „ *crispula* *Fr.*, am Grunde von Stämmen H. B.
- „ *corralloides* *L.*, in feuchten Wäldern H. B. bei Grossscheuern F.
- „ *flava* *Pers.*, in Wäldern bei Neudorf, Grossscheuern F.
- Geoglossum viscosum* *Pers.*, auf Bergtriften H. B.
- Bulgaria inquinans* *Fr.*, auf morschem Eichenholz bei Schässburg H. B.
- Peziza caesia* *Pers.*, auf morschem Holze H. B.
- „ *coccinea* *Jacq.*, auf faulendem Holz bei Schässburg H. B. bei Stolzenburg klein F.
- Leotia lubrica* *Pers.*, in Buchenwäldern H. B.
- Telephora quercina* *Pers.*, auf abgestorbenen Zweigen von Quercusarten bei Hammersdorf und Grossscheuern F.
- „ *tabacina* *Fr.*, auf *Corylus Avellana* H. B.
- „ *hirsuta* *Pers.*, an Baumstämmen H. B.
- „ *purpurea* *Schumach.*, an Baumstämmen H. B.
- Merulius lacrymans* *Schum.*, an feuchten Bodendielen auf dem Düscher Pass F.
- Doedalea quercina* *Pers.*, an Eichenstämmen bei Grossscheuern
- Polyporus versicolor* *Fr.*, an Baumstämmen bei Hermannstadt, Neudorf, auf d. Götzenberg bei Michelsberg F.
- „ *zonatus* *Fr.*, an Baumstämmen H. B.

Polyporus hirsutus Fr., an Baumstämmen bei Grossscheuern,
auf dem Götzenberg bei Michelsberg, auf dem Ta-
taru bei Oberschebesch F.

Schizophyllum commune Fr., an trocknen Stämmen von *Pyrus*
malus bei Neudorf, Grossscheuern F.

Agaricus violaceo-coeruleus Pers., in Laubwäldern H. B.

„ *androsaceus* L., auf Fichtennadeln H. B.

„ *arvensis* Schaeff., in Wäldern bei Neudorf F.

„ *can pestrus* L., auf Triften, in Wäldern bei Neudorf,
Grossscheuern, Holzmünden F.

„ *muscarius* L., in Wäldern, auf dem Götzenberg bei
Michelsberg F.

Beiträge

zur Kenntniss der Tertiär-Mollusken aus dem Tegel-
gebilde von Ober-Lapugy

von

J. L. Neugeboren.

Nach den Vereinsnachrichten in Nummer 10 und 12 des dritten Jahrganges dieser Verhandlungen und Mittheilungen hatte ich bei Gelegenheit der abgehaltenen Wochenversammlungen auf das so eben im Erscheinen begriffene Werk des Herrn Dr. Moritz Hörnes, Custos-Adjuncten an dem k. Hofmineralien-Kabinete über die Tertiär-Mollusken des Wiener Beckens aufmerksam zu machen Veranlassung genommen; damals schon deutete ich hin auf die Wichtigkeit dieses Werkes für uns, weil eine grosse Uebereinstimmung zwischen den Wiener Schichten und einem Theile unserer Tertiär-Ablagerungen stattfindet. Bereits vor 16 Jahren war durch Herrn Vice-Präsidenten von Hauer die Gleichwerthlichkeit der Ablagerung bei Bujtur mit denen des Wiener Becken nachgewiesen worden. In der neuesten Zeit ist durch die Auffindung des Lagers von Ober-Lapugy, von dessen Vorhandensein wir die erste Kunde durch Herrn Albert Bielz k. k. Finanz-Concipisten erhielten, noch mehr dieses höchst interessanten vorweltlichen Materials zu Tage gefördert worden, — eines Materials, das sich durch vortreffliche Erhaltung vor den Gegenständen aus dem Lager

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Fuss Michael

Artikel/Article: [Zur Kryptogamenflora Siebenbürgens 125-129](#)