

dann dem Vorkommen der bisher in unserm Vaterlande nur noch bei Lapugy gefundenen *Neritina Scharbergiana*. Ausserdem fanden sich noch in dem kurzen Zeitraume von einer Stunde, welche ich der Erforschung dieses oberhalb des Flüsschens Ribitze und unterhalb des Gartens des Gutsbesitzers von Nemes liegenden Lagers widmen konnte, und wobei ich namentlich von dem Herrn Schebat, dem Kaufmanne Herrn Beovitz aus Körösbánya, dann den Gutsbesitzern Herrn von Nemes und Veres aus Ribitze unterstützt wurde: das Fragment einer *Cyprea*, *Voluta rarispina*, *Buccinum semistriatum*, *Murex subclavatus*, *Cerithium minutum?*, *Turbo rugosus*, *Lucina calumbella*, *Pectunculus sp.?*, *Vermetes gigas*, dann Stacheln eines *Cidariten*. Die Korallen sowohl als die übrigen Petrefakten sind in einem meist gelblich gefärbten Tegel eingelagert, die letztern finden sich am häufigsten in der Nähe einer Trauerweide unterhalb des genannten Garten.

Bevor ich diesen meinen Bericht schliesse muss ich noch der über alles Lob erhabenen, freundschaftlichen Aufnahme bei dem uns schon aus Nr. 9 dieser Blätter vom v. J. bekannten Herrn Bergwerksbesitzers von Ruda, Gutsbesitzer von Bihári in Brád, um so mehr erwähnen, als er mir auch die Zusicherung gab, dass er unserm Vereine demnächst eine Parthie der mineralogischen Vorkommnisse von Ruda und seiner Umgebung übersenden werde.

Beiträge

zur Insectenfauna von Siebenbürgen

von

Gustav L. Mayr.

Vor kurzer Zeit wurde mir vom Herrn Vereinssekretär E. A. Bielz eine Suite Insecten aus den Ordnungen der Hemipteren Dipteren und Hymenopteren, die er in verschiedenen Gegenden von Siebenbürgen sammelte mit dem Ersuchen eingesendet, dieselben zu determiniren, und ihre Namen als Beitrag zur Fauna Siebenbürgens in diesen Blättern zu veröffentlichen.—

Indem ich mich nun hiemit dieses Auftrags entledige, erlaube ich mir hinzuzufügen, dass die Herrn Frauenfeld und Dr. Schiner so gütig waren, die Hymenopteren mit Ausnahme der leider sehr wenigen Formicarien, und die

Hr. Dr. Schiner und Dr. Egger, die Dipteren zu determiniren; die Hemipteren und Formicarien bestimmte ich selbst.—

Bei dieser Gelegenheit aber kann ich mich der Bemerkung nicht enthalten, wie sehr es zu wünschen wäre, dass auch in Siebenbürgen unter den Insecten neben den gewissen bevorzugten Ordnungen, wozu insbesondere die Coleopteren gehören, auch die andern stiefmütterlich behandelten Familien mehr berücksichtigt werden möchten. Von vielem Interesse wäre es mir namentlich, aus Siebenbürgen Formicarien entweder im Tausch gegen andre Naturalien oder wenigstens zur Determination zu erhalten; ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich die Behauptung aufstelle, dass Siebenbürgen auch in dieser Beziehung viele eigenthümliche Arten bergen müsse.

Es folgt nun das Verzeichniss der mir von Herrn E. A. Bielz zur Determination gesandten siebenbürgischen Insecten, wobei unter den Hemipteren alle diejenigen Arten ausgelassen werden, welche bereits von Herrn Professor C. Fuss in Nr. 3 dieser Blätter vom 1 J. als in Siebenbürgen vorkommend bekannt gemacht wurden.

I. Hemiptera.

<i>Tettigonia viridis</i> F.	<i>Heterogaster Salviae</i> Schill.
<i>Cercopis mactata</i> Grm.	<i>Pachymerus decoratus</i> Hhn.
<i>Centroctus cornutus</i> F.	„ <i>sylvaticus</i> F.
<i>Corisa Geoffroyi</i> Leach.	„ <i>agrestis</i> Fall.
<i>Hydrometra rufoscutellata</i> Ltr.	„ <i>luscus</i> F.
„ <i>paludum</i> F.	„ <i>lynceus</i> Schill.
<i>Salda riparia</i> F.	„ <i>hemipterus</i> Schill.
„ <i>elegantula</i> F.	„ <i>erraticus</i> F.
<i>Harpactor pedestris</i> Wolff.	<i>Lygaeus venustus</i> Boeb.
<i>Pygolampis pallipes</i> . F.	<i>Corizus crassicornis</i> F.
<i>Syrtris crassipes</i> . L.	<i>Coreus nubilus</i> Fall.
<i>Aradus complanatus</i> Burm.	<i>Berytus tipularius</i> L.
<i>Orthosteira gracilis</i> Fieb.	„ <i>rufescens</i> Pz.
„ <i>obscura</i> Eieb.	<i>Eurydema ornatum</i> F.
<i>Iopus tunicatus</i> F.	<i>Cydnius biguttatus</i> L.
<i>Capsus Gyllenhalli</i> Fall.	„ <i>morio</i> F.
„ <i>striatus</i> L.	„ <i>tristis</i> F.
„ <i>curvipes</i> Meyer.	<i>Asopus dumosus</i> L.
„ <i>leucocephalus</i> L.	<i>Tetyra hottentotta</i> F.
„ <i>rufifrons</i> Fall.	

II. D i p t e r a.

Clenophora atrata L.	Syrphus Ribesii L.
Bibio marci L.	„ balteatus D. G.
„ Johannis L.	Helophilus pendulus L.
Bombylius major L.	Eristalis nemorum L.
„ minor L.	Lucilia caesar L.
Dasypogon teutonus L.	Musca corvina F.
Sargus formosus Schrnk.	Lauxania aenea Fall.
Stratiomys hydroleon L.	

III. H y m e n o p t e r a.

Monophadnus semicinctus Kl.	Mutilla europaea L.
Macrophya punctum F.	Formica ligniperda Ltr.
Tenthredo scalaris Kl.	„ pubescens F.
„ flavicornis F.	Myrmica scabrinodis hyl.
Sirex gigas L.	Vespa crabro L.
„ spectrum L.	Colletes auratus.
Pimpla instigator Pz.	Eucera longicornis L.
Rhyssa persuasoria L.	Hylocopa violacea L.
Pompilus fuscus L.	Bombus hortorum L.
„ minor Pz.	

B e i t r ä g e

zur Kenntniss der Tertiär-Mollusken aus dem Tegel-
gebilde von Ober-Lapugy

v o n

J. L. Neugeboren.

(Fortsetzung.)

Geschlecht Ancillaria Lam.

Im Lager von Lapugy sind die drei Arten dieses Geschlechtes, welche die Wiener Schichten einschliessen, sämmtlich gefunden worden, und zwar in demselben Verhältnisse zu einander, wie es im W. Becken statt findet; hier wie dort ist Anc. canalifera sehr selten,— hier wie dort gehört Anc. obsoleta zu den seltenen Vorkommnissen,— hier wie dort kommt Anc. glandiformis und zwar in allen Alters- und Grössen-Abstufungen sehr häufig vor. Der Umstand, dass die jetzt noch lebenden Ancillarien gleich wie

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1853

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Mayr Gustav Ludwig

Artikel/Article: [Beiträge zur Insektenfauna von Siebenbürgen 141-143](#)