

# Zur Curculionidenfauna der Dobrudscha.

Von Prof. emer. Dr. C. A. Penecke, Czernowitz.

Als Ergänzung zum Aufsätze »Zur Kenntnis der Insektenfauna der Süddobrudscha und Südbessarabiens«, von A. Müller (d. Z. Jg. 1929/30) teile ich im folgenden das Verzeichnis der von Prof. Lepši im Sommer 1924 bei Cavarna gesammelten 30 Curculioniden mit.

**Otiorrhynchus ligustici** L., mittel- und südeuropäisch, bis in den Kaukasus verbreitet.

— **fullo** SCHRANK., pontisch, Westgrenze: Wienerbecken.

**Phyllobius breviatus** DESBR., südöstliches Mitteleuropa, Balkanländer, Kleinasien.

— **sinuatus** F., ganz Europa mit Ausnahme des nördlichsten Teiles, bis Transkaukasien.

**Polydrosus inustus** GERM., Südrußland, Kaukasusländer, Zentralasien, Nordwestgrenze: Bukowina.

**Foucartia depilis** KRAATZ, eine sehr seltene Art, die aus Thüringen beschrieben wurde, wo eine Anzahl mediterraner und pontischer Tiere als vorgeschobene Posten sich finden.

**Sitona lineatus** L., paläarktisch.

**Trachyphloeus globipennis** REITT., aus Bulgarien (Varna) beschrieben, Endemit.

**Psallidium maxillosum** F., pontisch.

**Tanymecus palliatus** F., paläarktisch.

**Coniocleonus pseudobliquus** J. MÜLL., Balkanländer. Wahrscheinlich ist das in obiger Arbeit als *Cleonus nigrosuturatus* GOEZE angeführte Tier auch diese Art.

**Lixus elongatus** GR. und **L. cardui** OL., paläarktisch.

**Larinus latus** HRBST., mediterran.

**Phytonomus meles** F., paläarktisch.

**Ceuthorrhynchus quercicola** PAYK., paläarktisch (selten).

**Baris timida** ROSSI, mediterran.

**Balanobius salicivorus** PAYK., paläarktisch.

**Anthonomus inversus** BED. und **A. pedicularius** L., paläarktisch.

**Tychius quinquepunctatus** L., ganz Europa mit Ausnahme des nördlichsten.

**Orchestes alni** L., desgleichen.

**Magdalis cerasi** L., paläarktisch.

**Apion Schönherri** BOH., mediterran.

**Rhynchites praeustus** BOH., südliches Mittel- und Südeuropa bis Syrien und Kleinasien.

— **cavifrons** GYLL. Mittel- und Südeuropa.

— **aequatus** L., ganz Europa mit Ausnahme des nördlichsten, Syrien, Kleinasien.

— **hungaricus** HERBST. Südosteuropa, Kleinasien, Sibirien.

— **auratus** SCOP. Europa, Sibirien, Turkestan.

**Attelabus nitens** SCOP. Europa, soweit die Eiche reicht, Sibirien, Kaukasusländer, Kleinasien.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1931/1932

Band/Volume: [81-82 1](#)

Autor(en)/Author(s): Penecke Karl Alphons Borromäus Josef

Artikel/Article: [Zur Curculionidenfauna der Dobrudscha. 70-71](#)