

Ueber eine neue Tangare aus Trinidad.

Von

C. E. Hellmayr und Josef Graf von Seilern.

Unser Reisender S. M. Klages hat uns im vergangenen Jahre eine umfangreiche Vogelausbeute von der Insel Trinidad eingesandt, welche neben einer Anzahl interessanter und seltener Arten auch mehrere neue Formen enthält. Zwei derselben: *Grallaria guatemalensis aripocensis* und *Geotrygon linearis trinitatis* haben wir bereits an anderer Stelle¹⁾ bekannt gemacht. Heute lassen wir die Diagnose einer dritten, gleichfalls in den Aripo-Bergen entdeckten Form folgen.

Sporathraupis cyanocephala büsingi n. subsp.

Tanager cyanocephala subcinerea (nec Sclater) Hellmayr, Nov. Zool. 13, 1906, p. 15 (Aripo; 1 ♂); Cherrie, Sci. Bull., Mus. Brooklyn Inst. Arts & Sci. I, n° 8, 1906, p. 188 (Aripo).

Adult. Unterscheidet sich von *S. c. subcinerea* (Scl.), aus dem venezuelanischen Küstengebirge, auf den ersten Blick durch die sehr viel dunklere Unterseite. Die ganze Unterseite (vom Kinn bis zur Analgegend) ist nahezu gleichmäßig dunkelgrau, mit schwachem, bläulichen Tone, der an den Hals- und Brustseiten am deutlichsten hervortritt; die Mittellinie des Bauches ist nur in ganz geringer Ausdehnung etwas rahmfarbig vermischt, erscheint daher immer noch vorherrschend grau gefärbt. Der schwarze Maxillarstreif ist viel breiter und schärfer ausgeprägt, ferner ist das Kinn (meist auch noch die vordere Kehlmittle) grob schwärzlich gefleckt, wogegen der Schnabel, verglichen mit der Festlandsform, kürzer und dicker erscheint.

♂♂ Al. 82—86; caud. 72—77 mm.

♀♀ Al. 77—81; caud. 67—73 mm.

Type im Zoologischen Museum, München: Nr. 12. 1706. ♂ ad. Aripo-Berge, Trinidad, 21. August 1912. S. M. Klages coll.

Hab. Gebirge des nördlichen Trinidad.

Obs. Herr Klages erbeutete mehr als vierzig Exemplare dieser neuen Form in der zweiten Hälfte August und anfangs September 1912 in den Aripo-Bergen, Trinidad, wo sie außerordentlich häufig war. Bereits André und Cherrie hatten sie dort in wenigen

¹⁾ Bull. B. O. C. 31, 1912, p. 13—14.

Stücken gesammelt, aber infolge ungenügenden Vergleichsmaterials wurde ihre Verschiedenheit von der Festlandsform damals nicht erkannt. Von *S. cyanocephala subcinerea* (Scl.)¹⁾ liegt uns eine schöne Serie von 15 Bälgen aus dem Gebirgsstocke von Cumaná (Bermudez) aus den Museen München und Tring vor. Sie hat bedeutend hellere Unterseite: die Kehle, Gurgel und Vorderbrust sind licht schmutziggrau mit entschiedenem, olivenfarbigem Anfluge, diese Färbung geht auf Vorderkehle und Kinn in einen helleren Ton über und ist hier überdies mehr oder minder deutlich trübweißlich gefleckt, bezw. vermischt. In der Bartgegend zeigt sich nur ein schmaler, aus einzelnen Fleckchen zusammengesetzter, schwärzlicher Maxillarstreif, während der Kinnwinkel entweder ganz einfarbig ist oder nur eine verloschene, dunkle Sprenkelung aufweist. Die ganze Hinterbrust- und Bauchmitte ist in großer Ausdehnung schmutzig rahmfarbig und sticht von der trübgrauen Vorderbrust deutlich ab. Der Schnabel der Festlandsform ist schlanker und länger als bei *S. c. büsingi*.

Wir erlauben uns, diese interessante Tangare zu Ehren des Freiherrn Alfred von Büsing-Orville, auf Schloß Zinneberg, zu benennen, dessen Liberalität zum Erfolg der Reise unseres Sammlers wesentlich beigetragen hat.

Nach unserer gegenwärtigen Kenntnis zerfällt *Sporathraupis cyanocephala* in folgende geographische Rassen:

- a) *S. cyanocephala cyanocephala* (Lafr. & Orb.) Nord-Bolivia, Peru, und West-Ecuador.
- b) *S. cyanocephala auricrissa* (Scl.) Colombia (Antioquia, Cauca, Bogotá etc.) und Anden von Mérida, West-Venezuela.
- c) *S. cyanocephala margaritae* Chapm.²⁾ Nord-Colombia: Sierra Nevada de Santa Marta.
- d) *S. cyanocephala subcinerea* (Scl.) N.O. Venezuela: Gebirge von Bermudez.
- e) *S. cyanocephala büsingi* Hellm. & Seil. Gebirge von Trinidad.

Ein ausführlicher Bericht über die Avifauna der Insel Trinidad wird demnächst in den 'Novitates Zoologicae' erscheinen.

¹⁾ *Tanagra subcinerea* Sclater, P. Z. S. Lond. 1861, p. 129 (1861. — Venezuela).

²⁾ Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 31, p. 165 (1912. — Valparaiso, Santa Marta, Colombia).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [11_1912-1913](#)

Autor(en)/Author(s): Hellmayr Carl (Charles) Eduard, Seilern und Aspang Josef

Artikel/Article: [Ueber eine neue Tangare aus Trinidad. 254-255](#)