© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Beschreibung zweier neuer Vogelformen aus Süd-Ost Peru.

Von

Joseph Graf Seilern.

Capito tucinkae n. sp.

♂ ad. Oberkopf, Wangen-, Backen- und Ohrgegend, Halsseiten, Kehle und Gurgel lebhaft kirschrot (wie bei *C. boureieri*), nur die äußersten Federwurzeln schwärzlich; Zügelgegend und ein großer Kinnfleck (ebenfalls wie bei *C. boureieri*) tiefschwarz; das Rot des Oberkopfes ist rückwärts durch eine schmale, aber scharfe, schwefelgelbe Nackenbinde von der Rückenfarbe getrennt; Rücken, Bürzel, Oberschwanzdecken lebhaft gelblich (oder „golden") olive, der Mantel etwas mehr ins Bräunliche ziehend und überdies am vorderen Teile matt rot überlaufen; Flügel und Schwanz gelblich olive, viel matter als der Bürzel und die Oberschwanzdecken; die Oberflügeldecken wohl von demselben Tone wie der Mantel; Innenfahne der Schwingen schwärzlich. Unterseits setzt sich das Rot der Gurgel über die Mitte der Vorderbrust als rötlicher Anflug fort. An den Seiten der Vorderbrust ist jederseits ein großer olivengrauer Fleck. Die ganze Brust ist hell orangegelb, im vorderen Teile, wie gesagt, etwas rot überlaufen, und geht auf dem Bauche in einen helleren, schwefelgelben Ton über; Brust- und Bauchseiten, sowie die Analgegend sind mit breiten, dunkel olivengrünen Längsstreifen geziert. Unterschwanzdecken blaßgelb, mit weißlichen Säumen; Achselfedern, Unterflügeldecken und Innensäume rahmgelblichweiß (wie bei *C. boureieri*). Schnabel gelb, Basishälfte der unteren Mandibel horngrau.

Al. 78; caud. 63; tars. 18; rostr. 20 mm.

Type im Museum Seilern, Lešna: Nr. 4559. ♂ ad. Yahuarmayo, Carabaya, S.O. Peru (1200 engl. Fuß), 30. März 1912. H. & C. Watkins coll. Nr. 770. "Iris red brown, feet dark brown, bill yellow."

Hab. Östliche Abhänge der Andenkette von Carabaya, S.O. Peru.

Obs. Der Typus hat die mittleren Steuerfedern noch unausgewachsen in den Blutkielen, ist aber im übrigen ganz ausgefärbt. Diese zweifellos neue Art, von der leider nur ein einziges ♂ vorliegt, ist augenscheinlich mit der *C. boureieri*-Gruppe am nächsten

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

verwandt, und hat mit ihr die Verteilung von Rot und Schwarz auf Kopf und Kehle gemein.

Auch die Färbung und Zeichnung der Unterseite bekundet die nahen Beziehungen zu dieser Artengruppe. *C. tucinkae* unterscheidet sich indessen leicht durch die gelblich olivenfarbige (statt tiefgrüne) Oberseite (Rücken, Flügel, Schwanz), gelbe, statt blaßbläuliche Nackenbinde, schmalere und hellergrüne Streifen auf den Körperseiten, sowie durch längere Flügel und Schwanz, ferner durch merklich größeren, stärkeren Schnabel. Wie bei *C. bourcieri bourcieri*, aus Colombia (Bogotá) und Ost-Ecuador setzt sich das Rot der Kehle noch über die Mitte der Vorderbrust fort, wenn auch in geringerer Intensität

Thamnophilus aethiops kapouni n. subsp.

♂ vix ad. Stirne, Scheitel und Nacken mattschwarz, übrige Ober- und Unterseite schwärzlich schiefergrau, letztere etwas heller als der Rücken. Flügelbug und kleinste Flügeldecken weiß gesprenkelt, auch der Flügelrand mit einzelnen weißen Fleckchen; mittlere und große Flügeldecken einfarbig mattschwarz; Schwingen und Schwanzfedern schwärzlich, mit dunkel schiefergrauen Außensäumen; das äußerste Steuerfedernpaar mit einem feinen weißlichen Spitzenrand. Achselfedern und Unterflügeldecken schwärzlich, reichlich mit weißen Säumen und Flecken gemischt. Schmaler Innensaum der Schwingen weißlich. Unterschwanzdecken mit schmalem, aber deutlichen weißen Spitzensaum. Schnabel schwarz. Al. $70^1/_2$; c. 61; r. 18 mm.

Type im Museum Seilern, Lešna: Nr. 4560. ♂ vix ad. Yahuarmayo, Carabaya, S.O. Peru (1200 engl. Fuß), 12. April 1912. H. & C. Watkins coll. Nr. 717. "Iris dark brown, feet slate, bill black."

Hab. Östliche Abhänge der Andenkette von Carabaya S.O. Peru.

Obs. Der Typus ist noch nicht ganz ausgefärbt, wie die dunkelbraunen Handdecken und die braunen Säume an den inneren Armschwingen beweisen, im übrigen trägt er das vollständiee Alterskleid. *T. a. kapouni* ähnelt in den einfarbig schwarzen größeren Oberflügeldecken und dem Mangel des weißen Dorsalflecks dem *T. a. juruanus* Jh., unterscheidet sich aber sofort durch viel dunklere, schwärzlich schiefergraue Gefiederfärbung. In letzterem Punkte übertrifft er sogar noch *T. a. polionotus* Pelz., welcher jedoch auf allen Flügeldecken deutliche weiße Spitzenflecken trägt. Hellmayr hat in Nov. Zool. XVII, Dec. 1910, p. 339—341, eine vorzügliche Übersicht der bis dahin bekannten fünf Formen der Gruppe *T. aethiops* gegeben, auf die ich den Leser verweise.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Verhandlungen der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: 11_1912-1913

Autor(en)/Author(s): Seilern und Aspang Josef

Artikel/Article: Beschreibung zweier neuer Vogelformen aus Süd-Ost Peru. 276-277