

Verzeichniss¹⁾

der in den Umgebungen von Innsbruck, Lisens und Tarrenz
aufgefundenen Leber- und Laubmoose, nebst einigen, die
mir aus Südtirol sind mitgetheilt worden.

A. Lebermoose.

Familia I.

Peltopterideae.

Ordo I. Marchantieae;

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| I. Grimaldia Raddi. | IV. Marchantia Mich. |
| G. hemisphaerica Lindenb. | M. polymorpha L. |
| III. Conocephalus Dumort. | a. domestica Wahlenb. |
| C. nemorosus Hübner. | b. fontana Wahlenb. |
| C. quadratus Hübner. | |

Ordo II. Targionieae.

- | | |
|---------------------|------------------|
| VI. Targionia Mich. | T. hypophylla L. |
|---------------------|------------------|

Ordo III. Anthoceroeteae.

- | | |
|---------------------------|-------------|
| VIII. Anthoceros Micheli. | A. levis L. |
|---------------------------|-------------|

Familia II.

Homallophyllae.

- | | |
|------------------|--------------|
| <i>Riccieae.</i> | |
| XI. Riccia Mich. | R. glauca L. |
| R. fluitans L. | R. natans L. |

Familia III.

Hepaticini.

¹⁾ Geordnet nach Dr. Hübener's Beschreibung der deutschen
Leber- und Laubmoose.

Ordo I. Jungermannieae.

- | | |
|---|---|
| <p>XIII. <i>Blasia</i> Mich.
 <i>B. pusilla</i> Mich.
 XIV. <i>Cordaea</i> Nees ab Esenb.
 <i>C. Flotoviana</i> N. ab Es.
 XV. <i>Gymnomitrium</i> Hübner.
 <i>G. Blythii</i> Hübner.
 <i>G. epiphyllon</i> Hübner.
 <i>G. pingue</i> Hübner.
 XVI. <i>Echinomitrium</i> Hübner.
 <i>E. furcatum</i> Hübner.
 <i>E. pubescens</i> Hübner.
 XVII. <i>Jungermannia</i> L.
 <i>J. albicans</i> L.
 <i>β. rupestris</i> Hübner.
 <i>J. asplenioides</i> L.
 <i>β. longipes</i> Hübner.
 <i>J. attenuata</i> Schreb.
 <i>J. Baueri</i> Mart.
 <i>J. Blasia</i> L.
 <i>J. bidentata</i> L.
 <i>J. bicuspidata</i> L.
 <i>J. byssacea</i> Roth.
 <i>J. ciliaris</i> L.
 <i>β. bradypus</i> Hübner.
 <i>α. pulcherrima</i> L.
 <i>Lersii</i> Roth.
 <i>J. complanata</i> L.
 <i>J. concinnata</i> Lightf.
 <i>J. connivens</i> Dicks.
 <i>J. crenulata</i> Sm.
 <i>J. curta</i> Mart.
 <i>J. deflexa</i> Mart.
 <i>J. curvifolia</i> Dicks.
 <i>J. dilatata</i> L.
 <i>β. microphylla</i> Wallr.
 <i>J. emarginata</i> Ehrh.
 <i>J. epiphylla</i> L.
 <i>a. fertilis</i>.
 <i>b. speciosa</i>.
 <i>J. Flörkii</i> Web. et Mohr.
 <i>J. Funckii</i> Web. et Mohr.
 <i>J. furcata</i> L.
 <i>J. hyalina</i> Lyell.
 <i>J. incisa</i> Schrad.
 <i>J. julacea</i> Lightf.</p> | <p><i>J. lonceolata</i> L.
 <i>J. laevigata</i> Schrad.
 <i>J. minuta</i> Dicks.
 <i>J. montana</i> Mart.
 <i>J. Mülleri</i> N. ab Es.
 <i>J. nemorosa</i> L.
 <i>β. purpurascens</i> Hook.
 <i>γ. rivularis</i> Hübner.
 <i>J. pallescens</i> Ehrh.
 <i>J. palmata</i> Hedw.
 <i>J. pinguis</i> L.
 <i>J. platyphylla</i> L.
 <i>Thuja</i> Hook.
 <i>J. polyanthos</i> L.
 <i>J. pubescens</i> Schrad.
 <i>J. quinquedentata</i> Hüds.
 <i>J. reptans</i> L.
 <i>J. resupinata</i> L.
 <i>J. rigidula</i> Hübner.
 <i>J. Sauteriana</i> Hübner.
 <i>J. saxicola</i> Schrad.
 <i>J. scalaris</i> Schrad.
 <i>J. Schraderi</i> Mart.
 <i>J. sphagni</i> Dicks.
 <i>J. setacea</i> Weber.
 <i>β. sertulorioides</i> Hübner.
 <i>γ. Schultzii</i> Hübner.
 <i>J. setiformis</i> Ehrh.
 <i>J. scutata</i> Web. et Mohr.
 <i>J. sphaerocarpa</i> Hook.
 <i>J. Tamarisci</i> L.
 <i>J. Taylori</i> Hook.
 <i>J. taxifolia</i> Wahlenb.
 <i>J. tersa</i> N. ab Es.
 <i>J. tomentella</i> Ehrh.
 <i>J. Trichomanis scopoli</i>.
 <i>J. tricrenata</i> Wahlenb.
 <i>J. trilobata</i> L.
 <i>J. uliginosa</i> Swartz.
 <i>J. umbrosa</i> Schrad.
 <i>J. undulata</i> L.
 <i>β. rivularis</i> Hübner.
 <i>γ. purpurascens</i> Hübner.
 <i>J. ventricosa</i> Dicks.</p> |
|---|---|

Ordo II. Andreae.

XVIII. A. nivalis? Hook. | A. rupestris Hedw.

B. Laubmoose.

Classis I.

Astomi (Mündungslose).

I. Phascum Schreb. (Ohne-		γ. piliferum Schultz.
mund).		P. cuspidatum Schreb.
P. bryoides Dicks.		

Classis II.

Gymnostomi (Nacktmündige).

IV. Sphagnum Dillenius (Torf-		G. curvirostrum Hedw.
moos).		G. intermedium Turner.
Sph. acutifolium Ehrh.		G. Lapponicum Sw.
γ. rubicundum Hübner.		G. Mongeotii Bruch.
Sph. compactum Brid.		G. ovatum Hedw.
Sph. cymbifolium Dillen.		G. pallidisetum N. ab Es.
Sph. cuspidatum Ehrh.		G. pyriforme Hedw.
Sph. squarrosum Pers.		G. rupestre Schwäg.
V. Schistidium Brid. (Spalt-		VII. Anoetangium Hedw.
blüthen).		(Sperrmund).
Sch. ciliatum Hedw.		St. compactum Sw.
VI. Gymnostom. Hedw. (Kahl-		IX. Hymenostomum R. Brown.
mund).		(Hautmund).
G. calcareum Hornsch.		H. microstomum Hedw.

Classis III.

Peristomi (Zahnmündige).

Ordo I. Acrocarpi.

(Gipfelfrüchtler).

X. Tetraphis Hedw. (Vier-		XIV. Tayloria Hook (Zitter-
zahn).		haar).
T. pellucida Hedw.		T. splachnoides Hook.
XI. Splachnum L. (Schirm-		XV. Encalypta Schreb.
moos).		(Glockenhut).
Spl. ampullaceum L.		E. ciliata Hedw.
Spl. Frölichianum Hedw.		E. rhabdocarpa Schw.
Spl. sphaericum L.		E. streptocarpa Hedw.
β. gracile Web. et Mohr.		E. vulgaris Hedw.

XVII. Anacalypta Roehl.
(Siebzahn).

A. rubella Hüb.

A. N. Nach Dr. Sauter eine neue Species, wie es scheint, von mir entdeckt in Lisen am 24. Sept. 1840. Siehe in Herb. Mus. et Wilt et Gymnas.

XVIII. Weissia Hedw. (Perlmoos).

W. acuta Hedw.

W. controversa Hedw.

W. crispula Hedw.

W. denticulata Schwäg.

W. Martiana Hornsch.

W. pusilla Funck.

W. Starkeana Hedw.

W. verticillata Schwäg.

W. viridula Hedw.

XXIII. Grimmia Ehrh. (Zwergmoos).

G. affinis Hornsch.

G. Alpestris Schleich.

G. alpicola Sw.

G. apocarpa Hedw.

G. atrata Mielich.

G. commutata Hbnr.

G. conferta Funck.

G. cribrata Hedw.

G. crinita Brid.

G. elatior Brid.

G. incurva Schw.

G. leucophaea Grev.

G. ovata Web. et Mohr.

G. pulvinata Hedw.

XXIV. Racomitrium Brid.
(Zackenhaube).

R. canescens Brid.

R. fasciculare Brid.

R. lanuginosum Brid.

R. microcarpon Brid.

β. Sudeticum Funck.

XXV. Cinclidotus Pal. de Beauv. (Gitterzahn).

C. fontinalis Pal. de Beauv.

XXVI. Fissidens Hedw. (Farnmoos).

F. adiantoides Hedw.

F. bryoides Hedw.

F. osmundioides Hedw.

XXVII. Dicranum Hedw. (Gabelzahn).

D. crispum Hedw.

D. elongatum Schwäg.

D. gracilescens Web. et Mohr.

D. glaucum Hedw.

D. longifolium Ehrh.

D. montanum Hedw.

D. polycarpon Ehrh.

D. rugosum Brid.

D. scoparium Hedw.

D. Starkii Web. et Mohr.

D. strumiferum Ehrh.

D. squarrosus Schrad.

D. subulatum Hedw.

D. varium Hedw.

D. virens Hedw.

XXVIII. Ceratodon Brid.
(Hornzahn).

C. purpureus Brid.

γ. brevicaulis Hübner.

c. alpestris Hübner.

XXIX. Didymodon Hedw.
(Zwillingszahn).

D. capillaceus Schrad.

β. compactus Hübner.

D. flexicaulis Schwäg.

D. glaucescens Web. et Mohr.

D. obscurus Kaulf.

D. rigidulus Hedw.

XXX. Trichostomum Hedw.
(Haarmund).

T. piliferum Smitt.

XXXI. Barbula Hedw. (Bartmoos).

B. aloides Hübner.

B. brevirostris Hübner.

NB. In Ahrn entdeckte ich 1840 den 17. September eine

hierher gehörige Species, welche nach Dr. Sauter neu zu sein scheint. Die Exemplare befinden sich im Herb. Mus. et Wilt. et Gymnas.

- B. fallax Hedw.
- B. inclinata Schwäg.
- B. membranifolia Schultz.
- B. muralis Timm.
- B. rigida Brid.
- B. tortuosa Web. et Mohr.
- B. unguiculata Hedw.

XXXII. Syntrichia Bridel.
(Netzmund).

- S. ruralis Brid.
- S. subulata Web. et Mohr.

XXXIII. Orthotrichum Hedw.
(Goldhaar).

- O. affine Schrad.
- O. anomalum Hedw.
- O. crispum Hedw.
- O. cupulatum Hoffm.
- O. Hutchinsiae Sm.
- O. obtusifolium Schrad.
- O. speciosum N. ab Es.
- O. striatum Hedw.

XXXV. Aulacomnion Schwäg.
(Furchenbüchse).

- A. palustre Schwäg.

XXXVIII. Mnium Linn. (Sternmoos).

- M. cuspidatum Hedw.
- M. hornum L.
- M. punctatum Hedw.
- M. rostratum Schw.
- M. roseum Hedw.
- M. spinosum Schwäg.
- M. serratum Schwäg.
- M. undulatum Hedw.

XXXIX. Webera Hedw.
(Webera).

- W. cruda Bruch.
- β. minor Schwaeg.
- W. elongata Schwäg.
- W. nutans Hedw.

XL. Bryum Dillen. (Knotenmoos).

- B. argenteum L.
- B. caespiticium L.
- B. capillare L.
- B. crudum Schreb.
- B. Funckii Schwäg.
- B. julaceum Schwäg.
- B. Ludwigii Spreng.
- B. nutans Schreb.
- B. pallens Schwäg.
- B. pseudotriquetrum Hedw.
- B. pysiforme L.

XLI. Pohlia Hedw. (Pohlia).

- P. cuculata Bruch.
- P. elongata Hedw.

XLII. Meesia Hedw. (Meesia).

- M. alpina Funck.
- M. uliginosa Hedw.

XLIII. Ptychostomum Hornsch.
(Faltenmund).

- Pty. compactum Hornsch.

XLIV. Funaria Schreb. (Drehmoos).

- F. hygrometrica Schreb.

XLV. Philonotis Brid. (Brunnenmoos).

- Ph. fontana Brid.
- β. falcata Brid.
- γ. alpina Brid.

- Ph. Marchica Brid.

XLVI. Bartramia Hedw.
(Bartrams-Moos).

- B. crispa Swartz.
- B. Halleriana Hedw.
- B. ithyphylla Brid.
- B. Oederi Swartz.

XLVII. Timmia Hedw. (Timmie).

- T. austriaca Hedw.
- T. megapolitana Hdw.

XLVIII. Catharinaea Ehrh.
(Schildmoos).

- C. undulata Web. et Mohr.

XLIV. Polytrichum Linn.
(Filzmütze).

- P. aloides Hedw.

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| P. alpestre Hoppe. | β . affine Roehl. |
| P. alpinum L. | P. nanum Hedw. |
| P. commune L. | P. piliferum Schreb. |
| β . cámpestre Wallr. | P. septentrionale Swartz. |
| γ . uliginosum Wallr. | P. urnigerum L. |
| P. formosum Hedw. | L. Buxbaumia Linn. (Bux- |
| P. hercynicum Hedw. | baumie). |
| P. juniperinum Willdw. | B. foliosa L. |

Ordo II. Pleurocarpi.

(Seitenfrüchtler).

Seta laterali.

Hypnoideae.

Series I. Peristomio simplici (Haploperistomi).

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| LII. Leucodon Schwäg. | L. sciuroides Schwäg. |
| (Weisszahn). | |

Series II. Peristomio duplici (Diploperistomi).

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| LIV. Leptohyemenium | I. catenulatum Hübner. |
| Schwäg. (Zartzahn). | I. myosuroides Brid. |
| L. filiforme Hübner. | I. myurum Brid. |
| L. gracile Hübner. | I. rufescens Hübner. |
| LV. Anomodon Hook. | LXII. Hypnum Linn. (Ast- |
| (Trügzahn). | moos). |
| A. cladorrhizans Hübner. | H. abietinum L. |
| A. curtipendulus Hook. | β . paludosum Wahlenb. |
| A. viticulosus Hook. | H. aduncum L. |
| LVII. Neckera Hedw. | δ . longipes Brid. |
| (Neckera). | H. albicans Neck. |
| N. crispa Hedw. | H. alpestre Sw. |
| LVIII. Leskea Hedw. (Leskea). | H. alpinum Turner. |
| L. complanata Hedw. | H. Blandowii Web. et |
| L. incurvata Hedw. | Mohr. |
| L. polyantha Hedw. | H. brevirostre Ehrh. |
| L. sericea Hedw. | H. commutatum Hedw. |
| L. subtilis Hedw. | H. confertum Dicks. |
| L. trichomanoides Hedw. | H. cordifolium Hedw. |
| LX. Climacium Web. et | H. crista castrensis L. |
| Mohr. (Leiterzahn). | H. cupressiforme L. |
| C. deutroides Web. et | ϵ . filiforme Brid. |
| Mohr. | ζ . crispatisimum Brid. |
| LXI. Isothecium Brid. | ι . plumosum Mart. |
| (Urnenmoos). | |

η hamulosum Brid.
H. cuspidatum L.
H. falcatum L.
H. fastigiatum Brid.
H. fluitans L.
 β. gracile Hübner.
 γ. aduncoides Brid.
H. filicinum L.
 γ. filiforme Hübner.
 δ. gracilescens Brid.
 ε. lanatum Brid.
 η. fallax Hook.
H. fluviatile Swarz.
H. Halleri L.
H. intricatum Hedw.
H. incurvatum Schrad.
H. longirostrum Ehrh.
H. lutescens Huds.
H. lycopodoides Schwäg.
H. molle Dicks.
H. murum Hedw.
H. molluscum Hedw.
H. murale Neck.
H. nitens Schreb.
H. palustre Hoffm.
H. piliferum Schreb.
H. plicatum Schimp.
H. populeum Hedw.
H. polymorphum Hedw.
H. praelongum L.
H. plumosum L.
H. purum L.
H. radicale Hedw.
H. recognitum Hedw.

H. reflexum Stark.
H. revolvens Schw.
H. riparium L.
H. riparioides Hedw.
H. rugosum Ehrh.
H. ruscifolium Neck.
H. rutabulum L.
 γ. aureo — virens
 Brid.
H. salebrosum Hoffm.
H. Schreberi Willdw.
H. scorpioides L.
H. splendens Hedw.
H. serpens L.
 β. spinulosum Sm.
 γ. byssoides Brid.
H. squarrosum L.
H. Starkii Web. et Mohr.
H. stellatum Schreb.
H. stramineum Dicks.
H. sylvaticum L.
 β. denticulatum Turn
H. subsphaericarpon
 Schw.
H. tamariscinum Hedw.
H. triquetrum L.
H. uncinatum L.
H. velutinum L.
 β. sericea Hübner.
LXIII. Fontinalis Linn. (Hüll-
 moos).
F. antipyretica L.
F. squamosa L.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum](#)

Jahr/Year: 1865

Band/Volume: [3_12](#)

Autor(en)/Author(s): Perkthold Anton

Artikel/Article: [Verzeichniss der in den Umgebungen von Innsbruck, Lizens und Tarrenz aufgefundenen Leber- und Laubmoose, nebst einigen, die aus Südtirol sind mitgetheilt worden. 47-53](#)