Die in Tirol und Vorarlberg

vorkommenden Arten der Gattungen

Oxygraphis, Ranunculus und Ficaria,

analytisch bearbeitet

von

J. Freyn in Smichow (Prag).

Oxygraphis Bunge.

Niedere, meist kahle Hoch-Alpenpflanze mit bleibenden Blüthendecken, dicht braunzottigem Kelch, seltener spinnwebig-seidiger Behaarung (var. *holosericeus* Gaud.), gewöhnlich weissen bis hellrosenrothen (var. *roseus* Heg.) oder dunkelpurpurrothen (var. *purpureus* Pacher), ansehnlichen Blumen und wiederholt dreitheiligen Blättern, deren Zipfel manchmal lanzettlich und von einander entfernt, (var. *crithmifolius* Rchb.) gewöhnlich aber eiförmig oder länglich und gedrungen sind: höchste Urgebirgsalpen im Felsenschutte (*Ranunc. glacialis* L.) *O. vulgaris* Freyn.

Rannunculus L. ¹⁾

0 Wasserpflanzen mit südlich-vieltheiligen untergetauchten Blättern, weissen Blüten und querrunzeligen Früchten [<i>Batrachium</i> DC.]	1
— Landpflanzen, oder anders beschaffene Wasserpflanzen	8
1 Nur untergetauchte, vieltheilige Blätter vorhanden	2
— Nebstdem auch Schwimmblätter von kreisrunder bis nierenförmiger Gestalt mit verkehrteiförmigen, halbkreisförmigen bis keilförmigen Lappen	3
2 Untergetauchte Blätter sitzend, in eine $\pm$ kreisrunde Fläche ausgebreitet, einmal 3- und dann wiederholt 2-theilig, Endzipfel länger als die ersten; Frucht geschnübelt (<i>R. divaricatus</i> Koch, nicht Hausm.) — Mehrfach verzeichnet, aber von mir nur von Trient gesehen.	
<i>R. circinnatus</i> Sibth.	
— Untergetauchte Blätter von kugeligen, ellipsoidischen oder keulenförmigen Umfange, die untersten oder alle $\pm$ gestielt	3
3 Untergetauchte Blätter von $\pm$ kugeligen Umriss; Fruchtboden $\pm$ rauhhaarig	4

¹⁾ Beim Einsammeln sind Wurzel, Blüten und möglichst reife Früchte mit zu berücksichtigen.

- Untergetauchte Blätter von keulenförmigem Umriss, sehr lang, mit linealen, $\pm$ parallelen Zipfeln. Schwimmblätter in Tirol noch nicht beobachtet. Pflanze kahl; Blütenstiel viel kürzer als das Blatt, Fruchtboden kahl, Früchte meist fehlschlagend. Blüten 5 blättrig, nur $\frac{5}{4}$ cm weit (*R. Bachii* Wirtg.) oder 5—9 blättrig bis $\frac{10}{4}$ cm weit. Nur aus dem Etschthal unter Bozen gesehen, angeblich auch in Vorarlberg, Unter-Innthal und bei Sterzing *R. fluitans* Lam.
- 4 Blütenstiele, so lang oder kürzer, als das Blatt . . . 5
- Blütenstiele bis 10 cm lang, viel länger als das Blatt, Blüten bis 2 cm weit, Fruchtboden rundlich, Schwimmblätter unbekannt. Vielleicht Form des *R. Petiveri* Koch; ob = *R. Petiveri* auct. tyr.? — nur im Reschener See *R. dolichopodus* Kern. herb.
- 5 Fruchtboden kugelig, dicht zottig 6
- Fruchtboden eiförmig bis eikegelförmig, locker rauhaarig. Pflanze klein bis mittelgross, Schwimmblätter unbekannt, Blüthe etwa 1 cm weit. Pflanze in Tirol rauhaarig und armfrüchtig, vielleicht nur Form des *R. Petiveri* Koch; *R. pantothrix* Hausm.! z. Theil; Ob = *R. Petiveri* auct. tyr.? Bei Salurn und Trient.
K. Rionii Lagg. var. oligocarpus Freyn.
- 6 Zerstreut steifhaarig, Haare kurz, an den Früchten, jungen Zweigen, Scheiden und Blättern reichlich . . . 7
- Kahl oder fast kahl: Schwimmblätter selten vorhanden und dann in unregelmässige keilförmige Zipfel getheilt [= *R. Godronii* Gren., aus Tirol noch unbekannt], gewöhnlich ohne Schwimmblätter (*R. Drouetii* F. Schz. = *R. pantothrix* Hausm.! zum Theil): Etschthal von Bozen bis Trient . . . *R. trichophyllus* Chaix.
- 7 Blüten bis 2.5 cm weit. Staubgefässe mehr als 15, Schwimmblätter regelmässig, nierenförmig bis kreisrund, 5-schnittig mit gekerbten Lappen, *R. peltatus* Schrank: angeblich im Pusterthal und bei Bozen (von mir nicht gesehen) *R. aquatilis* L. p. p.
- Blüten 1—1.5 cm weit. Staubfäden 5—15. Schwimmblätter, wenn vorhanden, mit keilförmigen, gezähnten Lappen (= v. *heterophyllus* Freyn, *R. radians* Rev., *R. tripartitus* auct. tyr.), meist jedoch fehlend (*R. aqua-*

- tilis*, *R. divaricatus* und *R. pantothrix* auct. tyr. grössten Theils), gemein *R. paucistamineus* Tausch.
- Blüten 8 mm weit und noch kleiner, Staubfäden 5—10, keine Schwimmblätter. Alpenpflanze von 8—15 cm Höhe, in die vorige übergehend, selten (*R. lutulentus* Perr. et Song.), Alpen beiderseits des Brenners; Kitzbühel
R. confervoides Fries.
- 8(0) Blüten weiss, manchmal aussen röthlich 9
— Blüten gelb. 15
- 9 Blätter ganzrandig, ungetheilt; niedrige Hochalpenpflanzen 10
— Blätter 3—5 lappig mit gelappten oder gezähnten Abschnitten, selten ungetheilt, dann aber gekerbt . . 11
- 10 Blätter herzeiförmig, an den Nerven seidig zottig bis kahl; Wurzelhals manchmal dicht faserig schopfig [= *R. Ripartii* Kern. herb., so aus Tirol noch unbekannt]. Höchste Urgebirgsalpen im mittleren u. südl. Tirol
R. parnassifolius L.
— Blätter lanzettförmig bis lineal, kahl, Stengel schaftförmig mit 1 Hochblatte. meist 1-blüthig (*R. pyrenaicus* auct. germ. nicht L.), Hochalpenristen auf Urgebirge, Porphyry und Dolomit in Süd-, im westl. und im nordwestl. Tirol *R. plantagineus* All.
- 11(9) Fruchtboden kahl, Stengel schaftförmig nur mit Hochblättern; Grundblätter nierenförmig. halbkreisförmig. 3 theilig bis ungetheilt; niedere Alpenpflanzen, deren Formen in einander übergehen 12
— Fruchtboden behaart, Stengel beblättert, Blätter handförmig vieltheilig 13
- 12 Blätter rundum gekerbt, ungetheilt oder 2 schnittig oder nur bis zu $\frac{1}{3}$ ihrer Breite 3—5 schnittig (*R. crenatus* auct. tyr., *R. Bertolonii* Hausm.), Kalkalpen nur im südlichsten Tirol (Bondone, Tremalzo, Tombea, Loria, V. di Ledro *R. bilobus* Bert.
— Blätter bis über die Mitte 3—5 theilig mit verkehrt eiförmigen, gekerbten Lappen (eine Form mit etwas schmalerer Theilung: *R. Traunfellneri* Hausm., dieser in den Brenner Alpen), auf Kalk-, Dolomit- und Urgebirgs-Alpen gemein *R. alpestris* L.
— Blätter bis zum Grunde getheilt, Zipfel lanzett-

lich: nur auf Kalkalpen, angeblich im östl. Tirol und auf der Seiseralpe (von mir nicht gesehen)

R. Traunfellneri Hoppe.

- 13(11) 50—100 cm hoch (jedoch auch kleiner), vielblütig, mit breiten Blattlappen; Fruchtboden dicht behaart, Schnabel nur $\frac{1}{2}$ so lang als die Frucht . . . 14
 — 10—15 cm hoch (nicht höher), meist 1—3 blütig; Blattzipfel $\pm$ lanzettlich, ganzrandig; Fruchtboden an der Spitze pinselförmig behaart, Schnabel so lang als die Frucht: Kalk- und Dolomit-Alpen in Süd-Tirol, mit Ausnahme des Vinstgaues und Brenner Gebietes.

R. Seguerii Vill.

- 14 Blütenstiele abstehend behaart; geht in den folgenden über. Hochalpen bis in die Voralpen an nassen Stellen

R. acnitifolius L.

- Blütenstiele kahl oder angedrückt behaart: Bergwälder bis in die Alpen R. platanifolius L.

- 15(8) Blätter ungeteilt oder schwach gelappt 16

- Blätter handförmig vieltheilig, jung gefalzt 20

- 16 Wurzel unregelmässig ästig; ausgewachsene Blätter netzförmig-aderig, rechteckig bis fast kreisrund, breiter als lang, gekerbt oder etwas gelappt, jung von beiden Rändern eingerollt, Früchte sehr gedunsen [*Thora* DC], Alpenpflanzen 17

- Wurzelstock senkrecht oder schief mit wirtelständigen Faserwurzeln. Blätter längsnervig, lanzettlich, viel länger als breit, Früchte seitlich zusammengedrückt [*Flammula* Webb], Sumpf- und Wasserpflanzen . . . 18

- 17 Wurzelfasern rübenförmig, Grundblätter meist fehlend, Stengel nur oberwärts beblättert, 1 bis vielblütig, behaart bis kahl, zur Blüthezeit gewöhnlich nur 10—15 cm hoch, manchmal höher unteres Stengelblatt sitzend, breit nierenförmig, gekerbt . . . [*R. scutatus* W. K., *R. Schottii* Dalla Torre]. Urgebirge in Süd-Tirol

R. Thora L.

- Wurzelfasern fädlich, 1 Grundblatt meist vorhanden, sowie das untere etwas gestielte Stengelblatt fast rechteckig, vorne etwas gelappt (*R. Phthora* Cz., der ältere, aber unannehmbare Name), nur auf Kalk-Alpen in Osttirol; westlich der Oetz und Etsch, mit Ausnahme des südlichsten Tirol nicht mehr R. hybridus Bria.

- 18(16) Bis 1 m hoch, armlüthig, am Grunde mit untergetauchten, röhrigen Ausläufern; Blüten 2—3 cm weit, Staubfäden 90—100, Frucht gedunsen mit breitem Schnabel von $\frac{1}{3}$ Fruchtlänge. Oft unterwärts $\pm$ abstehend rauhaarig [*R. Schmidtii* Schur], gewöhnlich kahl oder schwach behaart: Vorarlberg, Innsbruck, Etschthal von Terlan bis Salurn; angeblich auch bei Sterzing und im Vallarsa *R. Lingua* L.
- Niedriger, ohne Ausläufer, Früchte seitlich stark zusammengedrückt, kurz spitzig 19
- 19 Stengel niederliegend mit bogigen Stengelgliedern, an den Gelenken wurzelnd und daselbst 1 blüthig. Blüthe 5—8 mm weit. Niedriges, zartes Pflänzchen mit linealen Blättern; geht aber in die folgende über. Bodensee-Ufer! Rittner-Horn! sonst mehrfach angegeben
R. reptans L.
- Stengel, aufrecht bis niederliegend, an den Gelenken nicht wurzelnd, 1 — bis schirmförmig vielblüthig, Blüten bis 15 mm weit. Blätter alle gesägt (var. *serratus* DC.) oder schmal-lanzettlich, fast ganzrandig (var. *angustifolius* Wallr., *R. reptans* Hausm. z. Theil), gewöhnlich jedoch breit lanzettlich, die untersten eiförmig bis elliptisch: Thal- und Waldregion, wohl überall, aber im mittleren Süd-Tirol und Deferegggen nicht angegeben
R. Flammula L.
- 20(15) Früchte kahl, knotig warzig oder dornig 21
- Früchte flaumig behaart, gedunsen; Stengel mit fingerförmig getheilten Hochblättern, Blüten oft unvollständig: Wiesen, Wälder, sehr zerstreut; nicht im Nordwesten, nicht im Osten *R. auricomus* L.
- 21 Stengelgrund knollig verdickt, Fruchtstiele gefurcht, Kelchblätter zurückgeschlagen, Fruchtboden rauhaarig, mittleres Blattsegment meist gestielt 22
- Stengelgrund nicht knollig verdickt, manchmal ein kriechendes Rhizom vorhanden 23
- 22 Wurzelfasern cylindrisch; Hügel, Raine von der Ebene bis in die Bergregion *R. bulbosus* L.
- Wurzelfasern spindelförmig verdickt: nur am Cengio alto in Süd-Tirol, *R. Cengialti* Kern. herb., *R. Aleae* Willk.
- 23(21) Ausläuferlose Pflanzen 24
- Mit $\pm$ langen Ausläufern. Kelch abstehend, Früchte

- glatt. Manchmal ohne Hauptstengel und nur die Ausläufer blühend [*R. prostratus* Flörke], meist jedoch aufrechte, blühende Stengel und sterile Ausläufer vorhanden: an feuchten Orten bis in die Alpenregion gemein *R. repens* L.
- 24 Früchte am Rande scharf gekielt, an den Seiten nicht runzlig 25
- Früchte am Rande rundum fein rinnig, an den Seiten quer runzlig, zahlreich in einer länglichen oder elliptischen Aehre, letztere selten kugelig [= var. *globosus* Freyn], Blüten ganz klein, gelb. Kahle Wasserpflanze in den wärmeren Landestheilen sehr zerstreut
R. sceleratus L.
- 25 Fruchtboden kahl 26
- Fruchtboden rauhaarig oder an der Spitze mit einem Haarpinsel 30
- 26 Hohe, ausdauernde, vielblüthige Pflanzen, mit glatten Früchten, drehrunden Fruchstielen und abstehendem Kelch 27
- Niedrige, vom Grunde an ästige, einjährige Pflanze, Blüten winzig, blattwinkelständig abstehend, Kelch zurückgeschlagen, Früchte knotig-rauh. Angeblich zwischen Limone und Gargnano am Gardasee und im Vallarsa
R. parviflorus L.
- 27 Wurzelstock senkrecht, kurz, abgebissen, ohne Niederblätter 28
- Wurzelstock horizontal, ästig, bis fingerdick mit grossen, schuppenförmigen, häutigen Niederblättern; Fruchtschnäbel dreieckig, spitz; angeblich in Tirol
R. Steveni Andr.
- 28 Blüten goldgelb, Fruchtschnabel kurz dreieckig, viel kürzer als die Frucht 29
- Blüten fast orangegelb, Fruchtschnabel halb so lang als die Frucht, eingerollt; Pflanze abstehend rauhaarig: in Wäldern bis in die Voralpen, jedoch im Oetz- und Lechgebiet nicht angegeben . . . *R. lanuginosus* L.
- 29 Stengel bereift bis abstehend rauhaarig, Blätter zerstreut behaart bis kahl, breitlappig (dann *R. Steveni* Hausm.) oder schmalzipflig: auf Wiesen bis in die Alpen wohl gemein; *R. napellifolius* Crantz, *R. Boeraeanus* Jord., *R. acris* L.

- Stengel und Blätter dicht angedrückt-seidenhaarig, schimmernd, sonst wie Vor., in welchen er übergeht. Vor-alpen auf Schiefer im Brennergebiet, *R. sericans* Kern. herb. *R. Kernerii* Freyn.
- 30(25) Kelchblätter abstehend 31
 — Kelchblätter zurückgeschlagen. Einjährige Pflanze mit flach zusammengedrückten, scharf gekielten Früchten, dreieckigem Fruchtschnabel, gefurchem Blütenstiel, u. z. reichlich behaart, Achänen glatt (var. *laevis* Cel.), oder kahl bis schwach behaart, Achänen glatt oder jederseits mit einer concentrischen Wärrchen-Reihe (var. *intermedius* DC.), oder dicht rauhaarig-zottig, einreihig warzig oder einreihig knotig (= *R. hirsutus* Curt.) oder rauhaarig mit überall knotigen Achänen (= var. *tuberculatus* Cel.) oder winzig, fast nur 1 blüthig (= *R. parvulus* L.). Unter-Innthal, Süd-Tirol (*R. Philonotis* Ehrh.). *R. sardous* Crantz.
- 31 Einjährig mit knotigen oder dornigen und dabei lang geschnäbelten Früchten 32
 — Ausdauernde, mit glatten Früchten 33
- 32 Niedrig, spreizend ästig, starr, mit dicken gefurchten blattwinkelständigen Blütenstielen; Blüthe goldgelb; Frucht knotig mit dolchförmigem Schnabel; Fruchtboden pinselförmig behaart; Blätter handförmig getheilt; an feuchten Stellen, angeblich in Tirol *R. muricatus* L.
 — Aufrecht, oberwärts ästig; Fruchtsiele dünn drehrund, Blüten schwefelgelb, Früchte dornig mit pfriemlichem Schnabel, Fruchtboden rauhaarig, Blätter fächerförmig getheilt. Saaten, zerstreut und zusehends häufiger werdend *R. arvensis* L.
- 33(31) Winzige Hochalpenpflanze, 2—3 cm (selten 5 cm) hoch, 1 blüthig; Blätter querebreiter, 5 lappig, Früchtchen gedunsen mit hakigem Schnabel. Höchste Centralalpen auf Urgebirge (*R. Tappeineri* Bamb.)
R. pygmaeus Wahlenb.
 — Anders beschaffene Pflanze, Blätter handförmig getheilt 34
- 34 Fruchtsiele gefurcht, Früchte flach zusammengedrückt 35
 — Fruchtsiele drehrund, Früchte gedunsen 36
- 35 Grund- und Stengelblätter schmalzipflig, Fruchtschnabel meist = $\frac{1}{3}$ Frucht, stark gekrümmt bis etwas ein-

gerollt (*R. polyanthemos* auct. tyr.) Hügel, Triften; im Inngebiet, Vinstgau und bei Bozen

R. polyanthemoides Bor.

— Grundblätter breitlappig, Stengelblätter meist hochblattartig, Fruchtschnabel meist = $\frac{1}{2}$ der Achäne, stark eingerollt. Auf Alpentriften kleiner mit orangegelben Blüten (*R. aureus* Schleich.), in tieferen Lagen hochwüchsig, mit gelben Blüten; in Tirol verbreitet aber im Lechgebiet, V. di Sole, Fassa und Judicarien nicht angegeben *R. nemorosus* DC.

36(34) Kahl, nur der Stengel oben angedrückt behaart, Laub dicklich im Umriss 5 eckig bis nierenförmig, mit offenen Blattbuchten 37

— Abstehend weichhaarig, Blätter papierartig dünn, $\pm$ kreisrund oder eiförmig mit breit rhombischen, übergreifenden Lappen (*R. Villarsii* Koch, *R. Hornschuchii* Hoppe) Kalkalpen verbreitet . *R. Breyninus* Crantz.

37 Blattabschnitte breit, eingeschnitten oder gekerbt; bis 40 cm hoch, grossblättrig, 1—2 blüthig (= β *major* Koch), oder zwergig (= *R. gracilis* Schleich.); Alpentriften bis in die Bergregion, gemein

R. montanus Willd.

— Blattabschnitte schmal, spatelig lanzettlich, bis länglich, sonst wie vor., Kalkalpen des südlichsten Tirol (angeblich Andalo, Bondone) . . *R. carinthiacus* Hoppe.

Ficaria Dill.

Niedrige Frühjahrspflanzen mit rübenförmigen Wurzelfasern, gelben Blüten, meist fehlschlagenden Früchten und lang gestielten herzeiförmigen, ungetheilten Blättern (*Ranunculus Ficaria* L.); Gebüsche der Ebene bis in die untere Bergregion; jedoch im Lechgebiet, Fassa und Val di Sole nicht angegeben *F. verna* Huds.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [3 37](#)

Autor(en)/Author(s): Freyn Joseph Franz

Artikel/Article: [Die in Tirol und Vorarlberg vorkommenden Arten der Gattungen Oxygraphis, Ranunculus und Ficaria. 263-272](#)