

2. Nachtrag zu den „Kleinschmetterlingen“ Mecklenburg-Vorpommerns (Lepidoptera: Pyralidae, Tortricidae, Gelechiidae, Oecoporidae, Yponomeutidae, Gracillariidae, Momphidae)

UWE DEUTSCHMANN

Seit 1998 stellt der Autor seine in Mecklenburg nachgewiesenen Kleinschmetterlingsarten in der Vereinszeitschrift „Virgo“ vor. Im „Virgo“ Nr. 10 (Jahrgang 2007) wurde die erste Ergänzung zu den Pyralidae, Tortricidae und Gelechiidae veröffentlicht. Zwischenzeitlich sind weitere Familien der Kleinschmetterlinge vorgestellt worden und es gab vom Autor aus Mecklenburg weitere interessante Nachweise aus diesen Familien seit 1980.

Die Nummern der einzelnen Arten entsprechen den Nummern nach der Europaliste von KARSHOLT & RAZOWSKI (1990).

Pyralidae

5811 *Hypochalcia ahenella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Am 8. 6.2007 erschien ein Falter dieser Art am Licht an den Trockenhängen bei Sternberg. Die Art ist ein Wiederfund für Mecklenburg-Vorpommern (MV).

6229 *Friedlanderia cicatricella* (HÜBNER, 1824)

Die Trockenhänge bei Sternberg werden durch mehrere Seen mit entsprechender Ufervegetation begrenzt. Am 16.7.2007 erschien ein Männchen dieser Art an die 250 Watt-Mischlichtlampe des Autors, die in Sichtweite des Sees aufgestellt war. Die Art ist ein Wiederfund für MV.



Abb. 1: *F. cicatricella* (22 mm)

Tortricidae

4334 *Cochylidia rupicola* (CURTIS, 1834)

Am 25.7.2008 konnte der Autor einen weiteren Falter am Licht am Rande der Ortschaft Jasnitz bei

Ludwigslust in einem Mischwald mit Alteichenbeständen nachweisen. Es ist der 2. Fundort in MV.

4403 *Exapate congelatella* (CLERCK, 1759)

Der Falter flog am 13.11.2009 in der Wohnung des Autors in Buchholz bei Rubow. Es ist ein Wiederfund. Weitere Nachweise aus den vergangenen Jahren sind dem Autor nicht bekannt.

4577 *Pandemis cinnamomeana* (TREITSCHKE, 1830)

Ein Falter dieser in Mecklenburg seltenen Art wurde am 18.6.2008 im Röggeliner Wald bei Dechow am Licht gefangen.

4882 *Zeiraphera griseana* (HÜBNER, 1799)

Die Art wurde am 16.7.2007 auf einer Ginsterheide bei Sternberg und am 21.7.2007 auf einem Magerrasen bei Retzow am Licht gefangen. Es ist ein Neunachweis für MV.

5131 *Cydia duplicana* (ZETTERSTEDT, 1839)

Nach den Meldungen in GAEDIKE und HEINICKE ist die Art seit 1980 nicht mehr gefunden wurden. Am 29.7.2009 kam ein Falter dieser Art in einem Mischwald bei Bad Kleinen an das Licht des Autors. Die Art ist neu für MV

5154 *Cydia amplana* (HÜBNER, 1800)

Im „Virgo“ 10/2007 Heft 1 „Nachträge zu den „Kleinschmetterlingen“ Mecklenburg-Vorpommerns“ wurde *C. amplana* vom Autor als eine seltene Art in Mecklenburg genannt. Damals gab es nur zwei Nachweise dieser Art. In den vergangenen Jahren ist die Art relativ häufig am Licht beobachtet worden, in einigen guten Fangnächten bis zu 20 Tieren. So Anfang bis Mitte August 2009 und 2010 in Jasnitz bei Ludwigslust und 2010 in Buchholz bei Rubow.

Gelechiidae

3427 *Teleiodes fugitivella* (ZELLER, 1839)

Auf einer Ruderalfläche einer ehemaligen Kiesgrube bei Ventschow wurde ein Falter am 14.7.2007 am Licht gefangen. Die Art ist ein Neunachweis für MV.

3431 *Teleiodes wagae* (NOWICKI, 1860)

Beim Abstreifen der Vaccinium-Bestände wurde am 25.5.2009 im Grambower Moorwald ein

Männchen dieser nachgewiesen. Die Art ist ein Wiederfund für MV.

3470 *Gelechia scotinella* HERRICH-SCHÄFFER, 1854

Am 14.7.2007 konnte der Autor ein Exemplar auf einer Ruderalfläche bei Ventschow nachweisen. Die Art ist ein Neufund für MV.

3591 *Scrobipalpa clintoni* POVOLNY, 1968

Nach den Hinweisen Kieler Entomologen auf der Tagung der Kleinschmetterlingsexperten in Schwerin 2008 sammelte der Autor die trockenen Stiele vom Ampfer auf dem Salzgrasland bei Fährdorf/Insel Poel. Vom 5. bis 10.2.2009 schlüpfen mehrere Falter dieser Art aus den Ampferstielen. Die Art ist ein Neufund für MV.

3619 *Scrobipalpa ocellatella* (BOYD, 1858)

Die Art wurde am 14.5.2007 auf einer Ginsterheide bei Plate in der Nähe Schwerins erstmalig für MV nachgewiesen. Ein weiterer Nachweis gelang am 26.08.2009 am Mühlenbach bei Kraak in der Nähe von Rastow.

Oecophoridae

2261 *Denisia cf. albimaculea* (HAWORTH, 1828)

Am 12.6.2006 fing der Autor eine *Denisia*-Art (Weibchen) am Rande eines Mischwaldes mit alten Eichenbeständen und Fichtenkulturen im Schlosspark Ludwigslust. Auf der Grundlage des Genitalpräparates konnte der Autor den Falter nicht eindeutig erkennen. Es handelt sich entweder um *Denisia albimaculea* oder *D. augustella*. Der Nachweis muss nochmals von einem Spezialisten untersucht werden.



Abb. 2: *D. cf. albimaculea* (10 mm)

2288 *Borkhausenia luridicomella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1856)

Am 19.7.2006 konnte der Autor ein Exemplar dieser Art auf den Magerrasenflächen bei Pinnow in der Nähe Schwerins am Licht nachweisen. Die Art ist der zweite Nachweis für MV.

2310 *Epicallima formosella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Am 25.7.2008 konnte der Autor erstmalig in MV zwei Exemplare dieser Art in einem Garten bei Jasnitz in der Nähe von Ludwigslust am Licht nachweisen.

Am 13.7.2010 wurden mehrere Tiere dieser Art am Rande eines Mischwaldes mit alten Eichenbeständen im Schlossgarten Ludwigslust gefangen

Yponomeutidae

1359 *Zelleria hepariella* STANTON, 1849

Diese Art wurde am 6. 8.2004 im Grambow Moor nachgewiesen Sie ist ein Neufund für MV.



Abb. 3: *Z. hepariella* (10 mm)

1460 *Argyrestia fundella* (FISCHER v. RÖSLERSTAMM, 1835)

Am 2.6.2008 konnte diese Art in einem Mischwald bei mit Fichtenbeständen erstmalig vom Autor nachgewiesen werden. Die Art ist ein Wiederfund für MV.

1465 *Argyresthia semifusca* (HAWORTH, 1828)

Die Art wurde am 15.6.2009 Buchholz bei Rubow und am 17.6.2009 in Pinnow bei Schwerin gefunden. Sie ist ein Wiederfund für MV.

Gracillariidae

1117 *Caloptilia falconipennella* (HÜBNER, 1813)

Am 1.10.2008 fing der Autor einen Falter in einer Gartenanlage in Buchholz bei Rubow am Licht. Die Art ist ein Wiederfund für MV.

1213 *Phyllonorycter anderidae* (W. FLETCHER, 1885)

Im Herbst 2007 sammelte der Autor Blätter der Moorbirke (*Betula pubescens*) mit typischen Minen der *P. anderidae* auf dem Schwingrasen des Grambower Moores. Am 5.2.2008 schlüpfte ein Falter dieser Art. Die Art ist ein Neufund für MV. Die Minen sind jedes Jahr relativ häufig zu finden, jedoch scheint die Zucht schwierig zu sein.

1267 *Phyllonorycter lantanella* (SCHRANK, 1802)

Nach den Hinweisen von A. Stübner, Peitz, sammelte der Autor im Herbst 2008 Blättern mit Minen am Wolligen Schneeball (*Viburnum lantana*) in Schwerin-Mueß. Die ersten Falter schlüpfen bei Zimmertemperatur ab dem 10.2.2009. Die Art ist ein Neufund für MV.

Momphidae

2878 *Mompha terminella* (Humphrys & Westwood, 1845)

Am 14.6. und 5.7.2008 wurden im Röggeliner Wald bei Dechow mehrere Falter dieser Art am Licht nachgewiesen. Die Art ist ein Neufund für MV.



Abb. 4: *M. terminella* (10 mm)

Literatur (Auswahl)

GAEDIKE, R. & W. HEINICKE (1999) (Hrsg.): Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Entomofauna Germanica 3).-Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) Beiheft 5, 1-216

KARSHOLT, O. & J. RAZOWSKI (1966): The Lepidoptera of Europa (A Distributional Checklist). Apollo Books, Stenstrup.

RAZOWSKI, J. (2001): Die Tortriciden (Lepidoptera, Tortricidae) Mitteleuropas; Bestimmung-Verbreitung-Flugstandort-Lebensweise der Raupen; Bratislava (Slowakei).

ELSNER, G; HUEMER, P & Z. TOKAR (1999): Die Palpenmotten (Gelechiidae) Mitteleuropas. Bestimmung-Verbreitung-Flugstandort-Lebensweise der Raupen; Bratislava (Slowakei).

Adresse des Verfassers: Uwe Deutschmann,
Feldstr. 5, 19067 Buchholz;
uwe_deutschmann@web.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Virgo - Mitteilungsblatt des Entomologischen Vereins Mecklenburg](#)

Jahr/Year: 2010

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Deutschmann Uwe

Artikel/Article: [2. Nachtrag zu den „Kleinschmetterlingen“ Mecklenburg-Vorpommerns \(Lepidoptera: Pyralidae, Tortricidae, Gelechiidae, Oecoporidae, Yponomeutidae, Gracillariidae, Momphidae\) 47-49](#)