- Necrophorus humator* Goeze Piazza auf Aas.
 — — *vespillo* L. Piazza auf Aas.
Necrodes litoralis L. Geroli auf Pferdekadaver
Chanathophilus rugosus L. Geroli, dto.
 — — *sinuatus* F. Geroli, dto.
Aclypea undata Müll. Geroli
Silpha carinata v. *aultriaca* Otto Geroli
 — — *tyrolensis* Laich. u. *nigrita* Creutz. Col Santoplateau.
 — — *trifidis* Ill. Geroli.
 — — *obscura* L. Geroli.
Hydnobius punctatus Strm. Col. Santodplateau.
Anilotoma castanea Herbst Geroli unter Baumrinde.
Amphicyllis leriapunctata Bris. Geroli.
Agathidium atrum Payk. Geroli unter Baumrinde.

Die Variationen von *Melolontha pectoralis* Germ.

von Erwin Schaubberger.

Der April 1916 brachte in Südtirol ein Massenauf-treten der *Melolontha pectoralis* Germ. und gab mir Gelegenheit, diese wie die übrigen bei uns heimischen Arten stark variierende Art genauer zu untersuchen und ihre biologische Stellung zu prüfen. Schon Ende März konnte ich das Auf-treten auf *Rubus* in Mezolombardo beobachten, Ende Mai und anfangs Juni fand ich sie noch im Gebirge zwischen Astico und Gisch. In der Futterpflanze ist diese Art nicht wählerisch, ich traf sie später in Massen auf Weiden und an den Weinstöcken.

Bevor ich an die Beschreibung gehe, halte ich des Erwähnens für notwendig, daß innerhalb des Genus *Melolontha* noch viele Zweifel bestehen bezüglich der Artabgrenzung und der Zuteilung der entdeckten Formen. So war die Stellung von *spatulata*, *fosca*, *soror* v. lange Zeit schwankend, die Zuteilung zu *pectoralis*, zu der sich Reitter in seinen Best. Tab. H. 50 entschied, scheint aber auch keine glückliche Lösung zu bringen. Bei den Formen, die hier in Betracht kommen, der *tibialis* Kr., *vulgaris* Lin., *velepitica* Müll. und *pectoralis* Germ. nebst den kaukasischen Formen, scheint es schwierig zu sein, eine genaue und ausreichende Artabgrenzung zu treffen, die Bildung der Sexualorgane läßt bei keiner der Genannten eine Unterscheidung zu. Ich glaube, daß sich bei allen Formen das Gesamtmaterial nur biologisch trennen läßt, daß wir es hier nicht mit Arten, sondern nur mit biologischen Rassen einer weitverbreiteten Art zu tun haben. *Tibialis* Kr.

scheide ich von vorn herein aus, da mir momentan keine Stücke zugänglich sind, doch will ich eine Anregung zu neuer Untersuchung auch dieser Art gegeben haben.

Beschrieben sind von der *pectoralis* Germ. die *forma typica* und *v. spatulata* Stev. aus Mitteleuropa und Kaukasus, die Formen *fosca* Rtt., *Ilsia* Rtt., *Satema* Rtt. und *soror* Mars. aus dem Kaukasus. Ob wir es bei letzteren mit Rassen oder Varietäten der *pectoralis* zu tun haben ist nun die Frage.

Geographisch ist die Stellung folgende: Die größte Verbreitung hat die *vulgaris*, sie wird auf die Formen aus Nord- und Mitteleuropa, Herzegowina, Montenegro und Kaukasus aufgestellt. Außer ihr findet sich in Mitteleuropa die *pectoralis* Germ., die nach meinen Funden in Südtirol und den dabei gemachten Beobachtungen die *vulgaris* ausschließt, *vulgaris* konnte ich kein Stück antreffen, während *hippocastani* Fbr. wohl etwas später, dann aber in Menge zu finden war. Der Kaukasus birgt neben *vulgaris* ebenfalls *pectoralis* und die als Varietäten derselben beschriebenen Formen (das Auftreten der *vulgaris* im Kaukasus halte ich übrigens für eine Verwechslung mit Formen der *pectoralis* des Kaukasus). Dazwischen klafft eine Lücke, die die *Velepitica* Müll. des Velepitzgebirges ausfüllt, die als Rasse der *vulgaris* beschrieben wurde. (Dr. Priesner, Linz, stellte mir eine Form aus Bosnien zur Verfügung, die ich mit *Velepitica* Müll. identifiziere, die Patriaangabe scheint demnach zu eng zu sein). Als nahe Verwandte reiht sich die *tibialis* Kr. Persiens an das kaukasische Verbreitungsgebiet.

Meine *pectoralis* hielt ich anfangs für die typische *vulgaris* mit größerem Variationsumfang, als bisher beschrieben wurde. Doch beim Sortieren und Vergleichen des Materials zwang mich die große Variabilität und die Fülle der von *vulgaris* deutlich abweichenden Formen, die ich aber von den *vulgaris* ähnlichen nicht trennen durfte, diesen ganzen Formenkomplex der *vulgaris* gegenüberzustellen. Morphologisch sind diese Unterschiede gering und meist durch Uebergänge vermischt; sie bestehen in der Form des Pygidium, die mit der der *pectoralis* der Beschreibung vollkommen übereinstimmt, in der bei gut erhaltenen Stücken in der Mitte des Halschildes dichteren Behaarung, der insolgedessen dichter gestellten Punktierung der Mitte und der Seiten des Halschildes, der ziemlich konstant auftretenden grünlichen bis bronzenen Metallfärbung von Kopf, Halschild, Scutellum, und Pygidium

und der in der Regel längeren und stärker gebogenen Fühlerfahne des Männchens. Biologisch bildet die untrennbare Vereinigung von mit *vulgaris* übereinstimmenden und von ihr deutlich differenzierten Formen zu einer lokal gebundenen exklusiven Einheit, das auch für Südtirol bedeutend frühere Auftreten und der erste und hauptsächlichste Fund auf *Rubus* das entscheidende und meiner Ansicht nach maßgebende Trennungsmoment.

Velepitica Müll. mit ihrem geringen Variationsumfang kann nicht in Betracht kommen. So bleiben nur drei Möglichkeiten: es kann 1. eine bisher unbekannt gebliebene Rasse von *vulgaris*, 2. eine sich abspaltende und im Sinne Darwins zu einer neuen Art affreszierende Form eben der *vulgaris* sein, was sich aus dem durch Hinauschieben des einen Extrems vergrößerten Variationsumfang und den zahlreichen Formenübergängen ja erklären ließe, und 3. eine mit *pectoralis* zu identifizierende Formengruppe.

Die ersten beiden Möglichkeiten sind unwahrscheinlicher als die letzte, denn das Auftreten der *pectoralis* in Mitteleuropa scheint ja so ziemlich sicher zu sein. Ich stelle daher die gefundenen Formen als mit *pectoralis* Germ. identisch auf.

Von der für *pectoralis* gegebenen Beschreibung weichen meine Formen ab, eine in der Mitte deutlich abstehende längere Behaarung des Pygidium fand ich höchstens bei einigen Stücken angedeutet. Doch sind die kaukasischen Stücke mit den mitteleuropäischen zu einer Art zusammengeworfen, da kann leicht ein Merkmal fremder Formen auch heimischen übertragen worden sein, ohne daß es sich tatsächlich vorfindet. Die weite örtliche Trennung spricht für eine Sonderstellung beider und wie oben schon angedeutet, stelle ich die *pectoralis* Eur. med. und *pectoralis* Caucasi der *Velepitica* und *vulgaris* als biologische Rassen gleich und schlage die Vereinigung aller vier zur Art *vulgaris* vor. Desgleichen ist die Form *spatulata* Stev. in eine *spatulata* Eur. med. und *spatulata* Cauc. zu scheiden, *fosca* Rtt., *Ilsia* Rtt., *Satema* Rtt. und *soror* Mars. behalten ihre natürliche Stellung innerhalb der *pectoralis* Caucasi. Zweifelhaft ist nun noch die Stellung der *albida* Muls., sie dürfte eher zu *pectoralis* Eur. med. als zu *vulgaris* gehören.

Die Zusammenstellung der *vulgaris*-Gruppe wäre dann folgende:

Melolontha vulgaris vulgaris Lin. f. typ., femoralis Kr.
 albida Redt., pulche-
 rima D. Torre, scapu-
 laris Westh., lugu-
 bris Muls., margi-
 nata Kr., discicollis
 Muls., humeralis
 Westh., ruficollis
 Muls., ruficeps Kr.
vulgaris pectoralis Germ. mit den nachstehend beschriebenen
 Formen.

vulgaris velepitica Müll.

vulgaris pectoralis Caucasi f. typ., fosca Rtt.,
 llsia Rtt., Satema
 Rtt., soror Mars,
 spatulata Caucasi. ✕

Gerade das Massenvorkommen und der große Formen-
 reichthum dürften die Ursache der schwierigen Unterscheidungs-
 möglichkeit sein, was zur Folge hat, daß die Art bisher noch
 ziemlich unbekannt geblieben ist und daß bei genauerer Kenntnis
 sicherlich noch einige Rassen aufgestellt werden müssen.

Nun zur *pectoralis* selbst.

Diese Rasse stellt sich auf Grund des Beobachtungs-
 materials als eine Summe von Variationen dar, die nach
 verschiedenen Momenten differenziert werden kann. Die Größe
 läßt sich nicht als Einteilungsgrund verwenden, da sie bei
 allen Formen ziemlich gleichmäßig variiert, ich sowohl extrem
 große wie extrem kleine Stücke erbeutete. In der Form des
 Pygidium sind auch überall Uebergänge bemerkbar, doch lassen
 sich hier sowohl beim Männchen als auch beim Weibchen drei
 Formen festhalten, beim Männchen ist es stets in eine lange
 Spitze ausgezogen, die bald schmaler, bald breiter, bei einigen
 Stücken aber schaufelförmig ausgebildet und an der Spitze
 stark ansgerandet ist, letztere Form traf ich auch bei Weibchen
 an, daneben solche mit normal ausgezogener Spitze und solche
 ohne Verlängerung. Letztere Form wurde als *typica* beschrieben.
 Auch bezüglich der weißen haarförmigen Beschuppung sind
 Uebergänge sehr zahlreich, eine graue Behaarung konnte ich
 nicht wahrnehmen, dagegen sehen wohl Stücke mit hellerer
 Grundfärbung und dünnergestellten schmälere Schuppen wie
 grau behaart aus, bei dunkleren oder dichter beschuppten muß
 man schon bei oberflächlicher Betrachtung weiße schuppige Be-
 haarung feststellen. Die Größe und Breite der weißen

Schuppenhaare ist verschieden, auch hier sind der *albida* Redt. entsprechende Formen mit außergewöhnlich breiten weißen Schuppen anzutreffen. Die von mir als typisch angenommene Beschuppung ist der der *vulgaris* f. *typ.* gleich, es dürften sich dadurch Differenzen mit der *pectoralis* Germ. bezw. *albida* Er. ergeben. Dichte Beschuppung fand ich nur als Ausnahme nicht als Regel, möglich ist es, daß sich *albida* Er. als neue Klasse zu *vulgaris* darstellen läßt, ist dies nicht der Fall, so läßt sie sich neben *pectoralis* f. *typ.* stellen und unterscheidet sich von der von mir aufgefundenen dichtbeschuppten Form nur durch das Pygidium des Weibchens. Wird *albida* Muls. in die *pectoralis*-Reihe aufgenommen, so tritt wohl eine Kollision mit *albida* Er. ein.

In der Färbung können ebenso wie bei *vulgaris* Zwischenformen festgehalten werden, auch hier sind Uebergänge zahlreich. Kopf und Halschild sind durch Grün- bis Bronze-schimmer charakterisiert, der auch bei Formen mit rotem Kopf und Halschild vorhanden bleibt. Manchmal ist blos das Scutellum gerötet, aber stets mit Metallschimmer. Das Pygidium ist meist braun, öfters auch dunkel bis tiefschwarz, immer mit Metallschimmer. Die Flügeldecken sind normal hellbraun, an den Epipleuren und am Schulterhöcker oft angedunkelt, selten ganz dunkel; die Beine sind in der Regel ganz hell, oft sind die Hintersehenkel geschwärzt.

Wie schon oben erwähnt handelt es sich bei den festgelegten Abänderungen um Formen, die wie bei der *vulgaris* Lin. oder *hippocastani* Fbr. keinen anderen Zweck haben, als das Bild der Klasse, die sich ja als die Summe der Formen darstellt, genügend zu charakterisieren. Auch die kaukasischen Formen dürften keine andere Bedeutung haben. In der nun folgenden Zusammenstellung verwende ich den meine Arbeiten leitenden Grundsätzen entsprechend nicht Namen sondern nur Buchstaben, trotzdem haben neu angeführte Formen als solche zu gelten, auch wenn ich von der noch herrschenden Unsitte, die mir das Recht gibt, auch für geringfügige Variationen Namen zu erfinden, keinen Gebrauch mache

A Pyg. ♂ ♀ ähnlich wie bei *vulgaris* Lin. K. u. S.
dunkel

- 1'' Pyg. hell, Fl. hell, S. Sch. braun forma A α
1' Pyg. dunkel
2''' Fl. hell forma A β
2'' Fl. hell, Epipleuren angedunkelt forma A γ
2'' Fl. hell, Schuppen breit und dicht gestellt

- wie albida Redt forma A δ
 2' Fl. dunkel forma A ε
 B Pyg. ♂ ♀ mit breiter winkelig ausgerandeter
 Spitze, sonst wie A a forma B a
 C Pyg. ♂ etwas schmaler ausgezogen, ♀
 ohne Verlängerung
 3'' N. HS. u. Schildchen dunkel
 4'' Pyg. hell
 5'' Fl. hell, Beine hell als typica forma C a
 5'' Fl. hell, Beine dunkel forma C β
 5'' Fl. hell mit dunklen Epipleuren, Beine hell forma C γ
 5' Fl. hell, Schuppen breit und dicht gestellt
 wie A δ (albida Er? albida Muls?)
 4' Pyg. dunkel
 6'' Fl. hell, Epipl. u. Humeralgegend geschwärzt
 Beine hell forma C δ
 6' Fl. dunkel forma C ε
 3'' Schildchen rot, sonst wie C a forma C ξ
 3' N. dunkel, HS. mehr oder weniger rot,
 Schildchen meist rot
 7'' HS. Mitte rot forma C η
 7' HS. ganz rot (v. spatulata Stev. Eur. m.) forma C θ

Der Einheit halber wäre es vorteilhaft, wenn eine
 derartige Durchführung unter Ausschaltung unnötiger Namen
 auch bei den übrigen Klassen erfolgen würde, doch wäre eine
 allgemeine Verständigung der maßgebenden Coleopterologen
 erforderlich, um die günstigste und übersichtlichste Darstellungs-
 art herauszufinden, mit deren Einführung sich die berufenen
 Monographen befassen möchten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Veröffentlichungen des Naturwissenschaftlichen Klubs in Linz](#)

Jahr/Year: 1919

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Schaubberger E.

Artikel/Article: [Die Variationen von *Melolontha pectoralis* Germ. 38-43](#)