

Manfred Delpho

Farbberingte Kormorane (*Phalacrocorax carbo*) im NSG „Reiherteich bei Böddinger“

Seit 1983 besteht das NSG "Reiherteich" bei Felsberg-Böddiger. Die ehemalige Kiesabbaufäche entwickelte sich zu einem der wichtigsten Rastplätze durchziehender Wasservogelarten im unteren Edergebiet. Auch der Kormoran wird regelmäßig im Frühjahr und Herbst auf dem Durchzug beobachtet.

Vom 11.4. bis 19.4.86 rasteten bis zu 20 Exemplare, darunter auch zwei farbberingte Vögel, im Bereich des Naturschutzgebietes. Bevorzugter Ruheplatz war eine künstliche Schwiminsel, die auf der offenen Wasserfläche verankert ist. Von einem Beobachtungsstand aus konnte ich die Nummern der beiden mit roten Ringen gekennzeichneten Kormorane mit dem Spektiv ablesen. Nachforschungen ergaben, daß die beiden Kormorane am 8.6.83 und 8.6.84 auf Fyn (Fünen), Dänemark (Koordinaten: 55.08 N / 10.24 E) von Mitarbeitern des Zoologischen Museums Kopenhagen nestjung beringt worden waren.

Auch SPERNER (1983) erwähnt einen 1980 in Dänemark (Horsens Fjord) beringten Kormoran, der 1982 von K. STAIBER auf dem Twistesee beobachtet wurde.

Literatur:

Sperner, K. (1983): Das Auftreten des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*) im Kreis Waldeck-Frankenberg und im Raum Fritzlar-Homberg. Vogelkundliche Hefte Edertal 9, S. 42-50

Anschrift des Verfassers:

Manfred Delpho, Am Rain 10, 3505 Gudensberg-Obervorschütz

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelkundliche Hefte Edertal](#)

Jahr/Year: 1988

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Delpho Manfred

Artikel/Article: [Farbberingte Kormorane \(*Phalacrocorax carbo*\) im NSG „Reiherteich bei Böddinger“ 27](#)