Vogelkundliche Hefte Edertal 25 (1999): S. 112 – 184

Falko Emde, Ralf Enderlein Eckhard Richter und Heinz-Günther Schneider

Avifaunistischer Sammelbericht für den Kreis Waldeck-Frankenberg über den Zeitraum von August 1997 bis Juli 1998

A. Allgemeiner Teil

Für den Sammelbericht stellten folgende Damen und Herren ihr Beobachtungsmaterial zur Verfügung (Abkürzung in Klammern):

Simon Fabian Becker, Korbach (SFB)
Philipp Becker, Korbach (PhB)
Willi Becker, Burgwald-Ernsthausen (WBe)
Wilhelm Breßler, Vöhl-Ederbringhausen (WB)
Reinhard Eckstein, Marburg – Haddamshausen (REc)
Falko Emde, Bad Wildungen (FE)
Ralf Enderlein, Korbach (REn)
Günter Faust, Frankenberg (GF)
Achim Frede, Vöhl-Basdorf (AF)
Alfred Gottmann, Diemelsee-Benkhausen (AG)
Karsten Grebe, Korbach (KG)
Bernd Hannover, Bad Wildungen (BH)
Heinrich Heck, Edertal-Böhne (HH)
Erika Höhle, Edertal-Mehlen (EH)
Manfred Hölker, Bad Sassendorf (MH)
Michael Hoffmann, Burgwald – Bottendorf (MHo)
Markus Jungermann, Edertal-Mehlen (MJ)
Gerhard Kalden, Frankenberg (GKa)
Thorsten Kleine, Korbach-Rhena (ThK)
Gerhard Kuhnhenne, Lichtenfels-Goddelsheim (GKu)
Anneliese Kuprian, Bad Arolsen (AK)
Michael Lay, Rosenthal (ML)
Volker Lucan, Wolfhagen (VL)
Wolfgang Lübcke, Edertal-Giflitz (WL)
Felix Normann, Burgwald – Bottendorf (FN)
Walter Meier, Edertal-Affoldern (WM)
Herbert Niem, Bad Wildungen-Reinhardshausen (HN)
Jochen Paleit, Höxter (JP)
Falk Paltinat, Edertal-Anraff (FP)
Eckhard Richter, Frankenau - Altenlotheim (ERi)

Herbert Ruhwedel, Frankenau (HR)
Alexander Rundau, Söhrewald (AR)
Frank Schäfer, Bad Wildungen (FSch)
Heinz-Günther Schneider, Battenberg-Laisa (HGS)
Friedhelm Schnurbus, Medebach (FrS)
Jens Schreiner, Hatzfeld (JS)
Oliver Schreiner, Hatzfeld (OS)
Frank Seumer, Frankenberg (FS)
Maik Sommerhage, Bad Arolsen (MSo)
Karl Staiber, Bad Arolsen (KSt)
Holger Stiebel, Edertal-Buhlen (HSt)
Dr. Karl - Hermann Svoboda, Volkmarsen (KHS)
Bernd Turian, Rosenthal (BT)

Verwendete Abkürzungen

Ex.	= Exemplar(e)
m	= Männchen
w	= Weibchen
w-f	= weibchenfarben
BK	= Brutkleid
RK	= Ruhekleid
SK	= Schlichtkleid
ÜK	= Übergangskleid
Bp	= Brutpaar(e)
Bv	= Brutverdacht
ad.	= adultus (erwachsen)
juv.	= juvenilus (jung)
immat.	= immaturus (unausgefärbt)
diesj.	= diesjährig
n. diesj.	= nicht diesjährig (mindestens einjährig)
vorj.	= vorjährig
sing.	= singend
z	= ziehend
NSG	= Naturschutzgebiet
ND	= Naturdenkmal
MTB	= Meßtischblatt
WSG	= Waldschutzgebiet

Der Hinweis „Avifauna“ verweist jeweils auf:
ENDERLEIN, R., LÜBCKE, W. u. M. SCHÄFER (1993): Vogelwelt zwischen Eder und Diemel – Avifauna des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Korbach.

Systematik nach BARTHEL, P.H. (1993): Artenliste der Vögel Deutschlands. J. Orn. 134: 113 – 135.

Wetterverhältnisse

Die Klimadaten stellte uns der Deutsche Wetterdienst – Wetteramt Offenbach – zur Verfügung.

Monatliche Niederschlagshöhen und Lufttemperaturen
Klimastation Bad Wildungen

		Lufttemperaturen in °C Monatsmittel 1997/1998	Niederschlagshöhen in mm Monatssummen 1997/1998
August	1997	18,7	19,2
September	1997	12,0	18,5
Oktober	1997	6,1	52,8
November	1997	2,5	35,3
Dezember	1997	1,2	41,2
Januar	1998	1,2	54,8
Februar	1998	3,1	12,9
März	1998	4,0	37,1
April	1998	7,0	69,3
Mai	1998	11,8	60,7
Juni	1998	15,0	33,8
Juli	1998	15,5	54,7

Eine Niederschlagshöhe von 1 mm entspricht einem Regenwasservolumen von einem Liter pro Quadratmeter.

Wegen der hohen Variabilität des Wettergeschehens gelten alle Daten nur für den unmittelbaren Meßpunkt und können nicht auf andere – auch nahe gelegene – Orte übertragen werden. Der Deutsche Wetterdienst kann Aussagen über die Wetterverhältnisse an Orten, von denen keine Messungen vorliegen, nur im Rahmen eines Gutachtens abgeben.

Besondere Feststellungen

Weißstorch	Große Anzahl von Meldungen
Reiherente	Geringster Brutbestand seit 1988
Gänsesäger	Bruthinweis
Rebhuhn	Weiter starker Rückgang
Wachtelkönig	Bislang höchste Zahl rufender Männchen
Bläßhuhn	Bislang höchster Brutbestand
Kranich	Beim Wegzug zweithöchste Zahl seit 1994
Goldregenpfeifer	Starker Frühjahrszug
Mornellregenpfeifer	3. und 4. Nachweis
Temminckstrandläufer	3. und 4. Nachweis
Ziegenmelker	3 Nachweise
Eisvogel	Nur 1 Brutnachweis
Nachtigall	Höchstbestand seit 1975
Rohrschwirl	Erstnachweis
Tannenhäher	Hohe Anzahl von Nachweisen
Grauammer	Kein Nachweis

B. Spezieller Teil

Prachttaucher (Gavia arctica)

10. u. 11.01.98	1	Twistehauptstau	(MSo, KSt)

Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)

Bruten 1998 (bei unvollständiger Erfassung):

1 Bp	2–3 juv. (am 01.07. ca. 7 Tage alt); Teich, Gut Höhnscheid	(ERi)
1 Bp	Erstbrut: mind. 3 juv.; Zweitbrut?; ND Strother Moor	(REn)
1 Bp	3 juv. (am 05.08. ca 3 Wochen alt); Goldhäuser Teich	(REn)
1 Bp	ohne Erfolg (Nestbau: 17.05.); ND Alte Badeanstalt, Korbach	(REn)
2 Bp	2 u. 2 juv. (am 22.08.); NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(PhB, SFB, EH, WL, HN, AR, HSt)
2 Bp	mind. 1 juv.; Klärteich Wega	(FE, WL, FP)
2 Bp	mind. 1 erfolgreich (20.06.: 3 juv. u. 2 Eier); NSG Nemphetal	(WBe, GKa, ML, FN)
3 Bp	3, 7, 4 u. 1 juv.; NSG Merzhäuser Teiche	(ML)
13 Bp	Durchschnittlicher Brutbestand, bezogen auf die letzten 5 Jahre	

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Siehe Tabelle Seite 121

Haubentaucher (Podiceps cristatus)

Bruten 1998 (bei unvollständiger Erfassung):

1 Bp	erfolglos; Billinghäuser Teiche	(KSt)
1 Bp	3 erfolgreiche Jahresbruten mit je 3 juv.; Diemelsee, Giebringhäuser Bucht	(AG)
5 Bp	mind. 10 juv.; NSG Diemelsee	(AG, ERi)
3 Bp	erfolglos; NSG Twistevorstau	(REc, KSt)
mind. 15 Bp	duchschnittlich 2 juv.; NSG Ederseeufer bei Herzhausen	(PhB, SFB, REn, VL, ERi)
1 Bp	2 juv.; Freizeitgelände Teichmann, Herzhausen	(ERi)
1 Bp	2 juv.; Edersee, Nieder-Werbe Bucht	(AF, ERi, HSt)
mind. 1 Bp	3 juv.; Edersee, Bringhäuser Bucht	(AR)
2 Bp	erfolglos; NSG Krautwiese am Wesebach, Giflitz	(EH, WL)
1 Bp	erfolglos; Baggerteich am Kieswerk Mehlen	(EH, MJ, WL)
1 Bp	3 juv. (02.08.: 1 schlüpft); NSG Schwimmkaute bei Mehlen	
mind. 32 Bp		(EH, MJ, WL, HSt)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Siehe Tabelle Seite 121

Rothalstaucher (Podiceps grisegena)

29.04.98 5 Twistehauptstau (KSt)

Bislang größter festgestellter Trupp

Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis)

30.03.98 2 Edersee, Herzhausen (ERi)

Kormoran (Phalacrocorax carbo)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung 1997/98 von Edersee, NSG Stausee von Affoldern, Hochspeicherbecken bei Hemfurth und den Kiesbaggerteichen zwischen Mehlen und Giflitz: (REn, WL, HSt)

SEP	OKT	NOV	DEZ	JAN	FEB	MRZ	APR
63	124	26	152	232	139	59	35

Dem gegenübergestellt werden die Ergebnisse der Zählungen des Schlafplatzes im NSG Stausee von Affoldern (WL, HSt). Weitere besetzte Schlafplätze wurden im Winterhalbjahr 97/98 nicht bekannt.

SEP	OKT	NOV	DEZ	JAN	FEB	MRZ	APR
53	156	236	197	204	174	131	35

Erneute Zunahme der Zahlen gegenüber den Vorjahren.

Außerhalb der bei der Schwimmvogelzählung erfaßten Monate liegen folgende Dekadenmaxima vom Edersee und aus dem unteren Edertal vor. Wegen der großen Mobilität der Art wurde jeweils nur die Beobachtung mit der höchsten Indivduenzahl je Dekade berücksichtigt; eine Addition mehrere Nachweise aus einer Dekade dieses Ederabschnittes unterblieb, um Mehrfachzählungen zu vermeiden:

	August 1997			Mai 1998			Juni 1998		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Maximum	34	32	37	2	3	2	3	2	5

	Juli 1998		
Dekaden	1	2	3
Maximum	1	20	7

Auch das NSG Twistevorstau und der Twistehauptstau wurden vom Kormoran nahezu regelmäßig aufgesucht. Monatsmaxima:

Monate	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar
Nachw.	2	1	2	–	–	1
Maximum	1	1	9	–	–	3

Monate	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli
Nachw.	2	20	6	–	–	1
Maximum	2	45	4	–	–	1

Zugbeobachtungen und Beobachtungen außerhalb der oben erwähnten Bereiche:

05.10.97	2	Billinghäuser Teiche	(KSt)
12.10.97	25	Fuchskaule bei Immighausen; ziehend → SW	(REn)
19.10.97	1	ND Strother Moor	(REn, KG)
19.03.98	23	Thalitter; ziehend → NE	(ERi)
27.10.97	1	Eder bei Kirchlotheim	(KG)
29.10.97	2	Eder bei Viermünden	(KG)
30.10.97	mind. 26	Eder zw. Schmittlotheim u. Viermünden	(KG, GKa)
01.11.97	ca. 12	Eder bei Ederbringhausen	(WB, GKa)
20.11.97	20	Eder, Frankenberg	(GKa)
29.04.98	1 ad., 27 immat.	NSG Diemelsee	(ERi)
10.05.98	1	Billinghäuser Teiche	(KSt)
23.05.98	1	Billinghäuser Teiche	(KSt)
12.07.98	1	Diemelsee	(BECKER f. VL)
19.07.98	19	NSG Diemelsee	(AG)

Silberreiher (Egretta alba)

21.12.97	1	Edersee, Herzhausen; fängt u. frißt ca. 20 cm großen Hecht	(REn)
28.12.97	1	Edersee, Herz- bis Harbshausen	(REn)
06.04.98	1	NSG Twistevorstau	(KSt)

Graureiher (Ardea cinerea)

Bruten 1998:

2 Kolonien	mit 15 u. 11 Bp	in erster Kolonie mind. 45 juv. im Bereich der Eder	(PhB, SFB, REn, ERi)
1 Kolonie	mit > 4 Bp	zumindest teilweise erfolgreich im Bereich der Diemel	(VL)
1 Kolonie	mit 5 – 7 Bp	Bruterfolg unbekannt; im Bereich der Twiste	(REc, KAISER f. ERi, KSt)

Der niedrige Vorjahresbestand (34 – 35 Bp) hat sich trotz gezielter Aufmerksamkeit in etwa bestätigt. Erfreulich ist der gute Bruterfolg in einer der beiden Ederkolonien.

Bitte weiterhin gezielt auf den Umfang und den Bruterfolg der existierenden Kolonien achten! Ggf. Fehlanzeige erstatten.

Besondere Beobachtung:
Über einen Graureiher mit weniger als 15 m Fluchtdistanz berichten HN und HSt aus dem Kurpark Reinhardshausen.

Schwarzstorch (Ciconia nigra)

Für 1997 liegen 4 Brutnachweise mit 3, 3, 2 und 1 juv. vor. Neben diesen Brutnachweisen bestand in mindestens fünf weiteren Bereichen Brutverdacht. Damit ein zusätzlicher Brutverdacht gegenüber dem Vorjahr und bislang höchster Bestand.

Letztbeobachtung:	06.09.97	2	Herzhausen	(AF, KUBAT)
Erstbeobachtung:	03.04.98	1	bei Somplar	(NAUMANN f. GKa)

Weißstorch (Ciconia ciconia)

18.04.98	2	NSG Twistevorstau	(KSt)
23.04.98	2	zw. Korbach u. Lengefeld; ziehend → NE	(REn)
27.04.98	6	Dalwigksthal	(GKu)
28. u. 29.04.98	2	Ernsthausen, im Wetschafttal und auf Fabrikschornstein rastend	(BEIER f. GKa, WBe)
29.04.98	3	Basdorf, im Damtiergehege	(WERCHNER u. BEIER f. GKa)
29.04.98	6	Vöhl; rastend	(ZIECH f. ERi)
30.04.98	1	westlich Vöhl; rastend	(ERi)
01.05.98	1	nördlich Fürstenberg; rastend	(DEMME f. ERi)
02.05.98	1	Herzhausen; rastend	(LOHOF f. ERi)
10.05.98	1	östl. Frankenberg; rastend, unberingt	(FN,FS)
11.05.98	2	bei Twiste	(SCHÜNEMANN f. WL)
15.05.98	5	bei Mehlen u. in Giflitz; Nahrungssuche, Rast	(EH, MAI)
20.05.98	1	Frankenberg-Ost; überhinfliegend	(SEITZ f. FS)
	2	Rodenbachtal bei Rosenthal	(ML)
	35		

Höckerschwan (Cygnus olor)

Bruten 1998:

1 Bp	Bruterfolg?; Teich, Freizeitanlage Teichmann, Herzhausen	(ERi)
1 Bp	5 juv. (3 braun, 2 weiß); NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(EH,MJ, WL, HSt)
1 Bp	4 juv.; NSG Krautwiese am Wesebach, Giflitz	(EH, MJ, WL, HSt)
1 Bp	2 juv. (weiß); Baggerteich am Kieswerk Mehlen	(EH, WL, ERi, HSt)
1 Bp	3 juv.; Ederbrücke Mehlen	(EH, WL, HSt)
1 Bp	4 juv.; Schwanenteich Reinhardshausen	(BH, HN)
6 Bp		

Deutlich niedrigerer Brutbestand im Vergleich zum Vorjahr (11 Bp). Bei mindestens zwei der aufgeführten Bruten ist im übrigen ungewiß, ob die juv. flügge geworden sind.

Größere Ansammlungen (> 50):

29.10.97	68	Eder zw. Bergheim u. Mehlen einschl. Teiche	(HN)
16.11.97	68	Kiesbaggerteiche zw. Mehlen und Giflitz	(EH)
11.01.98	56	Eder zw. Affoldern u. Giflitz einschl. Teiche	(AR)
15.02.98	50	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(EH)
23.02.98	55	Kiesbaggerteiche zw. Mehlen und Giflitz	(HN)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Siehe Tabelle Seite 121

Singschwan (Cygnus cygnus)

In der Zeit vom 09.11.97 bis zum 02.03.98 hielten sich kontinuierlich Singschwäne im Bereich des unteren Edertales und des Edersees auf. Die größte Truppfeststellung betrifft 14 Alttiere und 6 Jungvögel (s. u.). Im unteren Edertal spielten Rapsäcker als Nahrungsflächen eine nicht unerhebliche Rolle. Insgesamt erneut erfreulich hoher Anteil an Jungvögeln.

Erstbeobachtung:

09.11.97	4 ad., 2 immat.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(WL)

Maximum:

18.01.98	14 ad., 6 immat.	Edersee, Harbshausen	(PhB, REn, KG)

Letztbeobachtung:

02.03.98	4 ad., 6 immat.	Edersee, Herzhausen	(ERi)

Schwarzschwan (Cygnus atratus)

Vom 20.09.97 bis 09.01.98 liegen 22 Nachweise jeweils eines Einzeltieres aus dem Bereich der Eder zwischen Mehlen und Anraff (einschl. Teiche) vor. (EH, MJ, WL, HN, FP, ERi, HSt)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung 1997/98 von Haubentaucher, Zwergtaucher, Höckerschwan, Stockente, Tafelente, Reiherente, Gänsesäger und Bläßhuhn

(Ergebnisse der übrigen Schwimmvögel sind jeweils bei der betreffenden Art in der tabellarischen Darstellung enthalten oder als Einzeldaten aufgeführt)

A:	Billinghäuser Teiche	(KSt)
B:	Diemelsee	(AG)
C:	Twistesee	(KSt)
D:	Edersee, NSG Stausee von Affoldern und Hochspeicherbecken bei Hemfurth	(REn, WL, HSt)
E:	Kiesbaggerteiche zw. Mehlen und Giflitz	(MJ)

Krickerpel (Foto: G. KALDEN)

Monat/ Gebiet		Hauben-taucher	Zwerg-taucher	Höcker-schwan	Stock-ente	Tafel-ente	Reiher-ente	Gänse-säger	Bläß-huhn
Sept. 97	A:	1	–	–	–	–	–	–	–
	B:	1	–	–	232	–	29	–	–
	C:	7	–	–	54	–	–	–	–
	D:	15	10	14	251	58	481	–	146
	E:	3	25	28	4	–	31	–	149
Okt. 97	A:	1	–	–	–	–	–	–	–
	B:	–	–	–	–	–	–	–	–
	C:	–	–	–	188	–	–	–	–
	D:	24	16	4	235	153	597	11	–
	E:	2	11	53	63	10	51	–	239
Nov. 97	A:	–	–	–	–	–	–	–	–
	B:	–	–	–	164	–	4	–	–
	C:	–	–	–	250	–	–	–	–
	D:	50	9	–	664	103	196	65	156
	E:	–	2	68	60	4	9	–	258
Dez. 97	A:	–	–	–	–	–	–	–	–
	B:	–	–	–	161	–	–	–	–
	C:	–	–	–	240	–	–	15	–
	D:	60	9	3	387	84	197	108	49
	E:	–	2	50	61	10	18	2	198
Jan. 98	A:	–	–	–	–	–	–	–	–
	B:	1	–	–	193	–	10	1	–
	C:	–	–	–	206	–	–	3	–
	D:	58	10	16	796	95	105	105	18
	E:	–	2	13	127	32	49	2	218
Feb. 98	A:	5	–	–	–	–	–	–	–
	B:	–	–	–	190	1	13	2	1
	C:	–	–	–	144	–	–	4	–
	D:	57	7	2	857	39	208	61	27
	E:	–	1	49	8	–	4	4	85
März 98	A:	5	–	–	14	–	3	1	1
	B:	14	–	–	74	–	30	2	1
	C:	–	–	–	50	–	–	2	–
	D:	29	5	4	69	4	162	44	29
	E:	2	1	44	60	21	109	–	143
Apr. 98	A:	9	–	–	–	–	12	–	–
	B:	11	–	–	59	–	52	–	11
	C:	–	–	–	35	–	–	–	–
	D:	2	–	1	14	–	100	–	–
	E:	1	2	14	12	1	113	–	53

Graugans x Höckergans x Schwanengans (Anser anser x Cygnopsis cygnopsis)

An den Kiesbaggerteichen zwischen Mehlen und Giflitz fand in 1998 ein erfolgloser Brutversuch dieser Hybridgänse statt. Während des Berichtszeitraumes waren bis zu 7 Tiere anwesend. (EH, MJ, WL, HN, AR)

Graugans (Anser anser)

12.09.97	6	NSG Diemelsee, Itter aufwärts ziehend	(AG)
23.03.98	2	NSG Twistevorstau	(KSt)
30.03.98	1	NSG Twistevorstau	(KSt)

Graue Gänse (Anser spec.)

28.09.97	20	Rosenthal; ziehend	(ML)
12.10.97	6	Fuchskaule bei Immighausen; umherstreichend	(REn)
30.12.97	50	Asel-Süd; ziehend → W	(SOBIREY f. ERi)

Kanadagans (Branta canadensis)

Im Bereich der Kiesbaggerteiche zw. Mehlen und Giflitz hielt sich nahezu während des gesamten Berichtszeitraumes eine Kanadagans auf. Vom 23.03. bis 22.06.98 gesellte sich eine zweite hinzu. Beide Tiere hielten regelmäßig engen Kontakt zu den Hybridgänsen (s. o.). (PhB, EH, MJ, WL, AR)

Rostgans (Tadorna ferruginea)

29.03.98	1 w	Eder bei Viermünden	(PhB, REn)
Ende März 98	1	Frankenau, nach Süden ziehend	(HR)

Brandgans (Tadorna tadorna)

12. bis 19.07.98	1 ad.	NSG Krautwiese am Wesebach, Giflitz	(EH, WL)

Nilgans (Alopochen aegyptiacus)

04.05.98	1	östl. Buhlen; fliegt niedrig → N	(HSt)
22.05.98	1 ad.	NSG Krautwiese am Wesebach, Giflitz	(WL)
30.05.98	2 ad.	NSG Krautwiese am Wesebach, Giflitz	(WL)

Mandarinente (Aix galericulata)

31.03.98	1 w	Edersee, Asel-Süd	(ERi)
03.04.98	1 m	Eder bei Frankenberg, Nemphemündung	(GKa)
27.04.98	1 w	Schwanenteich Reinhardshausen	(GKa)

Pfeifente (Anas penelope)

Es liegen 22 Nachweise (unter Berücksichtigung der Dekadenmaxima je Beobachtungsgebiet) mit 112 Exemplaren vor.

	September			Oktober			November		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	–	–	1	1	2	1	3	3	2
Exemplare	–	–	1	9	6	2	8	31	11
Maxima	–	–	1	9	5	2	5	18	8

	Dezember			Januar			Februar		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	2	1	2	1	–	–	2	1	–
Exemplare	16	10	5	4	–	–	7	2	–
Maxima	12	10	3	4	–	–	4	2	–

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):
Kiesbaggerteiche zw. Mehlen u. Giflitz (11), Eder bei Bergheim (2), NSG Stausee von Affoldern (2), Edersee, Bringhäuser Bucht (2), NSG Merzhäuser Teiche, Rosenthal (2), Klärteich Wega (1), Twistehauptstau (1), ND Strother Moor (1).

Schnatterente (Anas strepera)

Es liegen 21 Nachweise (unter Berücksichtigung der Dekadenmaxima je Beobachtungsgebiet) mit 78 Exemplaren vor.

	Oktober			November			Dezember		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	–	1	1	1	1	2	1	1	1
Exemplare	–	3	13	2	2	5	2	5	4
Maxima	–	3	13	2	2	3	2	5	4

	Januar			Februar			März		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	1	1	–	1	1	2	1	1	1
Exemplare	2	6	–	2	2	4	2	2	4
Maxima	2	6	–	2	2	2	2	2	4

	April			Mai		
Dekaden	1	2	3	1	2	3
Nachweise	1	–	1	1	–	–
Exemplare	4	–	2	12	–	–
Maxima	4	–	2	12	–	–

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):
Kiesbaggerteiche zw. Mehlen u. Giflitz (16), Twistehauptstau (1), Edersee, Bringhäuser Bucht (1), NSG Ederseeufer bei Herzhausen (1), Billinghäuser Teiche (1), NSG Stausee von Affoldern (1).

Krickente (Anas crecca)

Ein Bruthinweis liegt aus dem NSG Twistevorstau vor, wo am 23.06.1998 ein Weibchen beobachtet wurde, das vier flügge Jungvögel führte. (KSt)

Insgesamt liegen 80 Nachweise (unter Berücksichtigung der Dekadenmaxima je Beobachtungsgebiet) mit 924 Exemplaren vor.

	August			September			Oktober		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	3	–	1	2	2	3	4	9	–
Exemplare	10	–	22	33	31	18	41	63	–
Maxima	6	–	22	25	27	15	18	16	–

	November			Dezember			Januar		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	2	6	3	2	5	6	3	5	4
Exemplare	65	139	26	41	77	56	52	66	35
Maxima	45	67	20	40	38	20	30	30	20

	Februar			März			April		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	3	5	2	2	1	6	4	2	1
Exemplare	59	47	23	47	2	26	38	25	12
Maxima	25	20	20	26	2	15	30	21	12

	Mai			Juni			Juli		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	1	–	1	–	–	1	1	–	3
Exemplare	1	–	1	–	–	2	5	–	7
Maxima	1	–	1	–	–	2	5	–	4

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):

NSG Twistevorstau (28), Kiesbaggerteiche zw. Mehlen u. Giflitz (14), Edersee, Bringhäuser Bucht (6), Eder bei Hemfurth (5), NSG Merzhäuser Teiche, Rosenthal (5), Edersee, Herzhausen – Asel-Süd (4), NSG Stausee von Affoldern (4), Klärteich Wega

(3), Eder bei Bergheim (3), Hochspeicherbecken Ermerod bei Hemfurth (1), Hochspeicherbecken Peterskopf (1), Freizeitanlage Teichmann, Herzhausen (1), Ederaue Rennertehausen (1), Bömighäuser Teich (1), Polizeiteich Wega (1), Goldhäuser Teich (1), Jungferhügel zw. Schreufa u. Viermünden (1).

Stockente (Anas platyrhynchos)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Siehe Tabelle Seite 121

Spießente (Anas acuta)

Insgesamt liegen 9 Nachweise (unter Berücksichtigung der Dekadenmaxima je Beobachtungsgebiet) mit 23 Exemplaren vor.)

	März			April		
Dekaden	1	2	3	1	2	3
Nachweise	1	1	2	2	3	–
Exemplare	8	2	6	3	4	–
Maxima	8	2	2	2	2	–

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):
Kiesbaggerteiche zw. Mehlen u. Giflitz (3), Edersee, Herzhausen (2), NSG Twistevorstau (2), Kläranlage Frankenberg (1), NSG Tiergarten bei Frankenberg (1).

Knäkente (Anas querquedula)

12.08.97	1 w-f	Klärteich Wega	(WL)
20.03.98	2 m	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(WL)
27.03.98	1 m	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(WL)
28.03.98	3 m, 2 w	NSG Merzhäuser Teiche, Rosenthal	(ML)
04.04.98	2 m	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(HSt)
10.04.98	1 m	Teich an der Nemphe südl. Frankenberg	(ERi)
12. bis 21.04.98	1 m, 1 w	NSG Merzhäuser Teiche, Rosenthal	(ML,BT)
13.05.98	1 m	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(WL)
17.05.98	2 m	Klärteich Wega	(FE)
	1 m	neuer Teich bei Mehlen	(EH)
18.05.98	1 m	NSG Twistevorstau	(KSt)

Löffelente (Anas clypeata)

Es liegen 12 Nachweise (unter Berücksichtigung der Dekadenmaxima je Beobachtungsgebiet) mit 54 Exemplaren vor.

	August			Oktober			Februar		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	1	–	–	–	1	1	–	1	–
Exemplare	5	–	–	–	2	2	–	2	–
Maxima	5	–	–	–	2	2	–	2	–

	März			April		
Dekaden	1	2	3	1	2	3
Nachweise	–	1	2	2	2	1
Exemplare	–	2	4	16	13	8
Maxima	–	2	2	12	11	8

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):
Edersee, Herzhausen (5), Kiesbaggerteiche zw. Mehlen u. Giflitz (4), NSG Twistevorstau (1), Edersee, Dorfstelle Berich (1), Kläranlage Giebringhausen (1).

Kolbenente (Netta rufina)

Es liegen 11 Nachweise (unter Berücksichtigung der Dekadenmaxima je Beobachtungsgebiet) mit 15 Exemplaren vor.

	Oktober			November			Dezember		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	1	1	1	–	–	1	1	–	–
Exemplare	1	1	1	–	–	5	2	–	–
Maxima	1	1	1	–	–	5	2	–	–

	März			April			Mai		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	–	–	1	1	1	1	1	–	–
Exemplare	–	–	1	1	1	1	1	–	–
Maxima	–	–	1	1	1	1	1	–	–

	Juni		
Dekaden	1	2	3
Nachweise	1	–	–
Exemplare	2	–	–
Maxima	2	–	–

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):
Kiesbaggerteiche zw. Mehlen u. Giflitz (10), Billinghäuser Teiche (1).

Tafelente (Aythya ferina)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Siehe Tabelle Seite 121

Darüber hinaus liegen folgende Beobachtungen außerhalb der bei der Schwimmvogelzählung erfaßten Monate vor:

(Mai – August)

12.08.97	4 m	NSG Stausee von Affoldern	(WL)
21.08.97	1 m	NSG Krautwiese am Wesebach, Giflitz	(WL)
01. bis			
18.05.98	1 m	Neuer Teich bei Mehlen	(PhB, SFB, EH, WL, ERi, HSt)
03.05.98	4 m, 1 w	NSG Krautwiese am Wesebach, Giflitz	(EH)
10.05.98	2 m	NSG Ederseeufer bei Herzhausen	(ERi)
18.05.98	1 m	NSG Ederseeufer bei Herzhausen	(ERi)
08.06.98	6	Billinghäuser Teiche	(KSt)
15.06.98	2 m, 1 w	Billinghäuser Teiche	(ERi)
18.06.98	2	Billinghäuser Teich	(KSt)
	2 m	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(WL)
20.06.98	1	Billinghäuser Teiche	(KSt)
04. u.			
07.07.98	1 m	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(WL)
09. u.			
13.07.98	1 m	NSG Krautwiese am Wesebach, Giflitz	(WL, HSt)
18.07.98	3 m, 1 w	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(WL)
23.07.98	1 m	Edersee, Herzhausen	(PhB, SFB)
24.07.98	1 m (ÜK)	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(WL)
	1 m (ÜK)	NSG Stausee von Affoldern	(WL)

Reiherente (Aythya fuligula)

Nachtrag (Bruten 1997):
1 weiteres Bp (7 kleine juv. am 17.08.97) im NSG Schwimmkaute bei Mehlen (WL)

Bruten 1998 (bei unvollständiger Erfassung):

1 Bp	12. juv.; Billinghäuser Teiche	(KSt)
1 Bp	2 juv.; Kläranlage Giebringhausen, mittl. Teich	(AG)
4 Bp	12, 8, 6 u. 3 juv.; NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(EH, WL, HSt)
8 Bp	10, 5, 4, 4, 3, 2, 2, u. 1 juv.; Klärteich Wega	(WL)
1 Bp	6 juv.; Polizeiteich Wega	(HSt)
15 Bp	Geringster Brutbestand seit 1988!	

Hinweis:
Aus ggb. Anlaß wird nochmals darauf hingewiesen, daß aus der bloßen Anwesenheit von Altvögeln im Juni bzw. sogar während der gesamten Brutperiode nicht automatisch auf Bruten geschlossen werden kann. Bitte unbedingt auf Nestbau, Nisttätigkeit oder Bruterfolg achten.

Schellente (Bucephala clangula)

Es liegen 28 Nachweise (unter Berücksichtigung der Dekadenmaxima je Beobachtungsgebiet) mit 332 Exemplaren vor.

	Oktober			November			Dezember		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	–	1	–	1	2	3	1	2	2
Exemplare	–	5	–	21	28	12	10	27	40
Maxima	–	5	–	21	24	6	10	26	36

	Januar			Februar			März		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	–	1	2	2	1	2	1	2	4
Exemplare	–	22	19	26	33	14	32	28	14
Maxima	–	22	15	22	33	12	32	26	5

	Juli		
Dekaden	1	2	3
Nachweise	–	–	1
Exemplare	–	–	1
Maxima	–	–	1

Erstbeobachtung:
11.10.97 1 m, 2 w NSG Stausee von Affoldern (ERi)
Letztbeobachtung:
30.03.98 1 m NSG Ederseeufer bei Herzhausen (ERi)
Sommerbeobachtung:
24.07.98 1 w-f NSG Stausee von Affoldern (WL)

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):
NSG Stausee von Affoldern (16), Eder bei Hemfurth (7), Edersee, Herzhausen (2), NSG Twistevorstau (1), NSG Schwimmkaute bei Mehlen (1), Eder zw. Mehlen u. Affoldern (1).

Maximum:
27.12.97 18 m, 18 w NSG Stausee von Affoldern (WL)

Weißstorch (Farbfotos: G: KALDEN)

Schwarzstorch

Sperber

Mäusebussard



Dompfaff

Rotkehlchen

Kleiber

Blaumeise

Zwergsäger (Mergus albellus)

17.11.97	1 w	NSG Krautwiese am Wesebach, Giflitz	(ERi)
13. u. 14.12.97	1 w	NSG Krautwiese am Wesebach, Giflitz	(WL, HSt)
31.12.97	1 m	NSG Stausee von Affoldern	(FSch)
14.01.98	1 w	NSG Krautwiese am Wesebach, Giflitz	(HSt)
24. u. 25.01.98	max. 3 w	NSG Krautwiese am Wesebach, Giflitz und Eder bei Bergheim	(PhB, EH, WL, ERi, HSt)
21.02. bis 07.03.98	max. 3 w	NSG Krautwiese am Wesebach, Giflitz, und NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(PhB, WL, ERi, HSt)
14. bis 22.03.98	max. 2 w	NSG Krautwiese am Wesebach, Giflitz, und NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(EH, MJ, WL, HN, HSt)
23.03.98	1 m, 3 w	NSG Krautwiese am Wesebach, Giflitz	(HN)

Erneut verhältnismäßig viele Beobachtungen. Bislang längste Verweildauer in einem Gebiet (mind. 15 Tage).

Gänsesäger (Mergus merganser)

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung: Siehe Tabelle Seite 121

Aus dem NSG „Stausee von Affoldern" liegt erneut ein Hinweis auf eine mögliche Brut in 1998 mit 5 juv. vor. WL und H. DIETZ beobachteten am 24.07.98 bei einer Bootsfahrt 6 weibchenfarbene Tiere, die eng zusammenhielten. Die nachfolgenden Beobachtungen belegen im übrigen, daß aus der gesamten Brutperiode zahlreiche Nachweise aus dem dortigen Bereich vorliegen (s. auch Beitrag von LÜBCKE, S. 17).

Beobachtungen außerhalb der bei der Schwimmvogelzählung erfaßten Monate:

(Mai – August):

01.05.98	1 m, 1 w	Eder, Brücke Affoldern	(ERi)
	1 m	Giflitz; fliegt ederabwärts	(ERi)
03. u. 06.05.98	1 m, 1 w	Eder zw. Mehlen u. Giflitz	(EH, WL, HN)
13.05.98	1 w	Edersee, Niederwerbe	(ERi)
19.05.98	2 w	NSG Stausee von Affoldern	(HSt)
21.05.98	2 m, 2 w	NSG Stausee von Affoldern	(HSt)
22.05.98	1 m, 1 w	Eder bei Hemfurth	(HSt)
28.05.98	1 m, 1 w	Eder bei Hemfurth	(HSt)
14.07.98	3 w	NSG Stausee von Affoldern	(HSt)

Insgesamt erfolgte auch im Winter 1997/98 (wie im Vorjahr) nur ein geringer Einflug.

Größter Trupp:

11.01.98	mind. 90	Hochspeicherbecken Ermerod bei Hemfurth	(KG)

Wespenbussard (Pernis apivorus)

Bruten 1998:

1 Bp (erfolglos)	Untersuchungsfläche Diemelsee (70 km²)	(AG)
1 Bp (Brutverdacht)	bei Buhlen	(HSt)

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

07.05.98	2	Reddighausen, Tongrube	(HGS)
23.05.98	1	Balzflug; Braunauer Berg	(FE)
31.05.98	1	Stadtwald Volkmarsen, Ehringen	(KHS)

Zugbeobachtungen:

03.08.97	1	Altwildungen, Roter Berg	(FE)
10.08.97	1	Sudeck, Feld – Ittler	(AG)
15.08.97	1	Buchenberg	(ERi)
31.08.97	1	Hemfurth	(WL)
	1	Fuchskaule bei Immighausen	(KG,REn)
01.05.98	1	Anraff	(PhB, REn, ERi)
02.05.98	1	Altwildungen, Roter Berg	(FE)
28.05.98	1	Rosenthal, ziehend	(ML)

Schwarzmilan (Milvus migrans)

Bruthinweise 1998:

1 Bp	(Brutverdacht), Twistesee	(KSt)
1 Bp,	(Brutverdacht), Edersee bei Herzhausen	(SFB, REn, KG,)
1 Bp	(Brutverdacht), Edersee bei Scheid/Rehbach	(ERi, HSt)
1 Bp	(Brutverdacht), Edersee bei Asel-Süd/Hünselburg	(ERi, HSt)
1 Bp	(Brutverdacht), unteres Edertal bei Anraff	(WL, ERi)
1 Bp	(Brutverdacht), unteres Edertal bei Affoldern/Buhlen/Mehlen	(EH, HSt)
1 Bp	Altwildungen, Schartenberg	(FE, FScH)

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

06.04.98	Somplar	(GKa)
17.04.98	Berghofen	(HGS)
26.04.98	Schreufa, Jungferhügel	(REn, KG)
30.04.98	Laisa	(GKa, HGS)
02.05.98	Korbach, Marbecktal	(PhB)
08.05.98	Twistesee, Wetterburg	(AK)
10.05.98	Ederaue bei Rennertehausen	(HGS)
15.05.98	Frankenberg, Kaltes Wasser	(FS)
16.05.98	Hatzfeld	(JS, OS)
21.u.26.05.98	Flechtdorf, Mülldeponie	(ERi)
11.06.98	Ederbringhausen	(REc)
11.u.14.06.98	Aartal	(PhB, REn, ERi)

Erstbeobachtung:

31.03.98	1	Asel-Süd	(ERi)

Rotmilan (Milvus milvus)

Brutergebnis 1998:
Untersuchungsfläche Laisa (68 km²):
2 Bp, beide erfolgreich (2 + 1 juv.); niedrigster Bestand seit 20 Jahren! (HGS)

Untersuchungsfläche Diemelsee (70 km²):
2 Bp, beide erfolgreich (2 + 1 juv.) (AG)

Winterbeobachtungen (Dezember und Januar):

17.12.97	1	Korbach	(SFB)
04.01.98	1	am Horst(!); Landau	(REc)

Letztbeobachtung:

29.10.97	1	ziehend; Frankenberg	(KG)

Erstbeobachtung:

11.02.98	1	Frankenberg	(FN)

Größere Trupps: (ab 15)

29.08.97	15	Korbach, Marbecktal	(KG)
12.10.97	16	Dainrode, Altes Feld	(HN)
20.10.97	26	Bad Arolsen, Luisenthal	(MSo)
14.05.98	20 – 25	Geismar, Kompostierungsanlage	(FE)
26.05.98	20	Flechtdorf, Mülldeponie	(ERi)

Rohrweihe (Circus aeruginosus)

Es liegen 20 Zugnachweise mit je 21 Ex. vor:

	August			September			Oktober		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	–	–	5	1	1	2	1	–	–
Exemplare	–	–	5	1	1	2	1	–	–

	April			Mai		
Dekaden	1	2	3	1	2	3
Nachweise	–	–	2	2	1	1
Exemplare	–	–	2	2	1	1

Wegzug:
17.08. – 09.10.97
Heimzug:
15.04. – 13.05.98

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):
Fuchskaule bei Immighausen (4), Goddelsheim (3), Korbach (2), Vöhl (2), NSG Schwimmkaute bei Mehlen (2), Schreufa (2), Waldeck (1), Nordenbeck (1), Buhlen (1), Twiste (1), Altwildungen (1).

Kornweihe (Circus cyaneus)

Es liegen 32 Nachweise mit 40 Exemplaren vor.

	Oktober			November			Dezember		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	–	–	2	1	4	1	1	–	–
Exemplare	–	–	2	1	5	2	1	–	–

	Januar			Februar			März		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	2	2	1	1	2	2	3	7	1
Exemplare	2	2	1	1	3	4	4	8	1

	April		
Dekaden	1	2	3
Nachweise	–	1	1
Exemplare	–	2	1

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):
Rosenthal (10), Korbach (7), Immighausen (4), Böhne (3), Buhlen (2), Schreufa (2), Basdorf (1), Ober-Waroldern (1), Höringhausen (1), Frankenberg (1).

Aus der Feldgemarkung südlich von Rosenthal liegen Nachweise von 1 bis 3 überwinternden Vögeln vor. (ML)

Wiesenweihe (Circus pygargus)

17.08.97	1 w	Fuchskaule bei Immighausen	(REn)
11.05.98	1 m	Waldeck, Bahnhof	(HSt)
13.05.98	1 w	zw. Korbach u. Lengefeld	(REn)
21.07.98	1 m	Vasbecker Hochfläche	(REn)

Habicht (Accipiter gentilis)

Brutergebnis 1998:
Untersuchungsfläche Laisa (68 km²):
3 Bp, davon 2 Bp erfolgreich mit je mind. 2 juv. (HGS)

Untersuchungsfläche Diemelsee (70 km²):
2 Bp, beide erfolgreich und 1 Brutverdacht (AG)

Sperber (Accipiter nisus)

Pflegefall:
22.02.98 1 w Ernsthausen; beim Jagen gegen Hochspannung geprallt, anschl. in Pflegestation Rade verendet. (WBe)

Mäusebussard (Buteo buteo)

Brutergebnis 1998:
Untersuchungsfläche Laisa (68 km²):
23 Bp, nur 14 erfolgreich (3 x 2 juv., 11x1 juv.); erneut geringer Mäusebestand im Frühjahr und Frühsommer. (HGS)

Untersuchungsfläche Diemelsee (70 km²):
17 Bp, davon 14 erfolgreich (AG)

Rauhfußbussard (Buteo lagopus)

31.10.97 1 bei Geismar (KG)

Fischadler (Pandion haliaetus)

	August			September			Oktober		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Exemplare	–	2	2	4	4	1	–	1	–

	März			April			Mai		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Exemplare	–	–	2	3	3	2	2	1	–

Wegzug: 18.08. – 12.10.97 Heimzug: 28.03. – 12.05.98

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):
Edersee (9), unteres Edertal (4), Ederbringhausen (3), NSG Twistevorstau (3), Burgwald (2), Diemelsee (1), Korbach (1), Schmittlotheim (1), NSG Stausee von Affoldern (1), oberes Edertal (1).

Sommerdatum:
30.07.98 1 NSG Ederseeufer bei Herzhausen (ERi)

Turmfalke (Falco tinnunculus)

Winterreviere:
Insgesamt wurden aus dem Kreisgebiet 33 Winterreviere gemeldet. Wie in den Vorjahren wurden die meisten Reviere (14) im Edertal festgestellt. Auch aus dem Upland und von der Korbacher Hochfläche liegen Daten vor.

Es sollte verstärkt darauf geachtet werden, wo Winterreviere bestehen.

Merlin (Falco columbarius)

17.04.98	1 m	jagend; stößt vergeblich nach Flußregenpfeifer; Mehlen, neuer Teich	(WL)

Baumfalke (Falco subbuteo)

Bruten 1998:

1 Bp	(erfolgreich),	Volkmarsen, Iberg	(KHS)
1 Bp	(Brutverdacht)	Buchenberg	(GKa)
1 Bp	(Brutverdacht)	Aartal nördl. Münden	(KÖNIG, FrS)
1 Bp	(mind. 1 juv.)	westl. Neukirchen	(ERi)
1 Bp	(Brutverdacht)	Eschgraben bei Mehlen	(BH, EH, WL, HSt)
1 Bp	(Brutverdacht)	Stadtwald Rosenthal	(ML)
1 Bp	(Brutverdacht)	bei Ernsthausen	(WBe)
7 Bp			

Weiterhin geringe Zahl von Bruthinweisen (1995: 12; 1996: 12, 1997: 7).

Weitere Brutzeitbeobachtungen:

11.06.98	1	Schwalbenjagd, Immighausen	(ERi)
22.06.98	1	Schwalbenjagd, Benkhausen	(AG)
25.06.98	1	Herzhausen	(ERi)
01.07.98	1	jagend; bei Geismar	(KAISER f. AF)

Letztbeobachtung:

02.10.97	1	Burgwald, Rabenboden	(FN)

Erstbeobachtung:

20.04.98	1	Herzhausen, Friedhof	(AF))

Wanderfalke (Falco peregrinus)

31.08.97	1	jagend, Ascheid bei Schweinsbühl	(AG)
06.09.97	1 diesj.	Buchenbusch zw. Basdorf u. Vöhl	(WL, ERi)
11.09.97	1 diesj.	jagend; Fuchskaule bei Immighausen	(REn, KG)
11.10.97	1 immat.	jagend, Hemfurth	(HSt)
21.02.98	1	ziehend, bei Odershausen	(FE)
31.03.98	1 ad.	Asel-Süd	(ERi)
14.05.98	1	Birkenbringhausen, Klingelstede	(AF, ERi)
27.06.98	1	Reinhardshausen	(HN)
16.08.98	1	Eifa	(AF, KAISER)

Haselhuhn (Bonasa bonasia)

Jan. 98	1	Frankenau, Kläranlage	(HR)
19.04.98	2	bei Hüttenrode (Bereits frühere Hinweise, s. Beitrag von LÜBCKE, S. 17)	(WITTERN f.AF)

Rebhuhn (Perdix perdix)

Vom Herbst/Winter 97/98 wurden lediglich noch 8 Ketten gemeldet. Dies bedeutet einen erneuten dramatischen Rückgang gegenüber den Vorjahren (94/95: 18, 95/96: 36, 96/97: 18).

Kettenstärken:

Aug.97	7 – 8	bei Wellen	(MÜLLER f.WL)
14.09.97	16	Rattenberg b. Schweinsbühl	(AG)
10.10. u.13.10.97	2 + 3	östl. Buhlen	(HSt)
23.10.97	11	Sengelsberg bei Böhne	(HSt)
10.12.97	11	Holzhausen, Horst	(HGS)
21.12.97	11	Jungferhügel zw. Viermünden u. Schreufa (am 04.01.98 nur noch 7 Ex.; KG)	(REn)
Jan.98	?	Waldeck, Golfplatz	(LEICHT f. ERi)
Jan.98	4	Altenlotheim	(ERi)

Für 1998 wurden insgesamt nur 15 Bruthinweise bzw. Reviere gemeldet!
Auf das Rebhuhn sollte verstärkt geachtet werden. (WL, HGS)

Wachtel (Coturnix coturnix)

Rufaktivität: 30.04. – 26.07.1998 (Bisher frühester Rufnachweis!) (ERi)

	April		
Dekaden	1	2	3
Nachweise	–	–	1

	Mai			Juni			Juli		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Exemplare	6	5	8	3	12	8	2	2	2

Habitate (soweit angegeben): Gerste (5), Weizen (4), Wiese (2), Roggen (1), Mais (1)

Beobachtungsorte:
Vöhl (7), Korbach (7), Frankenberg (7), Diemelsee (3), Lichtenfels (3), oberes Edertal (3), Bad Arolsen (2), Rosenthal (2), Waldeck (1), Frankenau (2).

Untersuchungsflächen 1998:

Feldgemarkung Rosenthal (ca. 6 km²)	2 Reviere	(ML)
Feldgemarkung Laisa (ca. 8 km)	3 Reviere	(HGS)

Wasserralle (Rallus aquaticus)

12.07.98	1 ad	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(WL)

Wachtelkönig (Crex crex)

13.05.98	1	Marbeckwiesen bei Lengefeld (22.30 h)	(REn)
01.–17.06.98	1 – 2	Vöhl; von 23.00-04.00h durchgehend aus Wiese rufend; nach Abmähen der Wiese verschwunden)	(FE, AF, ERi)
08.06.98	1	südwestl. Geismar (Nachkontrolle durch FS am 09.06.98 erfolglos)	(ERi)
13.06.98	1	rechtes Ederufer bei Anraff	(FE)
15.06.98	1	Herbsen (Gerstenfeld)	(ERi)
08.–23.06.98	1	zw. Lengefeld u. Nordenbeck; regelmäßig ab 22.30 h aus Wintergerstefeld rufend	(REn)
20.06.98	1	Rhoden Georgenhof	(FE)
Juni 98	1	Frankenau	(HR)
Juni 98	1	Obernburg; 1 Woche singend	(VEIT f.ERi)
	8 – 9 Rufer		

Bisher höchste Zahl rufender Männchen !

Teichhuhn (Gallinula chloropus)

Bruten 1998 (bei unvollständiger Erfassung):

1 Bp	erfolgreich, Billinghäuser Teiche	(KSt)
1 Bp	5 + 3 juv.; Bad Arolsen, Schloßteich	(AK, ERi)
1 Bp	Teich bei Gut Cappel	(MSo)
2 Bp	NSG Twisteseevorstau	(MSo)
1 Bp	mind. 1 juv.; Kläranlage Korbach	(PhB)
1 Bp	ND Strother Moor, Korbach	(REn)
1 Bp	mind. 1 juv.; ND Alte Badeanstalt, Korbach	(REn)
1 Bp	Brutverdacht; Goldhäuser Teich, Korbach	(REn)
1 Bp	2 juv.; Teich bei Gut Schaaken	(ERi)
1 Bp	4 u. 2 juv.; Schwanenteich Reinhardshausen	(BH, HN)
1 Bp	mind. 1 juv.; Flamingoteich Reinhardshausen	(HN)
1 Bp	Brutverdacht; westl. Ederbrücke Anraff	(WL, ERi)
1 Bp	mind. 1 juv.; NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(WL)
1 Bp	Brutverdacht; Wellener Teiche	(WL)
1 Bp	mind. 1 juv.; Klärteich Wega	(WL)
2 Bp	je 3 juv.; NSG Merzhäuser Teiche	(ML)
1 Bp	5 juv.; Altenlotheim, Teich östl. Burg Hessenstein	(ERi)
1 Bp	Frankenberg, Feuchtbiotop	(FN)
19 Bp		

Bestandserholung gegenüber dem Vorjahr (11 Bp)!

Winterbeobachtungen (Dez. u. Jan.):

Dez. 97	1 ad., 1 – 3 immat.	Schwanenteich Reinhardshausen	(HN)
11.01.97	1 ad., 1 immat.	Kläranlage Korbach	(PhB)
25.–27.01.98	3 ad.	Kläranlage Korbach	(PhB, SFB, REn)

Bläßhuhn (Fulica atra)

Bruten 1998 (bei unvollständiger Erfassung):

1 Bp	4 – 5 juv.; Billinghäuser Teiche	(ERi, KSt)
2 Bp	3 + 2 juv.; Diemelsee, Giebringhäuser Bucht	(AG)
2 Bp	je 2 juv.; NSG Diemelsee	(AG, ERi)
mind. 3 Bp	NSG Twisteseevorstau(MSo)	
mind. 2 Bp	Schloßteich Bad Arolsen	(MSo)
3 Bp	2 – 3 juv.;Teich, Gut Höhnscheid	(ERi)
1 Bp	4 juv.; Goldhäuser Teich, Korbach	(REn)
1 Bp	mind. 3 juv.; ND Strother Moor, Korbach	(REn)
2 Bp	3 juv.; Teich Gut Schaaken	(ERi)

2 – 3 Bp	mind. 7 juv.; Niederwerbe, oberes Vorbecken	(PhB, ERi)
mind. 10 Bp	NSG Ederseeufer bei Herzhausen	(PhB, REn, VL)
mind. 7 Bp	3 mit 4, 3 u. 3 juv.; NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(EH, WL, MJ, HSt)
1 Bp	6 juv.; Mehlen, Schlemmteich	(EH, HSt)
1 Bp	Mehlen, neuer Teich	(HSt)
mind. 3 Bp	9, 5 u. 2 juv.; Mehlen, Baggerteich am Kieswerk	(EH, WL, HSt)
4 Bp	5, 3 u. 2 x 2 juv.; NSG Krautwiese am Wesebach, Giflitz	(EH, WL, HSt)
1 Bp	7 juv.; Teich bei Anraff	(WL,FP)
2 Bp	3 + 1 juv.; Kiesbaggerteich bei Wellen	(WL)
3 Bp	8 + 4 juv.; Klärteich Wega	(WL, FP, ERi)
1 Bp	NSG Haardt, Mandern	(WL)
4 Bp	21 juv.; NSG Merzhäuser Teiche, Rosenthal	(ML)
2 Bp	NSG Nempheteiche, Burgwald	(ML, ERi)
mind. 59 Bp		

Höchster bisher ermittelter Brutbestand!

Ergebnisse der Schwimmvogelzählung : Siehe Tabelle Seite 121

Kranich (Grus grus)

Insgesamt wurden 299 Einzelnachweise (davon 61 Nachtzugnachweise) ausgewertet.

Zugablauf (N = Nachtzugnachweise):

	Oktober			November			Dezember		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	1N	40+15N	62+8N	4+13N	6+3N	2	1	–	2
Exemplare	?	>8615	>10335	>2480	>830	280	40	–	76
Maxima	?	1000	1000	80	300	200	40	–	65

	Februar			März		
Dekaden	1	2	3	1	2	3
Nachweise	–	15+4N	22+6N	109+11N	2	2
Exemplare	–	>833	>10334	>12894	114	13
Maxima	–	120	3500	1000	100	10

Wegzug:
07.10. - 27.12.97

Heimzug:
11.02. - 31.03.98

Hauptdurchzugstage:

20.10.97	> 5155	21.02.98	> 9854
21.10.97	> 3935	01.03.98	> 11000
27.10.97	> 6400	02.03.98	> 3457

Anmerkung zum Zugablauf:
In der Wegzugperiode 1997 wurde mit mehr als 22656 Kranichen (ohne die 40 Nachtzugnachweise) die zweithöchste Zahl nach 1994 (>31600) seit Beginn der Aufzeichnungen 1973 ermittelt.

Rastbeobachtungen:

27.10.97	80	17.05 Uhr, bei Asel	(ERi)
03.11.97	ca. 350	16.00 Uhr, Waldhang bei Bringhausen	(AF)
02.03.98	ca. 40	08.00 Uhr; NSG Nempfetal, Burgwald	(HERING f.WBe)
	2	17.45 Uhr, bei Roda; Wiese; ziehen am nächsten Tag weiter	(ML)
08.03.98	23	Volkmarsen, Külter Feld	(KHS)
21.03.98	3	Feld nördl. Münden	(MH))

Flußregenpfeifer (Charadrius dubius)

Bruten 1998 (bei unvollständiger Erfassung):

1 Bp	Bruterfolg? Volkmarsen, Tagebau Wienerberger (07.06. Kopulation)	(KHS)
1 Bp	Bruterfolg? Eder, Kiesinsel bei Schmittlotheim (brütet am 20.04.)	(WB, ERi)
1 Bp	Bruterfolg? Eder, Kiesinsel bei Viermünden (brütet am 22.04.)	(WB)
1 Bp	Bruterfolg? neuer Kiesteich bei Mehlen (brütet am 14.06.)	(EH, WL, HSt)
4 Bp	Erneut extrem niedriger Brutbestand (wie Vorjahr), noch dazu ohne nachgewiesenen Bruterfolg!	

Brutverdacht:

1 – 2 Bp	Kiesbaggerteiche zw. Mehlen u. Giflitz (zusätzlich zu oben aufgeführtem Brutpaar)	(EH, WL, HSt)
1 Bp	Jungferhügel zw. Schreufa u. Viermünden an neu angelegter Blänke	(WB, REn, ERi)

Letztbeobachtung:

17.08.97	1 ad (RK)	Edersee, zw. Herz- u. Harbshausen	(REn)

Erstbeobachtung:

26.03.98	1	zw. Mehlen u. Giflitz; auf Acker	(WL)

Mornellregenpfeifer (Charadrius morinellus)

17.08.97	1 w ad. (PK)	Fuchskaule bei Immighausen; überhinfliegend, ruft „ptrü" u. schnell gereiht „twi"	(REn)
03.09.97	1 w	zw. Korbach u. Lengefeld; überhinfliegend; ruft „ptrü" u. schnell gereiht „twi"	(REn)

3. u. 4. Nachweis für das Kreisgebiet. Anerkannt von der Deutschen Seltenheitenkommission (s. Limicola 11/1997: S. 262). Die Nachweise reihen sich ein in eine Vielzahl von Wegzugnachweisen bundesweit (s. Limicola 11/1997: S. 262 u. 315).

Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria)

22.02. bis	max. 148	(am 15.03.) Hochfläche zw. Nieder-Ense,	(PhB, SFB)
18.03.98		Ober-Ense, Thalitter u. Immighausen	REn, ERi)
23.02.98	1	Altes Feld bei Dainrode	(ERi)
02.03.98	20	Ederaue Rennertehausen	(ERi)
	7	Altes Feld bei Dainrode	(ERi)
04.03.98	9	Böhlen bei Goddelsheim	(ERi)
05.03.98	12	An der Wande bei Volkmarsen	(KSt, MSo)
	ca.	50 Vasbecker Hochfläche	(AG)
06.03.98	1	Ederaue Rennertehausen	(ERi)
	35	Altes Feld bei Dainrode	(ERi)
	ca.	80 Vasbecker Hochfläche	(AG)
03.05.98	1	Schlemmteich bei Mehlen	

Erneut verhältnismäßig starker Frühjahrszug. Erster Mainachweis für das Kreisgebiet. Das Tier war unter- und kopfseits nicht voll schwarz ausgefärbt, so daß es sich möglicherweise um ein Exemplar der Unterart P. a. altifrons handelte.
Ausnahmsweise kann die Mauser des Brutgefieders erst im Mai abgeschlossen werden, so daß es sich noch um ein Übergangskleid gehandelt haben könnte; eine eindeutige Unterartzuordnung kann nicht vorgenommen werden. (EH)

Kiebitz (Vanellus vanellus)

Bruten 1998:

1 Bp	(ohne Erfolg); NSG Twistevorstau	(KSt)
1 Bp	(ohne Erfolg); Gellershausen, Goldbach	(W. HECKER f. WL)
1 Bp	4 juv., davon mind. 1 flügge geworden; südl. Rosenthal, Ackerbrache	(ML, FS, BT)
3 Bp	Neuer Negativrekord, aber immerhin ein Paar erfolgreich.	

Bruthinweise:

10. u. 17.05.98	je 1	Frankenberg, Kaltes Wasser	(FS)
16.05.98	1	Giflitz, Bruchfeld; auf Maisacker	(WL)

Weiterhin abnehmende Tendenz dieser Art als Brutvogel!

Letztbeobachtung:

02.11.97	25	bei Rhoden	(KSt)

Winterbeobachtung (Dez./Jan.):

11.01.98	1	bei Mehlen	(ERi)

Erstbeobachtung:

11.02.98	15	bei Nieder-Ense	(ERi)

Größere Ansammlungen (> 1000 Individuen):

05.08.97	ca. 1000	Volkmarsen, am Stadtbruch	(KSt)
31.08.97	ca. 1000	Wandetal bei Volkmarsen	(KSt)
22. bis 25.02.98	ca. 1000	zw. Ober-Ense u. Immighausen	(PhB, SFB, REn, ERi)
22.02.98	ca. 1000	zw. Strothe, Meineringhausen u. Höringhausen	(DUX)
23.02.98	ca. 1200	Altes Feld bei Dainrode	(ERi)
05.03.98	ca. 1000	Billinghäuser Teiche	(MSo)

Zwergstrandläufer (Calidris minuta)

28. bis 30.04.98	1	Edersee, Herzhausen; Landzunge	(KG, ERi)
04.05.98	1	Neuer Teich bei Mehlen	(HSt)
07.05.98	1	(SK od. vorj.) Edersee, Herzhausen	(VL)

Temminckstrandläufer (Calidris temminckii)

22.05.98	1	NSG Krautwiese am Wesebach, Kiesabbaubereich	(WL)
25.05.98	1	Edersee, Herzhausen	(ERi)

3. u. 4. Nachweis dieser Art im Kreisgebiet.

Alpenstrandläufer (Calidris alpina)

03.09.97	1	NSG Twistevorstau	(KSt)
03.10.97	3 (2 ÜK, 1 SK)	Kiesbaggerteiche zw. Mehlen u. Giflitz	(WL)
	3 (2 SK, 1 ÜK)	Edersee, Bringhäuser Bucht	(WL)
04.10.97	1 (ÜK)	Schlemmteich bei Mehlen	(WL)
14.10.97	1 (SK)	Neuer Teich bei Mehlen	(WL, ERi)
04.03.98	1	Immighausen; Rast auf Acker, vergesellschaftet mit 80 Kiebitzen u. 43 Goldregenpfeifern	(ERi)
25.05.98	1	Kiesbaggerteiche zw. Mehlen u. Giflitz	(ERi)

Kampfläufer (Philomachus pugnax)

27.04.98	1 m (PK), 2 w	Schlemmteich bei Mehlen	(HSt)
29.04.98	2 m (ÜK), 2 w	Jungferhügel zw. Schreufa u. Viermünden; an neugeschaffener Blänke	(KG)
03.05.98	1	Schlemmteich bei Mehlen	(ERi)
28.06.98	1 m (PK)	Edersee, Herzhausen	(REn, KG)
19.07.98	2 w	NSG Krautwiese am Wesebach	(EH)

Zwergschnepfe (Lymnocryptes minimus)

26.10.97	1	Edersee, Bringhäuser Bucht	(FE)
09.11.97	1	Edersee, Bringhäuser Bucht	(FE, WL)
16.11.97	4	Edersee, Bringhäuser Bucht	(WL)
14.12.97	2	Edersee, Bringhäuser Bucht	(WL, HN)
27.12.97	3	Edersee, Bringhäuser Bucht	(WL)
30.12.97	1	Edersee, Bringhäuser Bucht	(FE)
28.02.98	1	zw. Braunsen u. NSG Twistevorstau in Sumpfwiese	(ERi)
02.03.98	1	Edersee, Herzhausen	(ERi)

Bekassine (Gallinago gallinago)

Es liegen 17 Nachweise (unter Berücksichtigung der Dekadenmaxima je Beobachtungsgebiet) mit 23 Exemplaren vor. Erneut extrem wenige Nachweise mit sehr wenigen Tieren. Keine Balzbeobachtungen.

Nachtrag 1995: Brutverdacht in einer Naßwiese bei Sehlen

(G. WEINREICH f. ERi)

	August			September			Oktober		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	1	–	–	2	–	–	–	–	1
Exemplare	2	–	–	2	–	–	–	–	1
Maxima	2	–	–	2	–	–	–	–	1

	November			Januar			Februar		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	1	–	1	–	1	–	–	1	–
Exemplare	3	–	1	–	1	–	–	1	–
Maxima	3	–	1	–	1	–	–	1	–

	März			April			Juli		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	1	–	2	1	1	2	–	–	2
Exemplare	1	–	3	1	1	2	–	–	4
Maxima	1	–	2	1	1	1	–	–	3

Beobachtungsorte (Anzahl der Nachweise in Klammern):
Edersee, Herz- bis Harbshausen (5), Kiesbaggerteiche zw. Mehlen u. Giflitz (2), Jungferhügel zw. Schreufa u. Viermünden (2), Pöhlen bei Adorf (1), Goldhäuser Teich (1), Fuchskaule bei Immighausen, ziehend (1), Fürstenberg, ziehend (1), Seger Teich, Rosenthal (1), Marbecktal, Korbach (1), Anraff (1), Edersee, Bringhäuser Bucht (1).

Waldschnepfe (Scolopax rusticola)

Bruthinweise 1998 liegen aus folgenden Bereichen vor (Anzahl der max. festgestellten Individuen/Reviere in Klammern):
Domanialrevier Bergheim (1), Stadtwald Bad Wildungen, Pärrnerweg (1), Forstrevier Rosenthal-West (mind. 4), Willingen, Langenberg, 800 m ü.NN (1), Wipperberg bei Lengefeld (1).

Letztbeobachtung:			
17.11.97	1	Königshagen	(CREDE f. WL)
Winterfeststellung:			
Anfang Januar 1998	1	Revierförsterei Frankenberg	(REITZ f. ERi)
Erstbeobachtung:			
11.03.98	1	Revier Mandern	(FE)

Uferschnepfe (Limosa limosa)

15.08.97	1	NSG Twistevorstau	(KSt)
24.04.98	1	NSG Twistevorstau	(KSt)
27.04.98	2	NSG Twistevorstau	(KSt)

Großer Brachvogel (Numenius arquata)

07.08.97	1	östl. Buhlen; rufend, überhinfliegend	(HSt)
31.08.97	1	Fuchskaule bei Immighausen; ziehend → SW	(REn, KG)
02.09.97	1	Ortsteil Edersee; rufend, ziehend → W	(HSt)
11.09.97	1	Fuchskaule bei Immighausen; rastet zunächst auf Ackerfläche, wird dort von Wanderfalken (immat. w) erfolglos etwa 10 min. gejagt; rettet sich schließlich in Brachacker	(REn, KG)
29.09.97	1	Ortsteil Edersee; rufend, ziehend → W	(HSt)
30.04.98	1	Jungferhügel zw. Schreufa u. Viermünden; rastend	(KG)
03.05.98	1	NSG Schwimmkaute bei Mehlen; rufend, überhinfliegend	(HN)
04.05.98	1	östl. Buhlen; fliegt niedrig → N	(HSt)
09. bis 14.05.98	1	Schlemmteich bei Mehlen u. umliegende Wiesen; rastend	(EH, WL, HSt)

Dunkler Wasserläufer (Tringa erythropus)

07.08.97	1	Kiesteich bei Mehlen	(FS)
16.08.97	1	NSG Twistevorstau	(KSt)
26.04.98	1	Jungferhügel zw. Viermünden u. Schreufa	(WB)
03.05.98	1	Schlemmteich Mehlen	(PhB, SFB)
04.05.98	2 ÜK	neuer Kiesbaggerteich bei Mehlen	(HSt)

Rotschenkel (Tringa totanus)

24.08.97	1	Edersee Herzhausen	(REn)
31.08.97	1	NSG Twistevorstau	(KSt)
04.09.97	3	NSG Twistevorstau	(KSt)
08.09.97	2	Schlemmteich Mehlen	(EH)
25.03.98	1	neuer Kiesteich bei Mehlen	(WL)
08.05.98	1 ÜK	Schlemmteich Mehlen	(HSt, PhB, SFB)
10.05.98	3	neuer Kiesteich bei Mehlen	(EH)
11.05.98	1 ÜK	Schlemmteich Mehlen	(HSt, EH)
21. u. 22.05.98	1	NSG Twistevorstau	(KSt)
30.07.98	1	Edersee, Herzhausen	(REn)

Grünschenkel (Tringa nebularia)

Es liegen 18 Nachweise (unter Berücksichtigung der Dekadenmaxima je Beobachtungsgebiet) mit 35 Individuen vor.

	August			September			April		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	1	2	3	1	2	2	–	1	2
Exemplare	1	–	–	2	4	2	–	2	9
Maxima	1	–	–	2	4	1	–	2	8

	Mai			Juni		
Dekaden	1	2	3	1	2	3
Nachweise	2	3	–	–	–	3
Exemplare	6	5	–	–	–	4
Maxima	5	3	–	–	–	2

Letztbeobachtung:
29.09.97 1 Edersee/ Scheid, überfliegend (HSt)

Erstbeobachtung:
12.04.98 1 Schlemmteich Mehlen (MJ, EH)

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):

Kiesbaggerteiche zw. Mehlen u. Giflitz (6); Edersee zw. Herzhausen u. Asel-Süd (5); NSG Twistevorstau (4); Jungferhügel zw. Viermünden u. Schreufa (2); Ermerod, Hochspeicherbecken bei Hemfurth (1)

Waldwasserläufer (Tringa ochropus)

Es liegen 25 Nachweise (unter Berücksichtigung der Dekadenmaxima je Beobachtungsgebiet) mit 50 Individuen vor.

	August			März			April		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	3	2	3	–	–	2	–	1	1
Exemplare	6	6	4	–	–	1	–	1	1
Maxima	4	3	2	–	–	1	–	1	1

	Mai			Juni			Juli		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	–	2	–	–	2	–	3	1	5
Exemplare	–	3	–	–	3	–	5	1	19
Maxima	–	3	–	–	2	–	3	1	9

Letztbeobachtung:

31.08.97	2	Edersee zw. Herz- und Harbshausen	(REn, KG)

Erstbeobachtung:

29.03.98	1	neuer Kiesbaggerteich bei Mehlen	(ERi)
	1	Edersee, Herzhausen	(REn, PhB)

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):
Kiesbaggerteiche zw. Mehlen u. Giflitz (13); NSG Twistevorstau (5); Edersee zw. Herzhausen u. Asel-Süd (4); Tongruben bei Sachsenberg (1); Goldhäuser Teich (1); Jungferhügel zw. Viermünden u. Schreufa (1)

Bruchwasserläufer (Tringa glareola)

05.08.97	1	NSG Twistevorstau	(KSt)
10.08.97	3	Edersee bei Herzhausen	(PhB, REn)
17.08.97	1	Edersee bei Herzhausen	(REn)
28.04.98	1	Schlemmteich Mehlen	(ERi)
03.05.98	1	Schlemmteich Mehlen	(PhB, EH, ERi)
08.05. bis 18.05.98	1 bis 11 Ex. (am 15. u. 16.05.98)	Kiesgrubengebiet Mehlen	(PhB, FE, EH, HN, HSt)
16.05.98	1	Edersee bei Herzhausen	(ERi)
28.06.98	4	Edersee bei Herzhausen	(KG)
30.07. u. 31.07.98	2	Edersee bei Herzhausen	(ERi)

Flußuferläufer (Actitis hypoleucos)

Es liegen 45 Nachweise (unter Berücksichtigung der Dekadenmaxima je Beobachtungsgebiet) mit 116 Individuen vor.

	August			September			Oktober		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	4	3	3	2	4	–	–	1	–
Exemplare	14	10	15	3	6	–	–	1	–
Maxima	6	5	7	2	2	–	–	1	–

	November			April			Mai		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	–	–	5	5	5	4	1	–	–
Exemplare	–	–	7	17	10	11	1	–	–
Maxima	–	–	2	6	5	5	1	–	–

	Juli		
Dekaden	1	2	3
Nachweise	1	3	4
Exemplare	2	6	13
Maxima	2	3	4

Letztbeobachtung:
12.10.97 1 Eder bei Hemfurth (HSt)

Erstbeobachtung:
24.04.98 2 NSG Twistevorstau (KSt)

Beobachtungsorte (Zahl der Nachweise in Klammern):
Kiesbaggerteiche zw. Mehlen u. Giflitz (13); Edersee zw. Herzhausen u. Asel-Süd (10); NSG Twistevorstau (8); Stausee Affoldern (4); Diemelsee (3); Eder u. Teiche zw. Wega u. Mandern (1); Billinghäuser Teiche (1); Bad Arolsen, Schloßteich (1); Teiche zw. Bömighausen u. Alleringhausen (1); Teich bei Gut Schaaken (1); Eder bei Hemfurth (1); Kiessee Teichmann bei Herzhausen (1)

Besondere Beobachtung:
26.07.98 1 ad. mit Warnrufen (typisch für jungeführende Ex.)
Eder bei Herzhausen (PhB, SFB, REn)

Zwergmöwe (Larus minutus)

29.08.97	1 ad. (RK)	NSG Stausee von Affoldern	(WL)
26.10.97	1 ad, 1 diesj.	Edersee, Rehbach	(FE)
27.04.98	1 vorj.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(HSt)
03.05.98	1 vorj.	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(PhB, SFB, ERi)

Lachmöwe (Larus ridibundus)

Größere Ansammlungen (> 100 Individuen)

14.10.97	193	Mehlen, ederaufwärts fliegend	(WL, ERi)
02.11.97	250	Edersee, Rehbach	(FE)
28.11.97	130	Edersee, Bringhäuser Bucht	(HSt)
14.12.97	105	Edersee, Waldecker Bucht	(ERi)
25.07.98	120	Edersee, Bringhäuser Bucht	(ERi)

Sturmmöwe (Larus canus)

30.12.97	4 immat.	Edersee, Waldecker Bucht	(FE) (H)

Silbermöwe (Larus argentatus)

13.03.98	2 immat.	Twisteseehauptstau	(MSo)

Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger)

24.08.97	2	Billinghäuser Teiche	(KSt)
28.04.98	7	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(ERi)
03.05.98	2 BK	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(SFB, PhB)
11.05.98	1 BK	NSG Krautwiese am Wesebach, Giflitz	(EH, WL)
14.05.98	1 BK	Edersee bei Herzhausen	(ERi)
15.05.98	2	NSG Twistevorstau	(KSt)
21.05.98	1	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(EH, FE)
30.05.98	1 BK	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(HSt, WL)
05.06.98	1 BK	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(HSt)

Hohltaube (Columba oenas)

Letztbeobachtung:

17.09.97	5	Volkmarsen, Stadtbruch	(KSt)

Erstbeobachtung:

11.02.98	4	Nieder-Ense	(ERi)

Winterbeobachtungen:

10.01.98	1	zw. Lengefeld u. Nordenbeck	(REn)
17.01.98	7	Stormbruch	(ERi)
	2	Deponie Flechtdorf	(ERi)
01.02.98	1	Wellen	(ERi)

Größere Trupps:

25.02.98	18	Nieder-Ense	(ERi)
13.03.98	18	zw. Immighausen u. Thalitter	(PhB)

Besondere Beobachtung:

26.04.98	1	Teilalbino, vergesellschaftet mit Ringeltauben; Schreufa, Jungferhügel	(REn,KG)

Bruten/Bruthinweise 1998:
Oberes Edertal (8), Upland (5), WSG Edersee (8), Unteres Edertal (2), Nord-Waldeck (1), Lichtenfels (1), Altwildungen (1), Viermünden (1), Buchenberg (1).

Ringeltaube (Columba palumbus)

Winterbeobachtung (Dez./Jan.):

05.12.97	26	Bad Arolsen, Große Allee	(AK)
Jan. 98	4	Bad Arolsen, Große Allee	(AK)
11.01.98	10	Immighausen	(ERi)
14.01.98	2+1	Altenlotheim	(ERi)
17.01.98	71	Mehlen-Giflitz	(WL)

Größere Schwärme (> 200 Ex.):

07.03.98	ca. 200	in Pappeln; bei Meineringhausen	(PhB)
11.03.98	ca. 220	bei Nieder-Ense	(PhB)
18.03.98	ca. 500	zw. Nieder-Ense u. Immighausen	(PhB, ERi)

Turteltaube (Streptopelia turtur)

Für 1998 wurden bei unsystematischer Erfassung 23 Reviere aus dem gesamten Kreisgebiet gemeldet.

Letztbeobachtung: 11.09.97 Erstbeobachtung: 27.04.98

Kuckuck (Cuculus canorus)

Rufaktivität: 22.04. – 05.07.98

Als Wirtsvögel konnten je einmal Amsel, Bachstelze und Sumpfrohrsänger ermittelt werden.
Siehe auch Artikel von RICHTER; S. 66 ff

Schleiereule (Tyto alba)

Bruten 1998 (nur unvollständige Erfassung):

1 Bp	3 juv.	Bottendorf, Nistkasten, Scheune W. Möller	(FS)
1 Bp		Sehlen	(WEINREICH f. ERi)
1 Bp	3 juv.	Battenberg-Laisa, Nistkasten in Feldscheune	(HGS)
3 Bp			

Brutverdacht:

1 Brutverdacht	Lichtenfels-Goddelsheim,	(GKu)

Erneut sehr geringer Brutbestand aufgrund des knappen Nahrungsangebotes im Frühjahr und Frühsommer. 1997 wurden 6 Brutnachweise erbracht; in 2 Fällen bestand Brutverdacht.

Besondere Beobachtung:

11.04.98	1	Bad Arolsen, mitten im Bühler Wald (!)	(REc)

Uhu (Bubo bubo)

Bruten 1998:

1 Bp	Brutverdacht	im nordwestl. Kreisteil Waldeck	(AG)
1 Bp	2 juv.	im nordöstl. Kreisteil Waldeck	(REc, KSt)
1 Bp	2 juv.	im nordöstl. Kreisteil Waldeck	(KHS)
1 Bp	Brutverdacht	im Bereich Edersee	(PhB, REn, KG, ERi)
1 Bp	Brutverdacht	im südl. Kreisteil Frankenberg	(ERi)
1 Bp	Brutverdacht	im südwestl. Kreisteil Frankenberg	(HGS)

Weitere Beobachtung:

12.09.97	1	Mehlen, sitzt auf Hausdach	(EH)

Totfund:

16.08.97	1 ad. w	Schmittlotheim, Ederbrücke	(MATH f. WB)

Sperlingskauz (Glaucidium passerinum)

23.09.97	1	läßt sich greifen; Forsthaus Wolkersdorf b. Bottendorf	(SCHRÖDER f. WBe)
20.03.98	2 Reviere	Rfö. Rosenthal-West	(MHo, ERi)
06.04.98	1 Ex.	Rfö. Rosenthal-West (zw. Rosenthal u. Roda)	(ML)
21.03.98		Kein Nachweis (trotz Kontrollen mit Klangattrappe)	
u. 29.04.98		Langenberg u. Ettelsberg bei Willingen	(ERi)
26.04.98	1 Revier	Rfö. Ernsthausen	(ERi)
	3 Reviere	(vergl. Beitrag von LÜBCKE, S. 15)	

Waldohreule (Asio otus)

13.09.97	1	Edertal, Hoher Stoß	(REc)
06.05.98	1	Korbach, Goldhäuser Teich; Nahrungssuche	(REn)
04.07.98	1	Buhlen, NSG Zechsteinhänge bei Lieschensruh, Gemeindegraben	(BH)
15.07.98	1	Bad Arolsen, Bühler Wald	(REc)

Totfunde;

01.09.97	1	Twistevorstau; Verkehrsopfer	(KSt)
23.03.98	1	Hof Lauterbach; Rupfungsfund	ERi)
02.04.98	1	Waldeck; Rupfungsfund	(HSt)

Es liegen keine Bruthinweise vor,was ebenfalls erneut wie im Vorjahr auf das knappe Nahrungsangebot (schlechtes Mäusejahr) zurückzuführen sein dürfte.

Rauhfußkauz (Aegolius funereus)

Bruten 1998:

1 Bp	Naturhöhle, bei Schwalefeld	(PIEPER f. ERi)
1 Bp	in Nistkasten, Silberlöcher bei Dodenau	(HGS)

Rufnachweise:

22.03.98	2 Reviere	Rfö. Rosenthal-West	(ML, ERi)
11.04.98	1	Bad Arolsen, Bühler Wald	(REc)
29.04.98	1	Willingen, oberes Strycktal	(ERi)

Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus)

06.09.97	1	Rfö. Buchenberg, Abt. 409 (lückiger Eichenbestand; 140 J.; 400m ü NN)	(DEMME f.ERi)
01.-21.06.98	1	Balzflüge; NSG Iberg bei Hörle	(KHS)

Totfund:

29.05.98	1	Bromskirchen-Somplar, Verkehrsopfer	(KOHOUTEK f. GKa)

4. – 6. neuerer Nachweis im Kreis Waldeck-Frankenberg

Mauersegler (Apus apus)

Bruten 1998:

130 Bp	Bad Arolsen, an 33 Gebäuden; davon 51 Bp an 3 Häusern. Erneut ungünstige Witterung zur Brutzeit! (1993: 67 Bp; 94: 216 Bp; 95: 222 Bp; 96: 167 Bp; 97: 124 Bp) Erst- und Letztbeobachtung in Bad Arolsen: 30.04. bzw. 02.08.1998 (AK)

Größere Ansammlungen in Schlechtwetterperioden (> 100):

28.04.98	ca. 300	Mehlen	ERi)
01.05.98	ca. 200	Mehlen, NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(WL, ERi)
02.05.98	ca. 300	Eder zw. Mehlen u. Giflitz	(WL)
03.05.98	ca. 1000	Eder zw. Mehlen u. Bergheim	(PhB, SFB, ERi)
24.05.98	ca. 150	Eder zw. Mehlen u. Giflitz	(WL)
	ca. 200	Eder zw. Anraff u. Bergheim	(WL, FP)
09.06.98	ca. 100	Eder bei Anraff	(FP)

Eisvogel (Alcedo atthis)

Bruten 1998:
1 Bp (Brutverdacht) MTB 4820 Bad Wildungen (WL, HSt)

Beobachtungen:

	August			September			Oktober		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	2	1	2	1	2	2	1	3	1
Exemplare	2	1	5	1	3	2	1	3	1

	November			Dezember			Januar		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	2	2	1	–	2	2	1	2	1
Exemplare	2	2	1	–	2	3	2	2	1

	Februar			März			April		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	4	–	1	–	1	2	3	1	1
Exemplare	4	–	1	–	1	2	4	1	1

	Mai			Juni			Juli		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	1	2	1	1	3	1	1	–	2
Exemplare	1	2	1	1	3	1	1	–	2

Überwinterung:
2 Ex. Edersee, Herzhausen (REn, HESSE)

Noch keine Bestandserholung nach strengem Winter 1996/97 festzustellen!

Wiedehopf (Upupa epops)

07.04.98 1 Nieder-Orke, Festplatz (WB,AF)

Wendehals (Jynx torquilla)

03.09.97 1 Buhlen; nahrungssuchend in Weide (HSt)
17.09.97 1 Hemfurth,Hochspeicherbecken Ermerod (HSt)
30.04.98 1 rufend; Reinhardshausen (HN)
16.05.98 1 rufend; Laisa, Letterberg (HGS)
17.05.98 1 rufend; Bergheim bei Wasserbehälter oberhalb Böhner Tal (WL)

Grauspecht (Picus canus)

Aus dem Kreisgebiet wurden 1998 insgesamt 51 Bruthinweise/Reviere gemeldet:

Unteres Edertal/Bad Wildungen (13), WSG Edersee (7), Nördlicher Burgwald (7), Upland/Diemelsee (6),Vöhl (6), Oberes Edertal (4), Nord-Waldeck (2), Frankenberg (3), Lichtenfels (2), Waldeck (1)

Grünspecht (Picus viridis)

Bruten 1998:

1 Bp	Himmelsberg bei Laisa	(HGS)

Aus dem Kreisgebiet wurden 1998 nur weitere 2 Bruthinweise (Reviere) gemeldet: Eichenrain bei Rosenthal, bei Viermünden.

Darüberhinaus liegt je 1 Rufnachweis während der Brutzeit aus folgenden Bereichen vor: Münden, Böhner Tal, Mehlen, Wega, Mandern, Altwildungen, Asel-Süd, NSG Battenfelder Triescher

Mittelspecht (Dendrocopos medius)

Reviere 1998:
Von 56 bekannten Mittelspechtgebieten wurden 52 mit Klangattrappe kontrolliert; keine Bestandsschwankung oder –tendenz erkennbar.

In 2 Gebieten konnten 1999 erstmals Revierpaare (RP) nachgewiesen werden:

1 RP	Wildpark Edersee	
2 RP	Elbrighäuser Grund b. Battenberg	(ERi)

Brutzeitmeldungen (01.03. bis 15.06.) von Mittelspechten sind weiterhin aus allen Gebieten sehr erwünscht!

Kleinspecht (Dendrocopos minor)

Bruten 1998:

1 Bp	Niederorke, Orkeufer	(WB)
1 Bp	Benkhausen	(AG)
1 Bp	Hardt bei Buhlen	(HSt)

Insgesamt liegen zusätzlich 30 Bruthinweise vor:
Stadtbruch Volkmarsen, Bad Arolsen, Giebringhausen, Deisfeld, Herzhausen, Asel-Süd, Stausee Affoldern, Uhrenkopf bei Buhlen, Wernertsberg bei Buhlen, Wesemündung bei Giflitz, Domanialrevier Bergheim, Freilandlabor Bergheim,Talgraben bei Bergheim, Pappelwäldchen bei Bergheim, Eder zw. Mehlen u. Giflitz, Anraff, Wellen, Bad Wildungen (2), Kleinern, bei Gellershausen, Hüddingen, Sachsenhausen, Altenlotheim, Eichenrain bei Rosenthal, Viermünden, Sachsenberg, Kreuzweg bei Berghofen (2), bei Laisa.

Heidelerche (Lullula arborea)

Bruthinweise (Reviere) 1998:

3 Rev.	NSG Battenfelder Driescher	(ERi, HGS)
1 Rev.	bei Osterfeld	(ERi)

Brutzeitnachweis:

08.04.98	1 sing.	Aartal nördl. Münden; Windwurf; bei 10 weiteren Kontrollen kein Nachweis; 1996 und 1997 hier Brutverdacht	(FrS)

Zug- und Rastbeobachtungen:

	Oktober			März		
Dekaden	1	2	3	1	2	3
Nachweise	–	13	2	2	3	3
Exemplare	–	46	2	15	12	17

Wegzug: 11.10. – 23.10.97 Heimzug: 13.03. – 29.03.98

Feldlerche (Alauda arvensis)

Winterbeobachtungen:

30.11.98	2	Wandetal bei Volkmarsen	(KSt)
15.12.98	1	östl. Buhlen	(HSt)
21.12.98	5	Jungferhügel bei Viermünden	(REn)
06.01.99	1	östl. Buhlen	(HSt)

Größerer Trupp:

01.03.98	ca. 1000	zwischen Ober-Ense und Immighausen	(PhB)

Rauchschwalbe (Hirundo rustica)

Bestandserfassung 1998:
24 Bp in Immighausen (davon 1 Bp in Boxenlaufstall) (PhB, SFB, ERi)
In dem 400 Einwohner zählenden Dorf gibt es nur noch vier größere Ställe.

Bitte alle Bruten und Nester aus Boxenlaufställen melden!

Mehlschwalbe (Delichon urbica)

Bestandserfassung 1998:
50 in Immighausen (davon 22 Bp in Kunstnestern) (PhB, SFB, ERi)
Auf drei größere Kolonien entfallen 7, 8 bzw. 12 Bp.

Ende August 1998 wurden aufgrund von Renovierungsarbeiten an einem Fachwerkhaus in Bad Wildungen-Reinhardshausen 18 Nester (auf einem Abschnitt von nur fünf Metern) zerstört. (HN)

Brachpieper (Anthus campestris)

17.08.97	5	Jungferhügel bei Viermünden	(REn)
21.08.97	1	Fuchskaule bei Immighausen	(ERi)
28.08.97	1	ziehend und rufend, Uhrenkopf zwischen Buhlen und Hemfurth	(HSt)
24.08.97	3	Fuchskaule bei Immighausen	(REn)
07.09.97	1	ziehend, Fuchskaule bei Immighausen	(PhB, REn, KG)
13.09.97	1	rastend auf Grasweg östlich Buhlen	(HSt)

Baumpieper (Anthus trivialis)

Bestandserfassung auf Probefläche 1998:
MTB 4820 Bad Wildungen, rechtes oberes Viertel, ca. 33 km²
Nur eine Beobachtung am 19.04.1998; spätere Kontrollen waren erfolglos.
1990 konnten auf dieser Probefläche noch 23 Reviere festgestellt werden.

RICHTER kontrollierte am 22.05.1998 die Hochheideflächen im Waldeckischen Upland auf Vorkommen von Baum- und Wiesenpieper:

	Willingen/Ettelsberg	Usseln/Kahler Pön	Usseln/Osterkopf
Baumpieper	8 Rev.	8 Rev.	3 Rev.
Wiesenpieper.	4 Rev.	4 Rev.	2 – 3 Rev.

Wiesenpieper (Anthus pratensis)

Reviere 1998:

2	Wandewiesen bei Volkmarsen	(KHS)
2	Wirmighäuser Kopf	(MSo)
11	Vasbecker Hochfläche	(MSo)
1	Jungferhügel bei Viermünden	(REn)
1	Herzhausen	(REn)
1	Waldeck, Golfplatz	(HSt)
2	Altes Feld bei Dainrode	(FE)
1	Böhlen bei Goddelsheim	(ERi)
4	Ettelsberg bei Willingen	(ERi)
2	NSG Osterkopf bei Usseln	(ERi)
4	NSG Kahler Pön bei Usseln	(ERi)
1	zwischen Münden und Neukirchen	(ERi)
2 – 3	Neukirchen	(ERi)
2	Ederaue bei Rennertehausen	(HGS)
36 – 37		

(1997 nur 10 Rev. gemeldet, im Waldeckischen Upland erfolgten 1997 keine Kontrollen)

Nordische Schafstelze (Motacilla flava thunbergi)

04.09.97	1 m	östl. Buhlen	(HSt)
10.04.98	1 m	Nempheteiche südl. Frankenberg	(ERi)
23.05.98	1 m	NSG Krautwiese am Wesebach, auf Kiesböschung	(WL)

Gebirgsstelze (Motacilla cinerea)

Winterbeobachtungen:

24.12.97	1	Wega, Wilde	(FE)
11.01.98	1	NSG Ederseeufer bei Herzhausen	(PhB, REn)
30.01.98	1	Bad Wildungen, Kläranlage	(BH)
07.02.98	1	Wilde bei Gut Elim	(FE)
26.02.98	1	Haine, Hainebach	(K. SCHNEIDER f. GKa)

Bachstelze (Motacilla alba)

Ungewöhnliche Neststandorte 1998:
2 Bruten in Blumenkästen der Grundmühle in Böhne sowie in Gellershausen in einer Kletterrose an Hauswand als Nestunterlage (WL)

Seidenschwanz (Bombycilla garrulus)

25.02.98	7	ziehen → nach Norden, Altwildungen, Zollstock	(FE)

Wasseramsel (Cinclus cinclus)

Bruten 1998 an vollständig erfaßten Gewässern:
47 Bp im oberen Edertal (einschließlich der Nebenbäche)
zwischen Hatzfeld und Röddenau (71,5 km), 43 Bp erfolgreich.
1997 49 Bp; niedrigster Bestand seit 1984! (HGS)

Weitere Bestandserfassungen der Wasseramsel aus dem Jahr 1998 liegen leider nicht vor.

Heckenbraunelle (Prunella modularis)

Aus den Monaten Dezember und Januar wurden 10 Nachweise mit 11 Exemplaren gemeldet. Die meisten Beobachtungen stammen aus dem unteren Edertal. Die Heckenbraunelle als Wintervogel wird sicher häufig übersehen bzw. überhört. [Vergl. LÜBKCE , W. u. F. EMDE (1984): Die Heckenbraunelle (Prunella modularis) als Wintervogel im Edergebiet. Vogelkdl. Hefte Edertal 10: 39 – 50].

Nachtigall (Luscinia megarhynchos)

Bruthinweise (Reviere) 1998:
50 Edertal zwischen Affoldern und Kreisgrenze bei Mandern
(12 Flußkilometer); davon 7 Reviere außerhalb der Ederaue (WL)
(Höchstbestand seit 1975!)

15.05. u. 20.05.	1 singt	Leiseküppel östl. Frankenberg	(FS)

Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros)

29.11.97	2 m	Korbach	(PhB)
01.12.97	1 m	Korbach, Industriegebiet Nord	(AG)
11.02.98	1 m	Silagemiete, Lengefeld	(REn)

Winterbeobachtungen werden im Kreisgebiet nicht alljährlich erbracht. Erfolgreiche Überwinterung wurde bisher nicht nachgewiesen. Bei der Beobachtung am 11.02.98 handelte es sich jedoch um den bislang spätesten Winternachweis.

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)

Bruthinweise (Reviere) 1998:

5	Bad Arolsen	(AK)
1	Korbach, St. Marien	(WISSE f. AK)
1	Nordenbeck	(ERi)
1	Giflitz, Herzberg	(WL)
1	Mehlen, Schwarzer Graben	(WL)
5	Bad Wildungen, Stadtgebiet	(FE, BH, WL, HN)
2	Frankenberg	(FS)

Nachtrag:

6 Bruthinweise 1997: 5 Bad Arolsen (AK)

Darüber hinaus liegen noch zahlreiche Gesangsnachweise vor, darunter 1 m am Ettelsberg bei Willingen (ca. 800 m ü. NN; 22.05.98; ERi).
Einmalige Gesangsfeststellungen nach dem 15. Mai wurden nicht berücksichtigt.

Vom Wegzug wurden 2 Vögel im Zeitraum zwischen 26.07. und 31.08.1997 von der Fuchskaule bei Immighausen gemeldet. (REn, KG)

Braunkehlchen (Saxicola rubetra)

Bruthinweise (Reviere) 1998 (bei unvollständiger Erfassung):

1 Bv	Feldflur zwischen Somplar und Bromskirchen	(FrS)
3 Bp	Feldflur zwischen Somplar und Bromskirchen (3 juv.)	(FrS)
2 Bv	nördl. Neukirchen, Schwelgersbach	(FrS, GKu, ERi)
3 Bv	westl. und südw. von Neukirchen	(FrS)
	(9 Reviere gegenüber 12 im Jahr 1997)	
1 Bp	Wandetal; Volkmarsen	(KHS)
1 Bp	Goldhäuser Teich bei Korbach (erfolglos)	(REn, BH)
1 Bp	zw. Nieder- und Ober-Ense	(AK)
1 Bp	Ellershausen	(VETTERICK f. WL)
1 Bp	Dainrode	(ERi)
2 Bp	Laisa, Letterbach	(HGS)
16 Bp		

Schwarzkehlchen (Saxicola torquata)

15.03.98	1 w	Strother Moor bei Korbach	(SFB, REn, ThK)
29.03.98	1 w	Wetterkapelle bei Volkmarsen, in Sandgrube	(KHS)
08.04.98	1 m	Kläranlage Rosenthal (bereits 1997 hier beobachtet)	(BT)

Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe)

Zugbeobachtungen:

	August			September			Oktober		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	–	1	–	7	4	2	1	1	1
Exemplare	–	1	–	11	10	4	11	10	4
Maxima	–	1	–	3	5	3	11	10	4

	März			April			Mai		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	–	–	1	7	3	4	20	19	6
Exemplare	–	–	1	7	6	4	52	35	6
Maxima	–	–	1	1	2	2	8	4	1

Wegzug: 16.08. – 14.10.97

Heimzug: 29.03.98 – 31.05.98

Ringdrossel (Turdus torquatus)

13.10.97	1	Waldeck, Mauserwerke	(HSt)
10.04.98	1 m	Ascheid bei Schweinsbühl	(AG)
	3 m, 1 w	Lenscheid bei Schweinsbühl	(AG)
11.04.98	1 m	Lenscheid bei Benkhausen	(AG)
12.04.98	1 m	Ascheid bei Schweinsbühl	(AG)
14.04.98	1 m	Aartal bei Münden	(ERi)
19.04.98	1 w	bei Immighausen	(ERi)
21.04.98	1 w	Roter Berg bei Altwildungen	(FE)
26.04.98	2 m, 1 w	Fahrentriesch bei Altenlotheim	(FE)
	1 m	Mittelberg bei Frankenau	(FE)
29.04.98	1 w	Jungferhügel bei Viermünden	(KG)
05.05.98	1	Kahler Pön bei Usseln	(FE)
22.05.98	2 m	Ettelsberg bei Willingen	(ERi)

Evtl. ist die letzte Beobachtung als Brutverdacht zu werten; das Beobachtungsdatum ist das bisher späteste aus dem Kreisgebiet! Bitte auf die Ringdrossel im Waldeckischen Upland achten! (Vergl. Beitrag von LÜBCKE, S. 22).

Wacholderdrossel (Turdus pilaris)

Größere Zugtrupps (ab 200):

29.11.97	405	Altwildungen, Immengraben	(FSch)
30.11.97	200	Volkmarsen, Wande	(KSt)
01.01.98	200	zwischen Anraff und Giflitz	(FP)
17.01.98	400	zwischen Fürstenberg und Immighausen	(WB)
25.01.98	220	Korbach, Hauer	(PhB)
21.03.98	300	Adorf	(ERi)

Rotdrossel (Turdus iliacus)

Größte Zugtrupps:

16.03.98	500	Münden, Aartal	(ERi)

Frühestes Datum: 10.09.97
Spätestes Datum: 02.05.98

Winterbeobachtungen (Dez. – Feb.):

13.12.97	2	NSG Stausee von Affoldern	(FE)
12.01.98	1	Reinhardshausen	(HN)
13.01.98	6	Bad Wildungen, Funkemühle	(FE)

Misteldrossel (Turdus viscivorus)

Winterbeobachtungen (Nov. – Jan.):

13.11.97	1	Altwildungen, Flurteil Hettensee	(FE)
14.11.97	1	Kleiner Mehlberg bei Waldeck	(HSt)
06.12.97	1	Altwildungen, Roter Berg	(FE)
19.12.97	1	Kleiner Mehlberg bei Waldeck	(HSt)
01.01.98	1 + 1	Kurpark Bad Wildungen	(FE)
16.01.98	1	Wesetal bei Giflitz (singend)	(WL)
13.01.98	1	Armsfeld	(HN)
23.01.98	1	Buchenberg	(ERi)
30.01.98	1	Kleiner Mehlberg bei Waldeck	(HSt)
07.02.98	1	Roter Berg bei Gut Elim, Bad Wildungen	(FE)

Größere Trupps:

09.08.97	30	Goldhäuser Teich	(REn)
16.08.97	15	Goldhäuser Teich	(REn)
23.03.98	30	Goldhäuser Teich	(REn)
03.04.98	23	Albertshausen	(HN)

Feldschwirl (Locustella naevia)

Untersuchungsfläche 1998:

9 Reviere	MTB 4820 ca. 33 km²	Bad Wildungen, rechtes oberes Viertel,	(WL)

(1996 und 1997: jeweils 13 Rev.)

Schlagschwirl (Locustella fluviatilis)

24.05.98	1 sing.	oberhalb Ederbrücke Anraff (brachgefallene Wiese mit Weidenbüschen	(WL)

Rohrschwirl (Locustella luscinioides)

29.05.98	1 sing.	Teichgebiet „Auf dem Bruch" zwischen Frankenberg und Röddenau	(FN, FS)

Erstnachweis für den Landkreis Waldeck-Frankenberg.

Aus den Nachbarkreisen wurden bereits eine Reihe von Beobachtungen gemeldet (mehrere Beobachtungen in zeitlicher Nähe als ein Nachweis gewertet):

Marburg-Biedenkopf	6 Nachweise	(bis 1993)
Marburg-Biedenkopf	1 Brutverdacht im Schweinsberger Moor; wochenlang singend	(1996)
Stadt- und Landkreis Kassel	3 Nachweise	(bis 1996)
Schwalm-Eder-Kreis	4 Nachweise	(bis 1996)

Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris)

Siedlungsdichte:
6 Reviere Altwildungen, Flurteil Hettensee (Fläche: ca. 1000 m²).
Die Revierflächen waren 1989 im Zuge eines Flurbereinigungsverfahrens mit Rosen bepflanzt worden, heute als „Feldholzinsel" in einer sonst weitgehend ausgeräumten Agrarlandschaft. (FE)

Rohrsänger (Acrocephalus spec.)

Besondere Beobachtung:

01.05.98 Ein intensiv singender Rohrsänger in einem Weidengebüsch links unterhalb der Anraffer Brücke. Der Gesang enthielt die typischen Strophen von Sumpf- und Teichrohrsänger; Rücken und Bürzel waren kontrastarm braungefärbt, eine olivfarbene Gefiederzeichnung war nicht feststellbar. Artzugehörigkeit konnte wegen schwieriger Beobachtungsverhältnisse nicht definitiv geklärt werden. Mögliche Hybridisierung oder Mischsänger? (FE, REc, REn, WL, ERi)

Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus)

Bruthinweise 1998 (Gesang Juni/Juli):

2	NSG Twistevorstau	(KSt)
1	Kleinern, Schilfgebiet an der Hammermühle	(ERi)
1	Herzhausen	(HSt)
2	NSG Krautwiese am Wesebach, Giflitz	(WL)
1	oberer Kiesteich bei Mehlen	(WL)
1	Teiche rechts unterhalb Anraffer Brücke	(WL)

Gelbspötter (Hippolais icterina)

Bruthinweise 1998 (sing. Männchen nach dem 15.06. oder mehrfach am gleichen Ort verhört):

1	Bad Arolsen, Thielebach	(AK)
1	Korbach, Hauer	(PhB)
2	Korbach, Philosophenweg	(ERi)
1	Bad Wildungen, Königsquellenpark	(FE)
2	Eder bei Wellen, Hybridpappeln	(WL)
1	Polizeiteich zw. Wega u. Mandern, Weidenbüsche u. Holunder	(WL)
1	Eder zw. Anraff und Wega, Hybridpappeln	(WL)
1	NSG Krautwiese am Wesebach, Weidenbüsche	(WL, HN)
1	Rechts unterh. Anraffer Brücke, Weidenbusch	(WL)
1	Links unterh. Anraffer Brücke, Weidenbusch / Erle	(WL)
1	Mehlen, an Netze bei Lieschensruh, Weidenbusch	(WL)
1	Bergheim, Edermühle, Hybridpappel	(WL)
1	Eder bei Affoldern, ,Weidenbüsche	(WL)
1	Lengefeld	(REn)
1	Billinghausen, Diemel	(KSt)
17		

Bemerkenswert ist der Nachweis von 10 Revieren im unteren Edertal zwischen Affoldern und der Kreisgrenze bei Mandern. Hybridpappelbestände und ältere Weidenbüsche bieten hier geeignete Habitate. Bitte Habitatstrukturen der Reviere mitteilen!

Klappergrasmücke (Sylvia curruca)

Untersuchungsfläche 1998:
30 Reviere MTB 4820 Bad Wildungen, rechtes oberes Viertel, ca. 33 km²
(1997: ebenfalls 30 Reviere) (WL, HSt)

Dorngrasmücke (Sylvia communis)

Untersuchungsfläche 1998:
114 Reviere MTB 4820 Bad Wildungen, rechtes oberes Viertel, ca. 33 km².
Maximum seit 1987! (WL,HSt)

Auch aus anderen Bereichen des Kreisgebietes (z. B. aus dem oberen Edertal) wurde ein bemerkenswert hohes Vorkommen der Dorngrasmücke gemeldet.

Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca)

Wie bereits im Vorjahr auch 1998 keine Brutvorkommen außerhalb des Waldes. Von Männchen der dunklen Morphe wurde lediglich Durchzug festgestellt. Zwischen dem 24. und 26.04.98 wurden Einzelvögel in Adorf, Stormbruch und Viermünden beobachtet! (AG, KG, WB)

Schwanzmeise (Aegithalos caudatus)

Stärke der Wintertrupps (Okt. – Febr.):

Truppengröße	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nachw.	3	2	–	–	3	1	1	3	1	–

Beutelmeise (Remiz pendulinus)

26.09.97	1 ziehend	Goldhäuser Teich bei Korbach	(REn)
01.05.98	1 Rufe	oberer Teich zwischen Mehlen und Giflitz	(WL)
	1 Rufe	Eder zwischen Bergheim und Anraff	
	1 Rufe	unterhalb Anraffer Brücke	(REn)

Brutnachweise der Beutelmeise gelangen in den letzten Jahren im unteren Edertal nur unregelmäßig, zuletzt 1997. (Vergl. Beitrag von LÜBCKE, S. 14)

Pirol (Oriolus oriolus)

17.05.98	1 singt	Klärteich Wega	(FE)
28.05.98	1 singt	Haine	(LORENZ fide GKa)
30.05.98	1 singt u. ruft	Eder zw. Mehlen u. Giflitz	(HSt)
31.05.98	1 singt	Billinghäuser Teiche	(KSt)

Neuntöter (Lanius collurio)

Untersuchungsflächen 1998 :

	53 Bp	MTB 4820 Bad Wildungen, rechtes oberes Viertel, ca 33 km². Nach Höchststand 1996 (84 BP) erneuter Rückgang (1997: 70 BP)	(WL)
	10 Rev.	Feldmark Rosenthal	(ML)
	6 Rev.	Windwurfflächen im nördl. Burgwald	(ML)
28.06.98		flügge juv. bei Königshagen	(WL)

Raubwürger (Lanius excubitor)

Bruten (Reviere) 1998 :

1	südöstl. Münden, mind. 2 juv.	(FrS)
1	Waldeck, Golfplatz; 2 juv.	(HSt)
12	Gemarkung Frankenau; Bestand wie in 1997	(HR)
1	westl. Goddelsheim	(GKu)
1	Waldschutzgebiet Edersee, Haardt; Abt. 339	(JP, ERi)
1	Haine, Abt. 11	(ERi)
1	Rosenthal-West, Abt. 260, Windwurffläche	(MHo, ML)
18 Reviere		

Zusätzlich Brutzeitnachweise (01.03. – 30.06.) aus 14 Gebieten; gegenüber den Vorjahren erhöhte Anzahl wegen gezielter Nachsuche (Beobachtungen geographisch geordnet):

28. u 31.03.98	1	Goldhäuser Teich	(REn)
16., 17.03. u. 25.03.98	1	südl. Immighausen; Gut Schaaken	(WB, ERi)
19. u. 31.03.98	1	Herzhausen; Abt. 478; Revierverhalten	(ERi)
15. u. 30.03.98	2 Ex.	südl. Basdorf, Abt. 96	(ERi)
16.03.98	1	Rhadern, Aartal, Halwigkerkopf; Revierverhalten	(ERi)
17.04.98	(1)	Rhadern, Aartal	(KÖNIG)
16.03.98	1	westl. Münden, Abt. 802; Revierverhalten	(ERi)
03. u. 16.03.98	1	Neukirchen; Abt. 604; Balzrufe	(ERi)

26. u. 29.06.98	(1)	westl. Neukirchen	(FrS)
26.03.98	1	Bringhausen; Abt. 210; Revierverhalten	(ERi)
29.03.98	1	Braunau; Abt. 26 (Stadtwald); Revierverhalten	(ERi)
27.03. u. 01.05.98	1	südl. Rodenbach, Abt. 155	(BH, ERi)
26.06.98	1	südl. Bromskirchen; „Hauch“	(FrS)
28.03.98	1	NSG Battenfelder Driescher	(ERi)
20.03.98	1	Bottendorf; Theerhütte; Abt. 71; Revierverhalten	(ERi)
02.05.98	1	Gemünden; Abt. 10; Revierverhalten u. Gesang	(MHo)
	14 Gebiete	(Zweitbeobachtung aus einem Gebiet in Klammern)	

Dauerhaft besetzte Winterreviere: Volkmarsen, Wandetal; Buchenberg; Vöhl; Altenlotheim; Feldgemarkung Rosenthal (2 Rev.).

Einzelnachweise außerhalb der Brutzeit (01.07. – 28.02.): Volkmarsen, Wandebach; Twiste; sdl. Rhenegge; Sudeck; Flechtdorf; Helmscheid; Nieder-Ense; Vöhl, Buchenbusch; Ederbringhausen; zw. Viermünden u. Hof Treisbach; Jungferhügel zw. Viermünden u. Schreufa; Fuchskaule bei Immighausen; Edersee, Herzhausen; Eder bei Schmittlotheim; Waldschutzgebiet Edersee, Quernst; zw. Frebershausen u. Hüddingen; östl. Buhlen; Bad Wildungen, Wolfhagen; Rosenthal, Gut Eichhof; Röddenau; Birkenbringhausen; zw. Eifa u. Dexbach

Bitte weiterhin alle Daten melden, da die Art in Hessen in der Roten Liste in Kategorie 1 (Vom Aussterben bedroht) eingestuft ist!

Elster (Pica pica)

Größere Trupps (ab 15):

11.01.98	18	Laisa, Himmelberg	(HGS)
11.02.98	18	Niederorke, Wippold	(WB)

Schlafgesellschaften:

Bad Wildungen, am Bahnhof

10.11.97	ca. 30	(FE)

Vöhl, große Hecke am Waldrand

10.01.98	45	17.01.98	41	
11.01.98	65	26.02. u. 10.03.98	14	(ERi)
16.01.98	mind. 30			

Altenlotheim (Heckenlandschaft):

14.01.983	5	(ERi)

Höhenverbreitung:

April 1998	1 Bp	Willingen, Bahnhof (580 m ü. NN)	(KRAMER f. ERi)
22.05.98	1 Nest (Brut?)	Usseln, Osterkopf (620 m ü. NN)	(ERi)
22.05.98	1 Ex.	Willingen, Ettelsberg; Nahrungssuche (750 m ü. NN)	(ERi)

Bislang höchster bekannter Brutplatz auf 550 m ü. NN (Willingen, 1995).

Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes)

18.07.98	1	Bromskirchen, im Hausgarten	(BÖHME fide HGS)
03.09.97	1	Niederorke, Orketal	(ERi)
05.09.97	1	nördl. Usseln	(HN)
10.10.97	1	Alraft, Alraftsgraben	(HESSE)
26.10.97	1	Frankenberg - Ost	(GKa)
08.11.97	1	Vöhl	(LOTZE fide GKa)
13.11.97	1	Netze, an Hasel im Garten	(HEUN fide FE)
30.11.97	2	Korbach, Alte Badeanstalt	(REn, PhB, SFB)
25.06.98	2	Lengefeld; überfliegen offene Feldflur	(REn)
Nachtrag:			
11.10.96	1	Lelbach	(HESSE)

Dohle (Corvus monedula)

Zugzeitbeobachtungen:

	September			Oktober			November		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	–	–	1	1	–	1	–	–	1
Exemplare	–	–	150	7	–	6	–	–	75
Maxima	–	–	150	7	–	6	–	–	50

Winterbeobachtungen: Zugbeobachten:

	Januar			Februar			März		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	1	3	1	1	3	3	–	2	–
Exemplare	32	29	4	7	70	85	–	64	–
Maxima	32	16	4	7	50	40	–	64	–

Beobachtungsorte: Flechtdorf, Mülldeponie; Korbach; Nieder-Ense; Immighausen; Vöhl; Basdorf; Harbshausen; Herzhausen; Geismar; Ernsthausen

Bruten 1998 :	Gebäudebrüter	
3	Korbach, Kilianskirche	(FE, ERi)
5	Korbach, Nicolaikirche	(FE, VL, ERi)

Bruten 1998 :	Waldbrüter	
3 – 4	Rfö. Landau	(LANDAU fide ERi)
1	Gut Schaaken, Abt. 3	(ERi)
einige	Dalwigksthal, Abt. 35	(BERENS fide ERi)
mind. 6	Herzhausen; Abt. 465, 473, 481	(ERi)
6	Harbshausen; Abt. 338	(ERi)
5	Hof Treisbach (Kreiswald Viermünden; Abt. 25 u. 58)	(ERi)
31 !!	Forstamt Burgwald (29 juv. mit Farbringen versehen)	(MHo)
5	Berghofen, Kreuzweg Abt. 513	(HGS, ERi)
3	Berghofen, Langer Grund, Abt. 525 u. 527	(HGS)
1	Laisa, Prächte	(HGS)

Mindestens 70 Bp wurden ermittelt, davon nur 8 Bp an Gebäuden (Kirche Mengeringhausen wurde nicht kontrolliert). Die weitere Steigerung gegenüber den 1997 gemeldeten 57 Bp ist evtl. auf gezielte Suche zurückzuführen.

Weitere Brutzeitbeobachtungen, die auf Bruten in der Nähe hinweisen:

12.05.98	6	Mengeringhausen	(KSt)
26.05.98	5	Flechtdorf, Mülldeponie (Kolonie Korbach?)	(ERi)

Schlafplatz:

Sept. 97	ca. 50	Bad Arolsen, alter Friedhof	(AK)

Saatkrähe (Corvus frugilegus)

Zugbeobachtungen:

	Oktober			November			Februar		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	–	1	4	–	1	–	–	2	2
Exemplare	–	24	213	–	3	–	–	192	68
Maxima	–	24	92	–	3	–	–	190	37

	März		
Dekaden	1	2	3
Nachweise	–	1	4
Exemplare	–	24	213
Maxima	–	24	92

Wegzug: 19.1087 bis 11.11.97

Heimzug: 15.02.98 bis 27.03.98

Rabenkrähe (Corvus corone)

Folgende Trupps außerhalb der Brutzeit wurden gemeldet (ohne Schlafplätze):

Truppstärke	> 100	> 200	> 300	600
Nachweise	14	3	5	1

Der Trupp mit 600 Ex. wurde am 17.01.98 an der Mülldeponie Flechtdorf beobachtet.

Trupps (über 100 Ex.) in der Brutzeit (01.04. – 31.06.):

10.05.98	300	NSG Krautwiese am Wesebach, Giflitz	(EH)
26.05.98	300	Flechtdorf, Mülldeponie	(ERi)
13.06.98	121	Hemfurth, Wildpark	(WL)

Aus der Brutzeit wurden keine weiteren Trupps mit mehr als 100 Ex. gemeldet.

Schlafplätze:

Winter 97/98	bis zu 700	Kurpark Reinhardshausen	(HN)
30.07.98	250	Waldeck, Jugendherberge	(ERi)
30.07.98	130	Laisa	(HGS)

Besondere Beobachtung:

16.04.98	1 Ex. nimmt wiederholt tote Rotaugen von der Wasseroberfläche auf	Edersee bei Bringhausen	(FP)

Kolkrabe (Corvus corax)

In 4 Gebieten bestand Brutverdacht und aus 2 Gebieten liegen Brutnachweise vor (Forstämter Frankenau, Edertal, Bad Wildungen, Burgwald und Hatzfeld).
Aus 8 Gebieten abseits der für 1998 gemeldeten Brutgebiete liegen Brutzeitbeobachtungen vor (16.02 – 31.05.): Neudorf; Volkmarsen; Ottlar; Flechtdorf; Münden, Rodenbach; Hommershausen; Rosenthal; Ernsthausen.
Nachweise außerhalb der Brutzeit (01.06. – 15.02.) abseits der o. g. Gebiete: NSG Twistevorstau; Helsen; Willingen; Buhlen; Böhne; Bergheim; Reinhardshausen; Niederorke; Louisendorf; Somplar; Bromskirchen; Battenfeld
Bitte weiterhin alle Daten zur Dokumentation der Bestandsentwicklung melden!

Star (Sturnus vulgaris)

Winterbeobachtungen (Dez. bis Feb.; ab 100):

18.01.98	100	Geismar, Mülldeponie	(WB)
06.02.98	150	Geismar, Mülldeponie	(ERi)
16.02.98	150	Volkmarsen, Wandebach	(KSt)
27.02.98	200	Thalitter	(ERi)

Größere Schwärme (ab 1000):

06.03.98	ca. 1000	Rennertehausen	(ERi)
16.03.98	ca. 1000	Vasbeck, Totenberg	(MSo)
18.03.98	ca. 1000	Ellershausen	(ERi)
25.07.98	ca. 1000	Dorfitter, Marbeck	(PhB)

Schlafplatz NSG Krautwiese am Wesebach

31.08.97	ca. 3000	08.09.97	ca. 2000	
02. u. 04.09.97	ca. 4000	11.05.98	400 – 500	(FP, VL, WL)

Weitere Schlafplätze:

27.06.98	mind. 150	Herzhausen	(WL)
10.10.97	ca. 20.000	Korbach, Conti-Gelände	(WB)

Haussperling (Passer domesticus)

05.03.98	50	Rhadern; Nahrungssuche innerhalb eines Boxenlaufstalls	(ERi)

Feldsperling (Passer montanus)

Größere Trupps (ab 100):

17.10.97	100	Volkmarsen, Wandebach	(KSt)
28.02.98	150	Külte	(ERi)

Buchfink (Fringilla coelebs)

Größere Schwärme (ab 300):

15.03.98	300	Basdorf, auf gestreutem Mist	(ERi)
19.03.98	500	Marienhagen	(ERi)
19.03.98	mind. 500	Niederorke	(HN)
22.03.98	300	Reinhardshausen	(HN)

Bergfink (Fringilla montifringilla)

Größter Schwarm:

21.10.97	40	Ehringen	(VL)

Nur kleine Trupps; kein Mastjahr der Rotbuche.

Girlitz (Serinus serinus)

Keine größeren Trupps beobachtet

Grünling (Carduelis chloris)

Größere Trupps (ab 50):

26.10.97 u. 02.11.97	50	Volkmarsen, Wandebach	(KSt)

Bitte alle Winterdaten (01.12. – 28.02.) melden!

Stieglitz (Carduelis carduelis)

Winterbeobachtungen

	Dezember			Januar			Februar		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	2	2	3	2	–	1	–	1	–
Exemplare	21	8	6	8	–	13	–	16	–
Maxima	19	6	4	6	–	13	–	16	–

Größere Trupps (ab 50):

02.10.97	100	Reinhardshausen, nicht abgeerntetes Rapsfeld	(HN)
06.03.98	80 – 100	Ederaue Rennertehausen, Altgrasbestände	(ERi)
10.04.98	60	Bad Arolsen, Luisenthal	(MSo)

Erlenzeisig (Carduelis spinus)

Größere Trupps (ab 100):

21.12.97	250	Altwildungen	(FE)

Nur wenige, meist kleine Wintertrupps

Brutzeitbeobachtungen (01.05. – 30.06.):

14.05.98	3 Ex.	Dalwigksthal, Orketal , Abt. 41; Balz	(ERi)
14.05.98	1 Ex.	Niederorke, Orketal, Abt. 422	(ERi)
15.05.98	2 Ex.	Bad Wildungen, Kirchrödern	(FE)

Bluthänfling (Carduelis cannabina)

Größere Trupps (> 50):

28.09.97	100	Immighausen	(PhB)

Birkenzeisig (Carduelis flammea)

Bruten/ Bruthinweise 1998 (01.05. – 30.06.) :

1 Bp	Bad Arolsen, Domänenweg	(MSo)
mind. 1 Bp	Korbach, Hauer	(PhB, SFB)
1 Bv	Korbach, Kläranlage	(ERi)
1 Bv	Korbach, Bahnhof	(ERi)
1 Bv	Vöhl	(ERi)
1 Bv	Waldeck, Mauserwerk	(HSt)
1 Bv	Mehlen	(HSt)
1 Bv	Bergheim, Freilandlabor	(ERi, WL)
mind. 2 Bv	Reinhardshausen, Kurpark	(HSt, HN)
1 Bv	Bad Wildungen, Kurpark	(HN)
1 Bp	Edersee, Halbinsel Scheid	(ERi)
1 Bv	Herzhausen, Teichmann	(ERi)
1 Bp	Altwildungen	(FE)
14 Bp		

Zug- und Winterbeobachtungen:

	Oktober			November			Dezember		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	–	1	3	–	–	2	1	2	1
Exemplare	–	10	14	–	–	3	2	2	18
Maxima	–	10	8	–	–	2	2	1	18

	Januar			Februar			März		
Dekaden	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nachweise	3	2	3	–	1	1	–	3	4
Exemplare	11	21	39	–	15	9	–	17	5
Maxima	7	19	15	–	15	9	–	15	2

Als Winterfutter wurden Früchte (Samen) von Brennnessel, Rainfarn, Salixblüten und Lärchenknospen festgestellt (HSt)
(Vergl. Beitrag von LÜBCKE, S. 14)

Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra)

Größter Trupp:
23.03.98 19 Bottendorf, Forsthaus Theerhütte (MHo)
Kleine Trupps in allen Monaten.

Gimpel (Pyrrhula pyrrhula)

Größere Trupps (ab 10 Ex.):

Januar 1998	20	Basdorf	(M. ECKHARDT fide ERi)

Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes)

Nur wenige Winterdaten, meist nur Einzelvögel (keine Hainbuchenmast)

Schneeammer (Plectrophenax nivalis)

22.11.971mNSG Krautwiese am Wesebach, Giflitz (WL)

Goldammer (Emberiza citrinella)

Größere Trupps (ab 100):

04.01.98	100	Jungferhügel zw. Viermünden u. Schreufa	(KG, REn)
15.03.98	100	Basdorf; an gestreutem Mist	(ERi)

Rohrammer (Emberiza schoeniclus)

Bruten (Reviere) 1998 :

1	Billinghäuser Teiche	(ERi)
1	Volkmarsen, Wandebach	(KSt)
1	NSG Twistevorstau	(REc)
1	Feuchtbrache zw. Braunsen u. NSG Twistevorstau	(ERi)
1	Korbach, Marbeck	(PhB, REn, ERi)
1	Münden, Aartal	(KG, REn)
2	Eder bei Ederbringhausen	(ERi)
mind. 3	Edersee, Herzhausen	(GK, ERi)
1	Herzhausen, Kiesteiche Teichmann	(ERi)
1	Edersee, Bringhäuser Bucht	(AR)
1	Eder bei Bergheim	(WL)
12	Kiesgrubengebiet zw.Mehlen u. Giflitz	(WL)
1	zw. Wega u. Mandern	(WL)
1	Klärteich Wega	(WL, ERi)
2	Nempheteich südl. Frankenberg	(ERi)
1	südl. Rosenthal	(ML)
2	Ederaue Rennertehausen	(HGS)
1	Laisa, Letterbach	(ANTON f. HGS)
mind. 34 Reviere		

Größter Trupp:

07.03.98		
mind. 10	NSG Schwimmkaute bei Mehlen	(PhB)

Winterbeobachtungen:

09.11.97	1	Edersee, Bringhäuser Bucht	(FE)
02.12.97	1	Schlemmteich bei Mehlen	(HSt)
15.02.98	1	Korbach, Marbeck	(REn)

Ergebnisse der Zugplanbeobachtungen:

In der Wegzugperiode 1997 wurden in der Zeit vom 27.07. bis 26.10.97 an der Fuchskaule bei Immighausen (ENDERLEIN), außerdem zwischen dem 07.09. und dem 16.11.97 im Bereich des Flurteils Hettensee bei Altwildungen und an der Ense-Schule bei Bad Wildungen (EMDE) Zugplanbeobachtungen durchgeführt.

Die Tabellen enthalten Angaben über regelmäßig zu erwartende Vogelarten. Weitere Beobachtungen sind dem avifaunistischen Sammelbericht zu entnehmen.

Alpenstrandläufer (Foto: H. SCHLENSOG)

Bad Wildungen	September			Oktober			November			Summe
1996 (EMDE)	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Beobachtungs-dauer (Stunden)	7.30	0.30	5.00	6.00	12.45	13.30	3.15	1.30	-	45.00
Exkursionen	3	1	4	3	6	7	2	2	-	27
Mäusebussard	-	-	2	-	8	5	2	1	-	18
Sperber	1	-	-	3	20	20	3	-	-	47
Rotmilan	-	-	5	48	15	-	-	-	-	68
Ringeltaube	-	-	8	1	120	344	248	-	-	721
Amsel	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
Hohltaube	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Heidelerche	-	-	1	-	85	17	-	-	-	103
Feldlerche	-	-	-	21	541	291	50	8	-	911
Rauchschwalbe	8	-	13	4	1	-	-	-	-	26
Mehlschwalbe	14	-	12	-	3	-	-	-	-	29
Schafstelze	1	20	2	2	1	-	-	-	-	6
Gebirgsstelze	-	-	6	-	1	-	-	-	-	7
Bachstelze	-	-	-	19	22	9	1	-	-	51
Baumpieper	-	6	5	-	-	-	-	-	-	11
Wiesenpieper	-	-	7	42	54	84	6	-	-	193
Heckenbraunelle	-	-	4	1	3	1	1	-	-	9
Misteldrossel	-	-	1	-	1	1	-	-	-	2
Wacholderdrossel	-	-	-	29	100	353	258	19	-	759
Rotdrossel	-	-	-	-	11	4	26	7	-	48
Singdrossel	-	-	-	1	3	1	-	-	-	5
Hausrotschwanz	-	-	1	7	-	1	-	-	-	9
Blaumeise	-	-	-	-	3	6	-	-	-	9
Kohlmeise	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Goldammer	-	-	-	6	25	28	1	-	-	60
Rohrammer	-	-	-	-	14	9	1	-	-	24
Buchfink	2	3	56	671	656	335	51	4	-	1778
Bergfink	-	-	3	47	97	37	22	1	-	207
Girlitz	-	-	-	-	6	1	-	-	-	7
Grünling	-	-	-	9	11	9	9	3	-	41
Stieglitz	8	-	4	-	30	8	4	1	-	55
Erlenzeisig	-	-	14	-	78	18	-	-	-	110
Bluthänfling	7	-	1	22	60	2	-	-	-	92
Berghänfling	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4
Birkenzeisig	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3
Kernbeißer	-	-	-	-	9	3	-	-	-	12
Fichtenkreuzschnabel	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
Gimpel	-	-	-	-	-	1	-	20	-	21
Star	-	-	-	163	845	1500	54	3	-	2565
Dohle	-	-	-	-	20	99	-	-	-	119
Saatkrähe	-	-	-	-	33	2585	268	9	-	2895
Eichelhäher	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Dekadensumme	41	9	146	1096	2878	5774	1014	76	-	**11034**

Immighausen	Juli	August			September			Oktober			Summe
1996 (ENDERLEIN)	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Beobachtungsdauer (Stunden)	1	1,5	2,5	4,25	1,5	1	7	2,75	2,5	1	
Exkursionen	1	1	1	2	1	1	4	1	2	1	
Mäusebussard	–	–	–	9	3	2	17	–	–	–	
Sperber	–	–	–	1	1	1	4	1	1	–	
Rotmilan	1	–	4	12	4	3	19	–	7	–	
Turmfalke	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
Ringeltaube	–	–	–	–	–	–	–	–	2		
Hohltaube	8	5	1	–	–	–	1	–	2	–	
Turteltaube	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Heidelerche	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Feldlerche	–	–	–	–	–	–	214	94	40	–	
Rauchschwalbe	7	3	9	33	28	112	91	3	–	–	
Mehlschwalbe	–	–	71	57	23	52	1	–	–	–	
Uferschwalbe	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
Schafstelze	–	–	2	59	22	6	92	–	–	–	
Gebirgsstelze	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Bachstelze	–	3	1	1	–	–	72	71	17	1	
Baumpieper	–	8	8	79	5	1	24	–	–	–	
Wiesenpieper	–	–	–	–	–	–	110	167	22	3	
Heckenbraunelle	–	–	–	6	–	1	7	3	–	–	
Hausrotschwanz	–	4	–	–	–	–	8	7	1	–	
Misteldrossel	–	–	–	1	–	–	5	–	–	–	
Wacholderdrossel	–	1	–	–	1	–	6	28	33	–	
Rotdrossel	–	–	–	–	–	–	–	–	8	7	
Singdrossel	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	
Tannenmeise	–	–	–	23	–	3	2	–	–		
Kohlmeise	–	–	–	–	–	–	19	9	3	–	
Blaumeise	–	3	3	2	–	2	27	12	–	–	
Goldammer	–	–	–	–	-	–	–	–	4	–	
Rohrammer	–	–	–	–	–	–	9	7	4	5	
Buchfink	–	100	34	95	203	12	119	415	187	31	
Bergfink	–	–	–	–	–	–	10	98	51	–	
Girlitz	–	1	9	–	–	1	3	3	–	–	
Grünling	–	–	–	–	–	9	18	11	5	23	
Stieglitz	–	–	6	–	–	–	59	6	2	3	
Erlenzeisig	–	–	–	–	–	2	4	1	6	12	
Birkenzeisig	–	–	–	–	–	–	–	1	–	-	
Bluthänfling	23	18	1	4	56	17	270	67	150	6	
Kernbeißer	–	1	–	–	–	–	6	2	3	–	
Gimpel	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Feldsperling	–	–	–	–	-	–	6	32	43	30	
Star	134	–	–	–	454	14	41	255	278	251	
Dohle	–	–	–	2	–	158	5	4	3	–	
Saatkrähe	–	–	–	–	–	–	-	–	91	–	
Eichelhäher	–	–	–	–	2	19	16	8	–	–	
Fichtenkreuzschnabel	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Wintergoldhähnchen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Sommergoldhähnchen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Zilpzalp	–	–	–	–	–	8	2	1	–	–	
Fitis	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	
Amsel	–	–	–	–	–	5	1	2	–	–	
Dekadensumme	–	147	149	385	802	428	1292	1308	965	372	**5848**

Letztbeobachtung, Erstbeobachtung und Erstgesang ausgewählter Vogelarten

Vogelarten	Letztbeobachtung	Erstbeobachtung	Erstgesang
Mauersegler	08.09.97	17.04.98	–
Feldlerche	06.12.97	10.02.98	14.04.98
Uferschwalbe	13.10.97	28.04.98	–
Rauchschwalbe	05.10.97	29.03.98	–
Mehlschwalbe	26.09.97	13.04.98	–
Baumpieper	28.09.97	12.04.98	25.04.98
Wiesenpieper	23.11.97	01.03.98	–
Bergpieper	28.03.98	19.10.98	–
Schafstelze	13.10.97	20.04.98	–
Gebirgsstelze	–	15.02.98	15.02.98
Bachstelze	30.12.97	14.02.98	–
Heckenbraunelle	–	25.02.98	25.02.98
Nachtigall	–	–	17.04.98
Hausrotschwanz	17.11.97	20.03.98	05.04.98
Gartenrotschwanz	16.10.97	24.04.98	–
Braunkehlchen	03.10.97	22.04.98	–
Steinschmätzer	14.10.97	–	–
Amsel	–	–	(15.01.98) 15.02.98
Wacholderdrossel	–	–	–
Singdrossel	04.11.97	12.02.98	24.02.98
Rotdrossel	07.05.98	12.10.98	–
Misteldrossel	–	–	15.02.98
Feldschwirl	–	23.04.98	23.04.98
Sumpfrohrsänger	–	(02.05.98) 06.05.98	06.05.98
Gelbspötter	14.08.97	13.05.98	13.05.98
Klappergrasmücke	16.09.97	16.04.98	16.04.98
Dorngrasmücke	13.09.97	20.04.98	20.04.98
Gartengrasmücke	26.09.97	24.04.98	24.04.98
Mönchsgrasmücke	18.10.97	01.04.98	01.04.98
Waldlaubsänger	–	25.04.98	25.04.98
Zilpzalp	20.10.97*	13.03.98 (27.02.98*)	13.03.98
Fitis	21.09.97	02.04.98	02.04.98
Sommergoldhähnchen	04.10.97	23.03.98	23.03.98
Grauschnäpper	31.08.97	22.04.98	22.04.98
Trauerschnäpper	07.09.97	22.04.98	24.04.98
Neuntöter	23.09.97	03.05.98	–
Buchfink	–	–	13.02.98
Bergfink	14.04.97	27.09.98	–
Girlitz	05.10.97	04.04.98	08.04.98
Bluthänfling	06.12.97	13.02.98	–
Goldammer	–	–	15.02.98
Rohrammer	22.11.97	21.04.98	06.03.98

*Vergl. Beitrag von STIEBEL, S. 58

Extremdaten in Klammern!

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Vogelkundliche Hefte Edertal

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: 25

Autor(en)/Author(s): Emde Falko, Enderlein Ralf, Richter Eckhard, Schneider Heinz-Günther

Artikel/Article: Avifaunistischer Sammelbericht für den Kreis Waldeck-Frankenberg über den Zeitraum von August 1997 bis Juli 1998 112-184