

Kurze Mitteilungen

Bemerkenswerte Ringfunde aus dem Arbeitsbereich der Vogelwarte Radolfzell 1989–1991

von Rolf Schlenker

Mit diesem Bericht wird an die Zusammenstellung in „Die Vogelwarte“ 35, 1989, S. 159–162, angeschlossen. Ausgewählt wurden nur Ringfunde, welche in Bezug auf Zugrichtung, Lage des Fundgebietes oder das Alter des Vogels aus dem Rahmen des Üblichen fallen.

Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*)

GN 531 nestj. 05. 06. 82 Apetlon (47.45N 16.50E), Burgenland, Österreich (R. TRIEBL)
kontrolliert 10. 05. 91 Beltringharder Koog (54.34N 08.55E) Schleswig-Holstein
Auffallend nach Richtung und Entfernung (Dispersion?)

Sumpfläufer (*Limicola falcinellus*)

DH 84040 nicht diesj. 13. 05. 88 Tuzhisar (39.00N 35.50E), Türkei (STICHTING W1WO)
kontrolliert 19. 05. 91 Djonkoy (45.48N 34.30E), Krim
Der zweite Ringfund von dieser Art mit Radolfzell-Ring.

Türkentaube (*Streptopelia decaocto*)

ET 1919 diesj. 11. 09. 90 Forchheim (J. BEIER)
erlegt 15. 10. 90 Ahetze (43.24N 01.34W), Frankreich, 1193 km.
Fernfunde über solche Entfernungen gibt es nur wenige.

Rauhfußkauz (*Aegolius funereus*)

HF 25047 nicht diesj. ♀, Brutvogel, 29. 04. 90 Schnaittenbach (49.33N 12.00E) Oberpfalz (N. SCHAEFFER)
kontrolliert 20. 01. 91 Dolni Cermna (49.59N 16.34E), CSFR, 331 km.
Bemerkenswert nach Richtung und Entfernung.

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*)

Erneut eine Vielzahl von Wiederfinden im Winterquartier, dazu ein interessanter Hinweis zum Dispersionsverhalten der Jungvögel.

BZ 40142 nestj. 14. 05. 90 Gensingen (49.54N 7.56E), Rheinhessen-Pfalz (E. WOLFS & W. SCHNEIDER)
„tot“ 15. 01. 91 Bechloul (36.19N 04.04E), Algerien

BZ 40243 nestj. 31. 05. 90 Frei-Laubersheim (49.48N 07.54E), Koblenz (E. WOLFS)
gefangen 22. 10. 91 Nador (35.11N 02.56W), Marokko

BZ 40377 nestj. 22. 06. 90 Fuerfeld (49.46N 07.54E), Koblenz (W. SCHNEIDER & E. WOLFS)
gefangen 11. 10. 90 El Hamdania (36.36N 02.12E), Algerien

BZ 80024 nestj. 03. 05. 91 Neu-Bamberg (49.48N 07.56E), Koblenz (E. WOLFS)
gefangen 08. 11. 91 Midar (34.57N 03.32W), Marokko

BO 92445 nestj. 01. 07. 89 Nieder-Hilbersheim (49.55N 08.03E), Rheinhessen-Pfalz (V. HÄSELBARTH)
gefangen 08. 11. 89 Ras el Mar (35.08N 02.25W), Marokko

BT 97438 ♂, nicht diesj. 13. 07. 86 Roxheim (49.52N 07.49E), Koblenz (E. WOLFS & W. SCHNEIDER)
gefangen 10. 02. 89 El Biar (36.46N 03.02E), Algerien

BV 88823 diesj. 18. 09. 88 St. Ingbert (49.17N 07.07E), Saarland (L. HAYO)
gefangen 13. 01. 89 Draa Ben Khedda (36.44N 03.57E), Algerien

BX 30498 nestj. 17. 07. 88 Bad Kreuznach (49.51N 07.52E), Koblenz (W. SCHNEIDER & E. WOLFS)
kontrolliert 20. 06. 90 Schmiedefeld (50.37N 10.49E), Thüringen – wohl Brutvogel!

BX 70737 nestj. 07. 06. 89 Roxheim (E. WOLFS & W. SCHNEIDER)
gefangen 08. 02. 90 Berkane (34.56N 02.20W), Marokko

BZ 40814 ♂, nicht diesj. 26. 05. 90 Boos (49.47N 07.43E), Koblenz (W. SCHNEIDER)
gefunden 08. 11. 90 Al Hoceima (35.15N 03.56W), Marokko

BZ 42183 nestj. 01. 07. 90 Mandel (49.51N 07.46E), Koblenz (M. BUCHMANN & W. SCHNEIDER)
gefunden 18. 11. 90 Nador (35.11N 02.56W), Marokko

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)

BX 27952 nestj. 20. 06. 89 Schmellnricht (49.08N 11.20E), Oberpfalz (D. FRANZ)
kontrolliert 16. 12. 90 Ngulia (03.00S 38.13E), Kenia

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)

BZ 11222 diesj. 24. 07. 90 Illmitz (47.46N 16.48E), Burgenland (VOGELWARTE)
frischtot 20. 08. 90 Tobruk (32.05N 23.58E), Libyen
Zweiter Libyen-Fund der nach SE-ziehenden Population (s. „Die Vogelwarte“ 34, 1988, S. 337–343).

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

Von den Fernfunden (über 100 km) gingen:

1989 (n = 46) ~ 11% nach NW (W bis N)

1990 (n = 13) ~ 15%

1991 (n = 26) ~ 8%

Siehe dazu „Ökologie der Vögel“ 3, 1981, S. 314–318

Neuntöter (*Lanius collurio*)

DH 69390 nestj. 28. 06. 86 Erpfingen (48.21N 09.12E), Südwürttemberg (H. RENZ)
gefunden 02. 05. 91 Farasan Island (16.44N 41.50E), Saudi-Arabien
Unser bislang östlichster Fund.

Stieglitz (*Carduelis carduelis*)

BP 32431 nicht diesj. 12. 10. 90 Ebenthal (46.36N 14.22E), Kärnten (M. WOSCHITZ)
erlegt 05. 01. 91 Messolonghi (38.22N 21.27E), Griechenland
Einer unserer wenigen Griechenland-Funde.

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*)

CR 41140 diesj. 15. 07. 82 Illmitz (VOGELWARTE)
gefunden 15. 08. 88 Damaskus (33.30N 36.19E), Syrien
Der erste Weistrecken-Fund aus unserem Arbeitsbereich in SE-Richtung

Anschrift des Verfassers: Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie, Vogelwarte, Schloß,
D-7760 Radolfzell-Möggingen

Schriftenschau

Dinse, V. (1991): Über den Heimzug von Kleinvögeln in Hamburg. Eine Auswertung von Fangdaten im Rahmen des Mettnau-Reit-Illmitz-Programms. *Hamburger avifaunistische Beiträge* 23. 125 S., mit 9 Photos. ISSN 0340-5168 (Zu beziehen über H. Hudeczek, Außenschlag 15, 2055 Wohltorf).

Fünf Jahre lang wurde von Volker Dinse und seiner ornithologischen Arbeitsgruppe ein standardisiertes Fang- und Beringungsprogramm für heimziehende Singvögel im Naturschutzgebiet ‚Reit‘ in Hamburg durchgeführt. Dort befindet sich eine der drei großen Anlagen zum Fang von Singvögeln in Deutschland, die von der Vogelwarte Radolfzell im Rahmen des MRI-Programms (Berthold *et al.* 1991, Vogelwarte 36, Sonderheft) seit Jahren im Herbst betrieben werden. Die vorliegende Studie umfaßt 5800 Erstfänge sowie zusätzlich Kontrollfänge von 35 Vogelarten. Untersucht wurden artspezifischer Durchzug, Verweildauer, Anteil verweilender Vögel und biometrische Daten wie Körpergewicht und -größe. Diese Daten wurden – z. T. nach Geschlechtern getrennt – im saisonalen Verlauf graphisch und als Populationsmittelwerte dargestellt. Dinse vergleicht und diskutiert seine Ergebnisse mit den auswertbaren Frühjahrsfangdaten weiterer 15 Stationen in Europa und N-Afrika. Für manche der dargestellten Langstreckenzieher (Teich-, Schilf- und Sumpfrohrsänger, Gelbspötter, Gartenrotschwanz, Dorn-, Klapper- und Gartengrasmücke, Fitis und Trauer- und Grauschnäpper) liegen nun mit Ausnahme von 25 Tagen in der Brutzeit über die ganze Anwesenheitsperiode in Norddeutschland Fangdaten vor. Von zehn Mittelstrecken- und Teilziehern (Zaunkönig, Heckenbraunelle, Rotkehlchen, Amsel, Singdrossel, Mönchsgrasmücke, Zilpzalp, Blau-, Beutelmeise und Rohrammer) liegen ebenfalls umfangreiche Erstfangdaten vor. Von weiteren 12 Kleinvogelarten liegen Daten von weniger als 25 Vögeln vor. Auf die Fernfunde beringter Vögel, die Anhaltspunkte über Herkunft und Zugrichtung der rastenden

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Vogelwarte - Zeitschrift für Vogelkunde](#)

Jahr/Year: 1991/92

Band/Volume: [36_1991](#)

Autor(en)/Author(s): Schlenker Rolf

Artikel/Article: [Kurze Mitteilungen: Bemerkenswerte Ringfunde aus dem Arbeitsbereich der Vogelwarte Radolfzell 1989-1991 329-330](#)