

Meldungen aus den Beringungszentralen

Wolfgang Fiedler¹, Ulrich Köppen² & Olaf Geiter³

¹ Beringungszentrale an der Vogelwarte Radolfzell, MPI Ornithologie, Schlossallee 2, D-78315 Radolfzell, e-Mail: ring@orn.mpg.de Internet: http://vogelwarte.mpg.de

² Beringungszentrale Hiddensee, LUNG Mecklenburg-Vorpommern, Badenstr. 18, D- 18439 Stralsund, e-Mail: beringungszentrale@lung.mv-regierung.de Internet: http://www.lung.mv-regierung.de/beringung

³ Beringungszentrale am Institut für Vogelforschung „Vogelwarte Helgoland“, An der Vogelwarte 21, 26386 Wilhelmshaven, e-Mail: ifv.ring@ifv.terramare.de Internet: http://www.vogelwarte-helgoland.de

Ringfunde – herausgepickt

Diese kleine Auswahl an Ringfunden mit Bezug zu Deutschland oder Österreich soll über die interessanten, vielfältigen und teilweise auch überraschenden oder ungewöhnlichen Einblicke informieren, die heute noch durch die Vogelberingung gewonnen werden. Da die Angaben auf das Wesentliche reduziert wurden, sind diese Funddaten für die weitere Auswertung nicht in allen Fällen geeignet. Interessenten, die Ringfunde für Auswertungen verwenden möchten, wenden sich bitte an eine der drei deutschen Beringungszentralen.

Radolfzell A.....3324 Weißstorch *Ciconia ciconia*

beringt als Nestling am 25.6.2004 in Steppach / Oberfranken (E. Lenz), lebend beobachtet am 15.4.2005 in Tzaneen, Republik Südafrika. Während ein nicht unerheblicher Teil der fränkischen Störche offenbar auf der Westroute wandert, erreichte dieser Vogel seinen Aufenthaltsort im Alter von gut einem dreiviertel Jahr in 8405 km Entfernung vom Beringungsort auf der Ostroute.

Helgoland3X709 Weissstorch *Ciconia ciconia*

dieser Storch wurde in der Storchepflegestation Berne-Glütting, Niedersachsen, handaufgezogen und dort am 07.07.2005 nestjung von U. Hilfers beringt. Am 13.11.2005 wurde **3X709** 4506 km entfernt in den Hadeja-Nguru-Wetlands, Nigeria, im Rahmen einer lokalen Studie gefangen und in Pflege genommen. Nach zwei Wiederfinden 1963 bzw. 1978 ist dies erst der dritte Wiederfund eines Helgoland-Weisstorches aus Nigeria. Dieser Wiederfund zeigt, dass zumindest ein Teil der alljährlich ausgewilderten Störche weit in den Süden zieht. Das angeflogene Gebiet scheint aber eher untypisch für norddeutsche Störche zu sein.

Helgoland ...4011861 Großer Brachvogel

Numenius arquata

Ein über 25 Jahre alter Großer Brachvogel wurde am 20.02.06 frisstot in Gwithian (Cornwall/Groß-Britannien) gefunden. Er war Opfer eines Greifvogels geworden. Beringt wurde dieser Brachvogel als Nestling am 09.06.1981 in der Nähe von Hoogstede/Niedersachsen durch Manfred Kipp. Die Entfernung zwischen Beringungs- und Fundort beträgt 897 km.

Helgoland 4112832 Silbermöwe *Larus argentatus*

Diese am 10.10.1992 als diesjährig auf Helgoland beringte Silbermöwe erbrachte einen recht ungewöhnlichen Wiederfund weit nördlich des üblichen Aufenthaltsgebiets von Nordsee-Silbermöwen. Im Herbst 2002 (die Meldung erfolgte erst 2005) ging diese Möwe in der Nähe von Spitz-

bergen (Svalbard) Fischern von den Färöer-Inseln ins Netz. Als willkommener Beifang wurde sie getötet und verzehrt. Dieser Fund zeigt, dass auch einzelne Silbermöwen weit verstreichen und weite Strecken über das offene Meer fliegen. Möglicherweise geschieht dies in Folge von Fischkuttern. Es gibt bisher nur sehr wenige Wiederfunde beringter Silbermöwen aus den Gewässern nördlich des europäischen Festlands.

Helgoland 4198988 Steinkauz *Aegolius funereus*

beringt als Nestling am 17.06.93 in Stadum, Schleswig-Holstein, von P. Finke. Fast zwölf Jahre später, am 14.05.2005, wurde diese Eule frisstot als Straßenverkehrsoffer am Beringungsort gefunden. Für diese kleine Eulenart sind zwölf Jahre ein sehr hohes Alter. Bisher wurden nur zwei weitere Steinkäuze mit Helgoland-Ringen im zwölften Lebensjahr wiedergefunden.

Radolfzell B2E...2175 Teichrohrsänger

Acrocephalus scirpaceus

beringt als flügger Vogel am 23.9.2005 in Hartberg / Steiermark (M. Tiefenbach), wiedergefangen durch einen Beringer am 24.9.2005 in Koper Bonifika, Srmin, Slovenien (Mitt. Beringungszentrale Ljubljana). Zwischen beiden Fangereignissen liegt ein Tag bzw. 255 km.

Helsinki3389H Schilfrohrsänger

Acrocephalus schoenobaenus

Beringt als flügger Vogel am 25.9.2005 in Vantaa, Uusimaa, Finnland (Mitt. Beringungszentrale Helsinki), lebend gefangen am 12.10.2005 in Radolfzell am Bodensee (Beringungsstation Mettnau). Die Fangorte liegen 1730 km voneinander entfernt. In den 17 Tagen hat der Vogel seine Depotfettmenge von Klasse 3 auf Klasse 1 (Kaiser-Skala) und die Körpermasse von 11,7 auf 11,1 g reduziert.

Helgoland ..81444986 Kernbeißer ♂

Coccothraustes coccothraustes

Finkenvögel werden selten älter als 10 Jahre. Der älteste Kernbeißer mit Helgoland-Ring wurde mindestens 12 Jahre und 7 Monate alt. Helgoland 81444986 kommt ihm recht nahe. Er wurde am 18.05.96 in Prohnsdorf (Schleswig-Holstein) als adult von Heinz Schwarze beringt und am 01.02.2006 von einem Beringer in Pandrup (Brønderslev/Nordjütland/DK) kontrolliert. Damit erreichte dieser Kernbeißer mindestens ein Alter von 10,5 Jahre und wurde 333 km nördlich vom Beringungsort wiedergefunden.