

WIENER

Entomologische Monatschrift.

Redaction und Expedition:
Landstrasse Nr. 91, 2ten Stock.

In Commission bei
Carl Gerold's Sohn, Stadt Nr. 625.

Nr. 6.

I. Band.

December 1857.

Verzeichniss der im Jahre 1853 in der Gegend von Fiume gesammelten Schmetterlinge.

Von Joseph Mann.

(Fortsetzung und Schluss.)

Aglossa Pinguinalis L. Juni; an Häusern und in alten Weinhütten,
nicht selten.

Cuprealis H. Im Mai und Juni einzeln an Gebäuden gefunden.

Hypotia Corticalis S. V. Juli, bei Groming aus Salbei gescheucht.
Sehr selten.

Asopia Farinalis L. Mai; an Gebäuden, auch im Zimmer, nicht selten.

Regalis S. V. Im Mai einzeln aus Hecken beim Pulverthurm und
bei Volosca gescheucht.

Rubidalis S. V. Juni, beim Pulverthum und bei Draga aus Eichen-
gebüsch gescheucht.

Glaucinalis L. Juni, bei Volosca u. Castua aus Hecken gescheucht.

Pyrallis Netricalis Hb. Juni, bei Buccari an Berglehnen gefangen.

Angustalis H. Juli, auf Berglehnen.

Honestalis Tr. auf Tersatto in Poderen im Juni vorkommend.
Ist selten.

Hercyna Pollinalis S. V. Mai, auf Tersatto, bei Buccari, Groming etc.
nicht selten.

Atralis Hb. Mai, bei Draga und Orechoviza auf *Salvia officinalis*
geflogen.

Botys Albofascialis Tr. Mai, beim Pulverthurm.

Octomaculalis L. Juni. In Gebüsch nicht selten um Fiume, in
Istrien.

Anguinalis H. Mai, nicht selten.

Botys Cingularis L. Mai und Juni, nicht selten.

Pygmaealis Dup. Mai; einige ober Draga auf *Salvia officinalis* gefangen.

Punicealis S. V. Mai und Juni, gemein.

Purpuralis L. Im April und Juni, auf Huthweideplätzen zwischen Gebüsch.

Cespitalis S. V. April bis Juli, überall häufig auf Berglehnen und Huthweiden.

Aenealis H. Mai, auf den Wiesen bei Draga.

Aeruginalis Hb. In den Poderen auf dem Kalvarienberge.

Turbidalis Tr. Mai; bei Clana und auf dem Kalvarienberge bei Fiume.

Flaveolata Hufn. (*Patealis* S. V.) Juni, einzeln in Poderen auf Draga und dem Kalvarienberge.

Margaritalis S. V. Juni, auf dem Kalvarienberge und beim Pulverthurm Abends geflogen.

Forficalis L. Juni, aus Hecken gescheucht.

Sticticalis L. Juli, bei Groming an Waldrändern.

Cinctalis T. Mai und Juni. Berghuthweiden.

Flavalis S. V. Juni; beim Pulverthurm auf Berghuthweideplätzen Abends geflogen.

Hyalinalis Hb. Juni, bei Castua aus Hecken gescheucht.

Verticalis L. Juni, Abends häufig um *Parietaria officinalis*.

Aurantiacalis F. R. Juni, bei Draga in Poderen aus Hecken gescheucht.

Pallidalis Hb. Bei Martinischza im Juni auf *Verbascum* gefangen.

Urticalis L. Juni, überall gemein.

Limbalis S. V. Juli, beim Pulverthurm einige gefangen.

Polygonalis S. V. Juli, bei Castua in Poderen auf *Spartium* gefangen.

Silacealis H. Juni auf dem Kalvarienberge zwischen Disteln häufig Abends geflogen.

Sanguinalis H. Im Juni einzeln bei Castua, Kameniak u. Porto Ré.

Virginalis Dup. Mai; bei Martinischza und beim Pulverthurm. Die Raupe lebt in den Herzblättern der *Salvia officinalis*.

Pulveralis Hb. Mai, bei Draga auf Wiesen, und an Waldrändern einzeln.

Numeralis Hb. Mai, bei Hraszt einige gefangen.

Olivalis S. V. Juni, auf dem Monte maggiore.

Prunalis S. V. Juni, beim Pulverthurm aus Dornhecken gescheucht.

Botys Putralis Hb. Juni und Juli, überall aus Dornhecken, besonders aus *Rhamnus paliurus* gescheucht.

Ferruginalis Hb. Mai, aus Gebüsch gescheucht.

Interpunctalis Hb. Juni, in den Poderen in Istrien an der Strasse nach Volosca gefunden.

Testacealis Z. Juni, bei Buccari u. Zengg, aus Hecken gescheucht.

Fuscalis S. V. Juni, auf Berghuthweiden, nicht selten.

Terrealis Tr. Juni, bei Groming aus Gebüsch gescheucht.

Sambucalis S. V. Mai und Juni, an Mauern.

Verbascalis S. V. Mai und Juni, auf dem Kalvarienberge in Poderen geflogen.

Rubiginalis Hb. Mai, beim Pulverthurm in Gebüsch.

Politalis S. V. Mai, bei Martinischza einzeln an Berglehnen.

Stramentalis Hb. Juni, bei Draga und Kameniak.

Frumentalis L. Juni, auf dem Kalvarienberge in Poderen.

Sophialis F. Mai und Juni, an der Louisenstrasse an Felsenwänden nicht selten.

Cynaeda Dentalis Hb. Juni, auf Huthweiden.

Stenopteryx Hybridalis Hb. April und Juni, überall häufig.

Stenia Carnealis Tr. Juni, einige aus Hecken bei Zengg gescheucht.

Ophialis Tr. Mai, zwei Stück beim Pulverthurm gefangen.

Brugieralis D. Juni, beim Pulverthurm aus *Rhamnus paliurus*-Hecken gescheucht.

Punctalis F. Juli, einzeln aus Hecken gescheucht.

Diasemia Literalis L. Mai, überall häufig auf Huthweiden und an Berglehnen.

Nymphula Potamogalis Tr. Auf den nassen Wiesen im Draga-Thal geflogen.

Nymphaealis L. Juni, auch im Draga-Thal geflogen.

Agrotera Nemoralis S. V. Mai und Juni, aus Gebüsch gescheucht.

Endotricha Flammealis S. V. Juni und Juli, um Weissdornhecken nicht selten.

Chloeophora Quercana S. V. Juli, beim Pulverthurm aus Eichengebüsch gescheucht.

Halias Prasinana L. Juni, bei Volosca und Castua von Eichen abgeklopft.

Earias Clorana S. V. Mai, bei Draga auf Weiden.

Sarothripa Revayana Var. *Undulana* Hb. und *V. Dilutana* Hb. Mai, auf Eichen.

- Teras Tristana* H b. Juni; beim Pulverthurm aus Laubholzhecken
gescheucht.
- Abildgaardana* F. Juni; um Weissdornhecken bei Fiume und in
Istrien.
- Permutatana* D u p. Juni, einzeln beim Pulverthurm aus Weiden-
dornsträuchen gescheucht.
- Boscana* F. (*Cerussana* H b.) Juni, auf Ulmen.
- Asperana* S. V. Juli, bei Groming an Eichen.
- Favillaceana* H b. Juli, an Ulmenstämmen.
- Quercinana* Tr. Mai, auf Tersatto und bei Buccari von Eichen
gescheucht.
- Ferrugana* S. V. Im April; bei Volosca überwinterte Exemplare
aus Eichengebüsch gescheucht.
- Amphysa Gerningana* S. V. Juni, bei Volosca auf Berglehnen.
- Oenectra Pilleriana* S. V. Juni, auf dem Kalvarienberge an Salbei
gemein. Die Raupe sehr häufig in zusammengespinnenen Blättern
dieser Pflanze.
- Tortrix Ribeana* H b. Juni, in Gebüsch.
- Cerasana* H b. Juni, in Gebüsch.
- Cinnamomeana* Tr. Mai, bei Volosca zwei Stück aus Brombeerhecken
gescheucht, selten.
- Heparana* S. V. Mai und Juni, in Eichengebüsch.
- Ameriana* L. Juni, bei Groming einige a. Haselsträuchen gescheucht.
- Xylosteana* Clerk. Juni, auf Eichen.
- Laevigana* S. V. Mai und Juni, in Dornhecken.
- Sorbiana* H b. Juni, bei Groming einige von Eichen abgeklopft.
- Centrana* H. S ch. Juni, bei Draga Abends um Disteln geflogen.
- Diversana* H b. Juni, bei Volosca in Gebüsch.
- Dumicolana* Z. Juni, bei Draga auf Eschen.
- Pronubana* H b. Juni, bei Zengg aus Hecken gescheucht.
- Viridana*, L. Juni, häufig Abends um Eichen, besonders in den
Poderen bei Martinischza.
- Leachiana* L. Juni, einige von Eichen abgeklopft.
- Löfflingiana* L. Mai und Juni, auf Eichen.
- Forskaeliana* L. Im Juni, bei Tersatto in Ahorngebüsch.
- Bergmanniana* L. Juli, auf wilden Rosen.
- Conwayana* F a b. (*Hofmanseggana* H b.) Juni, beim Pulverthurm
aus Laubholzhecken gescheucht.
- Holmiana* L. Mai, auf Weissdorn.

Tortrix Unifasciana Dup. Mai, aus Ligusterhecken gescheucht.

Consimilana Hb. Juni, einzeln beim Pulverthurm aus Gebüsch gescheucht.

Gnomana L. Juli, bei Clana in Dorngebüsch.

Strigana Hb. Mai bis Juli, überall auf Huthweiden u. an Berglehnen.

Viburnana S. V. Mai, in den Gebüsch an der Strasse nach Volosca.

Ochreana S. V. Im Mai u. Juni, auf dem Kalvarienberge nicht selten.

Rusticana Tr. April und Mai, auf Berglehnen.

Bifasciana H. Im Juni, bei Abbuzia in Istrien einige aus Dornhecken gescheucht.

Artificiana F. R. Im Mai um Fiume aus Brombeerhecken gescheucht.

Grotiana F. Im Juni und Juli bei Fiume aus Brombeerhecken und Eichengebüsch gescheucht.

Sylvana Tr. Mai, bei Tersatto einige gefangen.

Tesserana S. V. Mai bis Juli, nicht selten auf Berglehnen und Huthweiden.

Xanthosetia Hamana L. Juni, bei Clana.

Zoegana L. Juni, beim Pulverthurm und bei Groming an Berglehnen.

Aphelia Gouana L. Juni, am Monte maggiore, ober der Poststrasse auf sumpfigen Lehnen geflogen.

Argyrolepis Baumanniana. Mai bis Juli, überall angetroffen.

Amiantana Hb. Im Mai, einzeln ober Castua an Berglehnen.

Rubigana Tr. Juni, an den Wiesenrändern im Dragathale einzeln gefunden.

Limbatana F. R. Juli, beim Pulverthurm einige aus Rosenhecken gescheucht.

Trachysmia Rigana Sodoffsky. April und Juni an Berglehnen.

Argyroptera Lathoniana Hb. Mai und Juni, beim Pulverthurm auf Huthweiden.

Coccyx Zephyrana Tr. April bis Juni, auf Huthweiden und an Berglehnen überall angetroffen.

Sanguinana Tr. Mai, zwei Stück beim Pulverthurm gefangen.

Flagellana Dup. Mai und Juni, einzeln auf Berglehnen gefunden.

Cochylis Callosana H. Sch. Mai; beim Pulverthurm in einem Gebüsch Abends fliegend gefangen.

Smeathmanniana F. Beim Pulverthurm im Juni auf Berglehnen.

Fabriciana Hb. Juni, bei Tersatto in Poderen Abends fliegend.

Tischerana F. R. Mai, Abends auf Huthweiden geflogen.

Cochylis Verecundana F. R. Juni, bei Draga zwei Stück aus Brombeerhecken gescheucht.

Impurana Mann. Zool. bot. Verein 1855. Pag. 553. Juni, einzeln beim Pulverthurm an Mauern gefunden.

Jucundana Tr. Juni, a. d. Kalvarienberge in Poderen vorkommend, selten.

Rubellana Hb. Mai, nicht selten an Berglehnen.

Ambiguella Hb. Mai und Juni, um Weingärten.

Manniana F. R. Mai, bei Draga an Wiesenrändern.

Dubitana Hb. Im Juni bei Draga aus Hecken gescheucht.

Purgatana Tr. Im April und Mai, auf Berglehnen um *Artemisia* schwärmend gefangen.

Posterana Z. Mai und Juni, auf Huthweiden um Disteln.

Schreibersiana Fröl. Mai, aus Ulmenhecken gescheucht.

Phtheochroa Rugosana F. R. Juni, an Zaun- und Mauerhecken bei Volosca gefangen.

Penthina Pruneticotana Z. April, beim Pulverthurm aus Dornhecken gescheucht.

Pruniana Hb. Mai und Juni, häufig auf Schlehenhecken.

Variegana S. V. Juni, um Weissdornhecken, nicht selten.

Ochroleucana Hb. Juni und Juli, beim Pulverthurm von Rosenhecken abgeklopft.

Sellana Hb. April, auf Berglehnen.

Botrana S. V. (*Vitosana* Jacq.) Mai, nicht selten um Weinstöcke.

Permixtana Hb. Im Juni zwei Stück beim Pulverthurm gefangen.

Salicana S. V. Juni, bei Draga auf Weiden.

Rhodophana H. Sch. Mai, hinter dem Pulverthurm einige auf einer Huthweide gefangen.

Roborana S. V. Juni, um Schlehenhecken.

Thapsiana Z. Juni, einige auf Tersatto gefangen.

Suffusana Z. Juni, aus Dornhecken gescheucht.

Ocellana S. V. Mai, nicht selten in Laubgehölzen.

Dealbana Fröhl. Mai, bei Tersatto an Ulmenstämmen.

Cretaceana Hb. Im Juni, hinter dem Pulverthurm einige in Eichengebüsch gefangen.

Trifasciana Z. April und Mai, beim Pulverthurm auf Huthweiden.

Paedisca Similana S. V. Mai, bei Draga.

Scutulana S. V. Mai, auf Huthweiden um Disteln.

Brunnichiana S. V. Mai u. Juni, bei Martinischza u. Hraszt gefangen.

- Paedisca Earsiana* Z. Juni, auf dem Monte maggiore.
- Sublimana* H. S ch. Juni; eben daselbst.
- Obscurana* H. S ch. Mai, bei Volosca in Gebüsch.
- Hepaticana* Tr. Juni; Monte maggiore.
- Clirosana* Z. in lit. zwölf Stück im Juni auf dem Monte maggiore gefangen.
- Graphana* Hb. im Mai bei Tersatto unter dem alten Schlosse auf Graslehnen gefangen.
- Delitana* F. R. Mai, bei Groming auf Berghuthweiden.
- Quadrana* Hb. Mai, bei Draga einzeln an Waldrändern.
- Cuphana* Z. April, häufig auf Huthweiden und Grasplätzen in der ganzen Gegend.
- Quaggana* Man n. Juni, beim Pulverthurm auf einer Huthweide einzeln angetroffen.
- Lithoxytana* Fr ö l. Mai, an Ulmenstämmen.
- Kochiana* H. S. Im Mai einige Abends beim Pulverthurm auf Berglehnen gefunden.
- Penkleriana* S. V. Juni, bei Hraszt um Haselgebüsch nicht selten.
- Corticana* Hb. Juli, bei Groming an Eichenstämmen, nicht selten.
- Profundana* S. V. Juni, bei Groming an Eichenstämmen.
- Phoxopteryx Lanceolata* Hb. Mai, auf den Wiesen im Draga-Thal häufig.
- Unguicana* S. V. Mai, bei Kameniak.
- Currana* Z. Mai, beim Pulverthurm a. Weissdornhecken gescheucht, selten.
- Comptana* Fr ö l. April, überall auf Berglehnen und Huthweiden.
- Badiana* S. V. Mai, einzeln von Waldrändern und aus Hecken gescheucht.
- Derasana* Hb. Juli, in jungen Eichengebüsch.
- Siculana* Hb. April und Juni, um Dornhecken überall häufig.
- Mitterpacheriana* S. V. Juni, in Eichengebüsch.
- Upupana* Tr. Mai, einige bei Draga gefangen.
- Naerana* Hb. Juni, einzeln, in Gebüsch.
- Achatana* S. V. Juni, aus Dornhecken gescheucht.
- Aspis Udmanniana* L. Im Mai die Raupen häufig auf Brombeeren, Falter im Juni.
- Sericoris Lacunana* S. V. Mai und Juni, in jungen Gebüsch, nicht selten.
- Urticana* Hb. Juni, im Draga-Thal, nicht selten.

Sericoris Conchana H b. Juni; auf dem Bergjoch des Monte maggiore selten.

Capreolana H. S. Juni; bei Volosca und Castua in Gebüsch gefunden.

Striana S. V. Mai und Juni; in den Poderen an der Strasse nach Volosca, häufig.

Bipunctana H b. Juni; auf dem Monte maggiore an *Erica* geflogen.

Rurestrana H. Sch. Mai; beim Pulverthurm und Martinischza auf Berglehnen.

Micana H b. Juni; an der Strasse nach dem Monte maggiore auf Berglehnen einzeln.

Flavipalpna H. Sch. Juni; beim Pulverthurm und bei Hraszt auf Berglehnen.

Cespitana H b. April bis Juli; überall häufig.

Zinckenana Tr. Juni; einige auf dem Monte maggiore gefangen.

Orthotaenia Trifoliana H b. Mai, hinter dem Pulverthurm einzeln in Poderen.

Rhyacionia Hastiana H b. Juni, bei Clana, einzeln.

Carpocapsa Pomonana L. Im Mai u. Juni an Gebäuden u. in Zimmern gefangen.

Splendana H b. Juni, bei Groming an Baumstämmen.

Fagiglandana H e y d. Juni, im Buchenwald bei Clana einz. gefunden.

Arcuana L. Mai, bei Martinischza und Lovrana, nicht selten.

Woerberiana S. V. Mai und Juni; in Poderen an Pflirsichbäumen gefunden.

Grapholitha Citrana H b. Juni, einzeln an Berglehnen gefangen.

Jaceana Z. Juni, auf Huthweiden des Kalvarienberges.

Albidulana H. Sch. Juni, b. Castua auf Huthweiden um *Artemisia*.

Aspidiscana H b. Mai, auf Berglehnen.

Coecimaculana H b. Mai, auf Berglehnen.

Hypericana H b. Juni, bei Kameniak, nicht selten.

Zachana Tr. Mai, überall auf Grasplätzen, in jungen Gehölzen und Huthweiden.

Gemmiferana Tr. Mai, hinter dem Pulverthurm auf Huthweiden Abends um *Artemisia* einzeln vorkommend.

Nebritana Tr. Mai, in jungen Gebüsch um Eschen geflogen.

Fulvifrontana Z. Mai, einzeln auf Cornelkirschen-Sträuchen.

Vigeliانا H. S. (*Rotundana* F. R.) Mai, auf Eschen.

Plumbagana Tr. auf den Wiesen bei Draga u. Orechoviza geflogen.

Grapholitha Germana Fröl. Mai, auf dem Kalvarienberge in Poderen.

Coecana H. S. Mai, bei dem Grenzgebäude des Fiumanergebietes gegen Volosca auf einer grasreichen Huthweide zwischen Gebüsch geflogen.

Plumbatana Z. April, einzeln auf unbelaubten Eichen geflogen.

Scopariana Hb. April, um Wachholdersträucher bei Sonnenuntergang geschwärmt.

Interruptana H. S. Mai, bei Martinischza a. Wachholdersträuchern gescheucht.

Gundiana Hb. Mai, aus jungen Gehölzen gescheucht.

Leplasteriana Curt. Im April u. Mai a. Saubohnen vorkommend; sonnt sich gern auf der Oberseite der Blätter.

Schrankiana Fröl. (*Loderana* Tr.) Mai, um Schlehenhecken und junge Eichen fliegend.

Jungiella L. Mai, auf dem Kalvarienberg in Poderen vorkommend.

Fissana Fröl. (*Diffusana* F. R.) Juni, bei Porto Ré aus Gesträuchen gescheucht.

Dorsana Hb. Mai, hinter dem Pulverthurm einzeln in Poderen gefangen.

Pallifrontana Z. Mai, einige im Draga-Thal um Hecken gefangen.

Coronillana Z. Juni, bei Volosca und Fianona aus Hecken gescheucht.

Petiverella L. Mai und Juli, auf Huthweiden und Berglehnen, nicht selten.

Alpinana Tr. Juni, bei Clana und Orechowiza.

Motacillana Tr. Mai, bei Clana im Buchenwald einige gefangen.

Gallicolana Heyd. April, an Eichenstämmen.

Succedana Fröl. Mai, auf Berglehnen vorkommend.

Amygdalana Schmidt. Mai und Juli, in Eichengebüschen.

Incisana F. R. April und Mai, auf Eschen beim Pulverthurm.

Rhediella L. April und Mai, beim Pulverthurm auf Weissdornsträuchern.

Funebrana Tr. Mai, bei Martinischza aus Dornhecken gescheucht.

Hedya Festivana Hb. Juni, in jungen Eichengebüschen hinter dem Pulverthurm und bei Buccari vorkommend.

Sciaphila Hybridana H. Mai, in den Poderen nach Martinischza um Eichen fliegend.

Oppressana Tr. Mai, an Pappelstämmen in und bei Fiume häufig.

Virgaureana Tr. Juni, bei Draga aus Hecken gescheucht.

Sciaphila Minusculana Z. (*Minorana* M. i. l.) Juli; aus Ulmengebüsch gescheucht.

Wahlbomiana L. Im Juni um Gebüsch gefangen; die Raupe lebt auf niederen Pflanzen.

Communana H. Sch. April, bei Tersatto an Baumstämmen.

Pasirana Hb. Juni, um Ulmenhecken fliegend.

Abrasana F. R. Mai und Juni, auf Ulmen geflogen.

Terreana Tr. Mai; beim Pulverthurm um Wachholdergesträuch einige gefangen.

Insolatana H. Sch. (*Luridalbana* Mann in. lit.) Juni, in den Poderen bei Tersatto und Martinischza auf Salbei. Die Raupe lebt im Mai zwischen zusammengespinnenen Blättern dieser Pflanze.

Fragosana Z. Im Juni, bei Tersatto unter *Insolatana* gefangen.

Nubilana H. Juni, um Schlehenhecken nicht selten.

Oxyacanthana H. Sch. Juni, auf Weissdornhecken.

Musculana Hb. Juni, um Eichengebüsch.

Penziana Hb. Juni, auf der Strasse nach dem Monte maggiore an Mauern gefunden.

Tortricodes Punctulana S. V. April, bei Martinischza einige gefangen.

Cheimatophila Hyemana Hb. April; bei Fiume aus Eichengebüsch gescheucht.

Chilo Forficellus Thbg. Juni, bei Groming an einem Sumpfe gefangen.

Crambus Dumetellus Hb. Juni, im Dragathal u. b. Kameniak nicht selten.

Pratorum F. Mai und Juni, nirgends selten.

Pascuellus L. Mai und Juni, auf Berglehnen und Huthweiden nicht selten.

Silvellus Hb. Juni, auf Wiesen und im Draga-Thal.

Falsellus S. V. Juli, bei Fiume an Mauern gefunden.

Pinetellus Clerk. Juni, aus Gebüsch gescheucht.

Margaritellus Hb. Juni; auf dem Bergjoch des Monte maggiore in Istrien einige gefangen.

Culmellus L. Juni, auf dem Kalvarienberge in Poderen nicht selten.

Hortuellus Hb. Juni; auf dem Bergjoch des Monte maggiore und

Cerussellus S. V. Mai und Juni auf Berglehnen, nicht selten.

Saxonellus Zk. Juni, in den Poderen von Tersatto.

Cassentiniellus Zeller. Juni u. Juli, bei Hraszt, Draga u. Clana.

Rorellus L. Mai und Juni; überall auf Berglehnen und Huthweiden, nicht selten.

- Crambus Chrysomnuchellus* Scop. April und Mai; häufig auf den Lehnen des Tersatto-Schlossberges und anderen Berglehnen.
- Aridellus* Thbg. Juni, bei Groming einige gefangen.
- Inquinatellus* S. V. Juni, überall in Menge.
- Contaminellus* Hb. Juni, beim Pulverthurm und bei Clana.
- Luteellus* S. V. Juni, bei Draga, Orechowiza und Volosca.
- Cramb. Pratellus* L. Juli, bei Groming an dem Sumpfe.
- Perlellus* Scop. Juni, auf dem Monte maggiore.
- Eromene Bella* Hb. Im Juni einige bei Buccari gefangen.
- Eudorea Ochrealis* S. V. Mai und Juni, aus Hecken gescheucht.
- Perplexella* F. R. Anfang Juni, bei Hraszt an Felsenwänden in den Morgenstunden.
- Dubitalis* Hb. Im Mai und Juni; im Draga-Thal aus Gebüsch gescheucht.
- Ambigualis* Tr. Juni, an Felsen der Louisenstrasse, auch an Baumstämmen.
- Mercurella* L. Mai, bei Castua in Eichengebüsch.
- Parella* Z. Juni, an der Strasse nach dem Monte maggiore, an Felsenwänden.
- Aphomia Colonella* L. Mai; bei Hraszt einige an alten Gebäuden gefangen.
- Anerastia Limbella* H. Sch. Im Juni einige beim Pulverthurm an Gräsern gefangen. Selten.
- Semnia Punctella* Tr. Ende Mai und Anfang Juni, auf dem Tersattoberge, nicht selten.
- Ephestia Bigella* Z. Mai, einzeln aus Hecken gescheucht.
- Elutella* Hb. April und Juni, in Gebäuden und Zimmern, nicht selten.
- Interpunctella* Hb. Mai und Juni, in Zimmern vorkommend.
- Vapidella* Mann. Ende Juni, an Felsenwänden bei Buccari gefangen. Gegenwärtig habe ich nur zwei Weibchen vor mir. Diese sind etwas kleiner als *Elutella*, und gleichen dieser Art in der Zeichnungsanlage, die aber so matt und verloschen, dass sie kaum zu erkennen ist. Die Grundfarbe der Vorderflügel ist von *Elutella* ganz verschieden, differirt aber auch an meinen zwei Exemplaren, indem sie bei dem einen staubig rothbraun, bei dem andern braungrau ist. Die Hinterflügel und Körpertheile sind wie bei *Elutella*.
- Homocosoma Nebutella* S. V. Mai u. Juni, im Fiumanergebiet a. Huthweiden.

- Homocosoma Nimbella* Z. Mai u. Juni, auf Huthweiden und Berglehnen, nicht gar selten.
- Binaevella* Hb. Juni, auf Berglehnen um Disteln geflogen.
- Sinuella* F. Mai und Juni, in der ganzen Gegend auf Huthweiden und Berglehnen.
- Acrobasis Consociella* Hb. Juni, aus Hecken gescheucht.
- Rubrotibiella* Z. Juli, bei Volosca in Eichengebüschen.
- Trachonitis Cristella* Hb. Mai, beim Pulverthurm aus Weissdornhecken gescheucht.
- Alispa Angustella* Hb. Im April bei Draga aus Hecken gescheucht, wo viel *Evonymus* stand.
- Glyptoteles Leucacrinella* Z. Juni, a. Tersatto einige an Mauern gefangen.
- Nyctegretis Achatinella* Hb. Juli, einzeln auf Huthweiden um Dornhecken.
- Myelois Rosella* Scop. Mai, auf den Lehnen des Tersatto-Schlossberges gefangen.
- Cirrigerella* Zk. Im Juni an den Poderen hinter dem Pulverthurme, selten.
- Cribrum* S. V. Anfang Juni, auf dem Kalvarienberge um Disteln geflogen.
- Suavella* Zk. Juni, von Weissdornbüschen abgeklopft.
- Advenella* Zk. Juni, beim Pulverthurm von Eichen abgeklopft.
- Epelydella* Z. Juni, um Schlehenhecken.
- Dulcella* Z. Juni, bei Fiume acht Stück aus Dornhecken gescheucht, selten.
- Tetricella* S. V. April, beim Pulverthurm und bei Martinischza aus Dornhecken gescheucht.
- Compositella* Tr. April, auf Huthweiden d. Tersatto- u. Kalvarienberges.
- Ilignella* Z. Mai, einige auf Huthweiden im Fiumaner Gebiete gefangen.
- Eucarphia Vinetella* Hb. Juli, bei Orechowiza einige gefangen.
- Hypochalcia Melanella* Tr. Mai, beim Pulverthurm in Poderen gefangen.
- Ahenella* S. V. Juni, auf Berglehnen, nicht selten.
- Epischnia Illotella* Z. In den Poderen auf Tersatto im Juni gefangen.
- Ancylosis Cinnamomella* Dup. (*Dilutella* Tr.) Mai, auf den Abhängen unter dem Tersatto-Schlosse.
- Nephopteryx Poteriella* Z. Im Juni auf dem Tersattoberge einige in Poderen gefangen.

Nephoteryx Janthinella H b. Juli, auf Huthweiden und Berglehnen bei Volosca und Castua.

Argyrella S. V. Juli, bei Groming in jungen Gebüsch auf Disteln.

Pempelia Zinckenella Tr. Juni; beim Pulverthurm auf einer Huthweide an Salbei vorkommend.

Carnella L. Juli, in Thälern und auf Bergen, nicht selten.

Obductella F. R. Bei Fiume nicht selten; die Raupe im Mai und Juni, der Falter im Juli.

Sororiella Z. Juni, einzeln auf Berglehnen.

Ornatella S. V. Juni und Juli; nicht selten, an Berglehnen und Huthweiden.

Adornatella. Juni, beim Pulverthurm, nicht selten.

Subornatella D. Juni, bei Martinischza.

Carbonariella F. R. Juni, bei Kameniak auf *Erica* geflogen.

Palumbella S. V. Mai und Juni, in der ganzen Gegend auf Berglehnen und Huthweiden

Dasystoma Salicella H b. Im April bei Fiume einige an Pappelstämmen gefangen.

Chimabacche Fagella S. V. April u. Mai, nicht selten, an Baumstämmen.

Semioscopis Steinkellnerella Tr. Im April an Mauern bei Hraszt gefunden.

Talaeporia Clandestinella M. i. l. (*Zeller Linnaea* VIII. Pag. 338) fand ich Anfang April in Croatien bei Orechowiza an Steinen und Mauern; sie lieferten gegen Ende April die Falter.

Lypusa Maurella S. V. Im Mai bei Hraszt auf Haselsträuchern.

Xysmatodoma Melanella H a w. (*Stelliferella* F. R.) Mai, an Pappelstämmen gefangen.

Euplocamus Fuesslinellus S u l z. Mai u. Juni in Gebüsch im Dragathale.

Boleti F. (*Mediella* Tr.) Mai, an Ulmenstämmen auf Tersatto.

Tessulatellus Z. Im Juni; an alten Stämmen auf dem Monte maggiore angetroffen.

Tinea Imella H b. Mai, aus Hecken gescheucht, Abends um Gebüsch schwärmend.

Ferruginella H b. Mai; Abends unter Dornhecken und an alten Mauern geschwärmt.

Rusticella H b. Mai und Juni, aus Dornhecken beim Pulverthurm gescheucht.

Tapetiella L. Mai, einige in Fiume an Häusern gefangen.

Arcella F a b. (*Clematella* Z.) Juli, im Dragathal Abends aus Hecken gescheucht.

- Tinea Granulatella* Z. Juni, Abends an Mauern beim Pulverthurm geflogen.
- QuercicoteUa* H. Sch. Mai, an alten Eichenstämmen.
- Granella* L. Mai und Juni, an Mauern und Gebäuden gefunden.
- Spretella* S. V. Mai, im Zimmer vorkommend.
- Ganomella* Tr. Mai, aus Hecken beim Pulverthurm u. bei Tersatto gescheucht.
- Pustulatella* Z. Juni, an Mauern beim Pulverthurm Abends geflogen.
- Confusella* H. Sch. Mai, bei Martinischza an Felsen einige gefunden.
- Incurvaria Angusticostella* F. R. Mai, einzeln um Dorngebüschc gefangen.
- MuscaleUa* Fab. Mai, an Zaunhecken geflogen.
- Pectinea* Haw. (*Zincken* Z.) Mai, bei Draga auf Eichen.
- Körneriella* Z. Mai, bei Clana im Buchenwalde geflogen.
- Oehlmanniella* Hb. Juni, um junge Gebüschc bei Draga u. Buccari geflogen.
- Lampronia Rubiella* Bjerkander. (*Variella* Fab.) Juni, bei Clana um Brombeeren geflogen.
- Micropteryx Calthella* L. Mai, im Draga-Thale, an Wiesenrändern auf Ranunkeln.
- Allionella* Fab. Im Buchenwalde bei Clana im Mai geflogen.
- Fastuosella* Z. Im April, von Eichen geklopft.
- Paykullella* F. Juni; auf den Blüten des *Rhamnus paliurus* gefangen.
- Nemophora Swammerdammella* L. Mai, in jungen Laubgebüschcn nicht selten.
- Pihulella* S. V. Hb. Juni, auf dem Monte maggiore auf Fichten.
- Pilella* S. V. April und Mai, um Dornhecken, besonders beim Pulverthurm.
- Metaxella* Hb. Juni, bei Draga an Waldrändern geflogen.
- Adela Fibulella* S. V. Mai, auf Berglehnen an Blüten der *Veronica*.
- Rufifrontella* Tr. Mai, bei Draga auf Wiesen.
- Frischella* L. Mai, bei Volosca in Gebüschcn.
- Violella* Tr. bei Martinischza an Gebüschcn.
- Associatella* F. R. Juni, auf dem Monte maggiore auf Fichten gefangen.
- Religatella* Z. Mai, auf *Rhamnus paliurus* geflogen.
- Degeerella* L. Mai und Juni; bei Volosca, Fiume und Buccari in jungen Gebüschcn schwärmend.
- Viridella* Scop. April und Mai, überall in Eichengebüschcn geflogen.

- Adela Cuprella* S. V. April, im Draga-Thale auf Weiden angetroffen.
- Nemotois Aerosellus* H. Sch. Juni; auf dem Kalvarienberge in Poderen auf Disteln und Scabioren gefangen.
- Istrianellus* H. Sch. Juni, auf dem Kalvarienberge in Poderen gefangen. Ist selten.
- Schiffermüllerellus* S. V. Anfang Juli, in Poderen auf dem Kalvarienberge und bei Castua.
- Minimellus* S. V. Juli, beim Pulverthurm auf Huthweiden.
- Barbatellus* Z. Mai, auf Berglehnen b. Pulverthurm u. bei Draga.
- Dumeriellus* Var. *Ferridellus* Z. Linnaea VIII. Pag. 338. Anfang Juni, auf einer Huthweide vor dem Pulverthurme, selten.
- Ochsenheimeria Taurella* S. V. Juni, unter Dornhecken einige im Laube gefunden.
- Plutella Cruciferarum* Z. April bis Juli; in der ganzen Gegend, sowohl als in Thälern, auf Bergen u. auf den Alpen des Monte maggiore, nicht selten.
- Cerostoma Silvella* L. Juli, bei Groming auf Eichen.
- Persicella* S. V. Juni, in Poderen, auf Pfirsich- u. Mandelbäumen.
- Asperella* L. Im Mai, von jungen Eichen gescheucht.
- Theristis Caudella* L. (*Cultrella* Hb.) April, an Weingarten-Mauern einige gefangen.
- Sophronia Humerella* Hb. Mai, auf Berglehnen auf Gras vorkommend.
- Sicariella* Z. Juni, um junge Gebüsche bei Draga.
- Illustrella* Hb. Juni, auf dem Kalvarienberge und beim Gränzamthause, in Poderen auf Globularien.
- Marginellus* F. Juni, bei Martinischza aus Wachholderhecken gescheucht.
- Juniperellus* L. Juni, auf Wachholdersträuchen bei Martinischza und Tersatto.
- Verbascellus* S. V. Juni, auf Huthweiden an *Verbascum*.
- Silacellus* H. Mai und Juni, auf Berglehnen und Huthweiden.
- Fasciellus* H. Juni u. Juli an Waldrändern aus Hecken gescheucht.
- Cleodora Striatella* S. V. Mai und Juni, um *Artemisia* fliegend.
- Anarsia Lineatella* Z. Juli, um Pfirsichhäume gefangen.
- Megacraspedus Dolosellus* F. R. Mai und Juni, im Draga-Thal und bei Martinischza auf Wiesen und Berglehnen.
- Separatellus* F. R. Vor Sonnenaufgang auf dem Gipfel des Monte maggiore, am 9. Juni gefangen. Die Weiber laufen am Grase hinauf, und erwarten da die Männchen.

Megacraspedus Binotellus F. R. Mai, auf Berglehnen und Huthweiden.

Imparellus F. R. Juni, auf dem Kalvarienberge und Tersatto einzeln in Poderen.

Holoscolia Forficella Hb. Mai, auf Huthweiden und Berglehnen.

Pleurota Punctella Costa (*Monostictella* H. Sch. Fig. 363) auf Berglehnen und Huthweiden in der ganzen Gegend.

Salviella H. Sch. Im Juni, auf den kahlen Gebirgen. Die Raupe lebt an *Salvia officinalis* und ist im Mai erwachsen.

Pungitiella H. Sch. Juni, auf dem Monte maggiore nach Sonnenuntergang geflogen.

Aristella L. Juni, auf den Bergen ober Hraszt nicht selten.

Bicostella L. Juni, auf dem Monte maggiore bei Clana und bei Kameniak nicht selten.

Rostrella H. Juni, auf Berglehnen, nicht selten.

Topeutis Criella Tr. Juni, bei Volosca u. Clana einzeln gefunden.

Carposina Berberidella H. Sch. Juni, aus Berberis-Sträuchengeschlecht

Lamprus Proboscidea Sulz. Im Juni, bei Hraszt einige aus Haselsträuchern geschlecht.

Geoffroyella L. Mai, einige in den Poderen an der Strasse nach Volosca.

Denisella S. V. Im Mai, in Poderen hinter dem Pulverthurm.

Ferrugella S. V. Im Juni, bei Fiume und Istrien um Eichen.

Metzneriella Tr. Im Juni, auf Tersatto um Eichen.

Tinctella Hb. Im Juni, aus Eichenbüschen geklopft.

Formosella S. V. Im Juli, bei Fiume an Pappelstämmen.

Hypercallia Christiernini Z. Mai und Juni; hinter dem Pulverthurm in einem grasreichen Gebüsch geflogen.

Dasycera Oliviella Fab. Juni; auf dem Kalvarienberge, und bei Castua einzeln auf Eichen und Eschen.

Oecophora Minutella L. Im Mai, an Mauern einige gefangen.

Sulphurella Hb. Juni, auf dem Monte maggiore.

Fulvigguttella H. Sch. Juni, bei Martinischza einige auf Berglehnen gefangen.

Pankatia Leuwenhoekella S. V. Juni, auf Berglehnen und Huthweiden, nicht selten.

Nodosella H. Sch. Im Mai, auf einer Huthweide hinter dem Pulverthurm.

Endrosis Fenestrella Scop. (*Lacteella* S. V.) April und Juli, im Zimmer in Fiume vorgekommen.

Butalis Esperella Hb. Juni, auf dem Monte maggiore.

Tabidella H. Sch. Mitte Juni, beim Pulverthurm Abends um Brombeergesträuch fliegend.

Aerariella H. Sch. Juni, ebenfalls beim Pulverthurm Abends in Poderen gefangen.

Vagabundella H. Sch. Mai u. Juni, auf Berglehnen in dem Fiumaner-gebiete und in Istrien.

Pascuella Z. (*Gravatella* M.) Juni, beim Pulverthurm und bei Martinischza auf Salbei.

Aurifrontella F. R. Mai, auf Weissdornhecken vorkommend; selten bei Fiume.

Cuspidella S. V. Juni, auf Berglehnen u. in grasreichen Poderen gefangen.

Knochella Fab. Mai und Juni, hinter dem Pulverthurme in Poderen gefangen.

Restigerella Metzner. Juni, auf Berglehnen im Fiumanergebiete auch in Croatien und Istrien.

Chenopodiella Hb. April b. Juni, nicht selten in denselben Gegenden.

Inspersella Hb. Juli, bei Martinischza einige auf *Juniperus* gefangen.

Atemelia Oleella Boyer. Juni, auf Oelbäumen vorkommend.

Plastobasis Phycidella Z. Juni, um Fiume aus Dornhecken gescheucht.

Oegoconia Quadripuncta Haw. (*Kindermanniella* Z.) Juni, bei Volosca und Clana einige gefangen.

Scythropia Crataegella L. Juni, nicht selten auf Schlehengesträuch.

Swammerdamia Pyrella Villers. (*Cerasiella* Hb.) Mai, nicht selten auf Schlehensträuchen.

Apicella Donawan. (*Comptella* Hb.) April, aus Dornhecken gescheucht, in Fiume und Croatien.

Hyponomeuta Vigintipunctata Retz. (*Sedella* Tr.) Juni, auf dem Kalvarienberge an *Sedum*, nicht selten.

Plumbella S. V. Juni, auf *Evonymus* nicht selten im Fiumaner Gebiete.

Irrorella Hb. Juni und Juli, beim Pulverthurm auf *Evonymus*-Sträuchern.

Rorella Hb. Juni, aus Rosenhecken gescheucht; selten.

Variabilis Z. Auf Schlehensträuchen nicht selten in d. ganzen Gegend.

Evonymella Scop. Mai, auf wilden Kirschbäumen die Raupen zu Tausenden. Falter im Juni und Juli.

Hyponomeuta Padi Z. Juni, im Draga-Thal auf Traubenkirschensträuchern (*Prunus padus*).

Anesychia Sexpunctella Hb. Juni, beim Pulverthurm an Mauern einige gefangen.

Scutella Scop. Juni, bei Hraszt an Mauern gefunden.

Echiella S. V. Mai und Juni, in der ganzen Gegend an Mauern und Baumstämmen vorkommend.

Funerella Fab. Im Mai einige auf Tersatto an Eschenbäumen gefangen.

Decemguttella Hb. Juni, bei Draga einige aus Hecken gescheucht.

Chrysopyga Z. Juni, bei Zengg auf einer Huthweide einige gefangen.

Symmoca Signella Hb. Mai und Juni, hinter dem Pulverthurm und bei Hraszt an Mauern sitzend gefunden.

Depressaria Costosa Haw. (*Depunctella* Hb.) bei Martinischza aus Eichengebüschen im Juli gescheucht.

Liturella S. V. Juni, bei Fiume u. Volosca aus Hecken gescheucht.

Assimilella Tr. Juni, aus Hecken bei Tersatto und Groming gescheucht.

Nanatella Stainton. Im Juni einige beim Pulverthurm Abends um Wachholdersträucher gefangen.

Arenella S. V. Juni, auf dem Kalvarienberge in Poderen gefunden.

Capreolella Z. April, auf dem Kalvarienberge gefangen.

Ocellana Fab. (*Characterella* S. V.) Juni, beim Pulverthurm und bei Draga an Mauern gefunden.

Lutosella H. Sch. Mitte Juni, auf Tersatto in Poderen Abends um Wachholdersträucher geflogen. Selten.

Furvella Tr. Juni, auf dem Kalvarienberge in Poderen einige gefangen.

Depressella H. Juni, hinter dem Pulverthurm auf Huthweideplätzen gefangen.

Vaccinella Hb. April, beim Tersatto-Schloss und bei Martinischza auf Berglehnen.

Badiella Hb. Juli, bei Volosca und Fianona aus *Clematis*-Hecken gescheucht.

Carcina Fagana S. V. Juni, auf Eichen nicht selten in der ganzen Gegend.

Locithocera Luticornella Z. Juli, beim Pulverthurm auf Weissdornhecken.

Henicostoma Lobella S. V. April und Mai, bei Fiume aus Dornhecken gescheucht.

Gelechia Kollarella Costa. (*Flavedinella* F. R.) Juni, a. d. Tersattoberge und hinter dem Pulverthurm auf Salbei. Die Raupe fand ich im Mai in zusammengespinnenen Blättern dieser Pflanze.

Cinerella L. Juni, überall an Rändern der Gebüschse, häufig.

Tripunctella S. V. Juni, auf dem Monte maggiore.

Lutillabrella Z. in lit. Nahe an *Cinerella*, die Hinterflügel eben so wenig ausgeschnitten. Palpen sichelförmig, die Behaarung des ersten und zweiten Gliedes unten ein klein wenig abstehend; ihre Farbe blass ockergelb. Vorderflügel staubig grau-braun (ungefähr wie bei *Hypsol. Fasciellus* oder *Deflectivellus*, aber noch trüber), schwach glänzend, ohne alle Zeichnung. Hinterflügel grau, mit helleren Fransen. Ocellen fehlend.

Populella L. Juni, in Fiume an Pappelstämmen.

Scintillella F. R. Juli, auf Berglehnen im Fiumaner Gebiete, Istrien und Croatien.

Subsequella H b. Juni, einige auf dem Kalvarienberge um Schlehenhecken gefangen.

Lentiginosella Z. Juli, bei Martinischza an Berglehnen gefangen.

Leucatella L. Ende Juni, aus Weissdornhecken gescheucht.

Terrella H b. Mai und Juni, nirgends selten.

Distinctella Z. Juni, auf Tersatto in Poderen.

Scabidella Z. Hinter dem Pulverthurme in einem Thale im Juni gefangen.

Solutella Z. Mai, auf Huthweiden bei Fiume und Tersatto.

Nebulea Steph. Juni, in Fiume und Croatien an Pappelstämmen, nicht selten.

Humeralis Z. April, im Fiumaner Gebiete von Eichen geklopft.

Triparella Metzner. Mai und Juni, bei Fiume in Eichengebüschse.

Scriptella H b. Mai und Juni, bei Fiume in Croatien aus Dornhecken gescheucht.

Cytisella Tr. Mai, zwei Stück am Kalvarienberge aus Rosenhecken gescheucht.

Aleella F a b. Juni, bei Draga und hinter dem Pulverthurme an Baumstämmen.

Quadrella F a b. Juni, bei Fiume, Tersatto und Volosca auf Berberizen-Sträuchen.

Gelechia Ligulella S. V. Mai, in der ganzen Gegend in Poderen a. Sträuchen und Pflanzen vorkommend.

Vorticella S c o p. Juni, auf Sträuchen beim Pulverthurm und bei Hraszt gefangen.

Cincticulella H. Sch. Mai, bei Martinischza auf einer Berglehne einige gefangen.

Captivella H. Sch. Im Jahre 1849 Ende Mai hinter dem Pulverthurm in einem Eschenwäldchen bei Sonnenuntergang geflogen. Im Jahre 1853 ist mir kein Stück untergekommen.

Patruella Z. in lit. Nahe an *Coronillella*, aber doppelt so gross, von den die Mittelbinde bildenden beiden Gegenflecken nur der am Vorderrande befindliche vorhanden. Färbung und Hinterflügel wie bei *Coronillella*. Im Juni, bei Fiume Abends an dünnen Pflanzen beim Pulverthurm gefangen.

Coronillella Tr. Mai, nicht selten allenthalben in Gebüsch, wo *Coronilla* ist.

Biguttella H. Sch. Mai und Juli, überall auf Berglehnen und Huthweiden.

Anthyllidella H b. Mai und Juni, nicht selten auf Berglehnen und Huthweiden.

Pulveratella H. Sch. Juni, auf Tersatto und dem Kalvarienberge Abends auf Huthweiden um Gesträuch geflogen.

Carchariella Z. Mai und Juni, überall in Eichengebüsch geflogen.

Dimidiella S. V. Mai, beim Pulverthurm u. im Draga-Thale Abends auf Huthweiden.

Gerronella Z. Juni, bei Orechowiza einige auf Bergen gefangen.

Flammella Tr. Mai und Juni, überall Abends auf Wiesen und Huthweiden.

Paupella Z. (*Melanolepidella* Kl. i. l.) Mai u. Juni im Fiumaner Gebiete und Draga-Thal Abends auf Grasplätzen, einzeln.

Artemisiella Tr. Juni, nirgends selten; auf Berglehnen, Wiesen und Huthweiden.

Albiceps Z. Juni, bei Volosca an Baumstämmen angetroffen.

Luculella H b. Juni, bei Fiume an Pappelstämmen angetroffen.

Stipella H b. April und Juni, an Mauern, wo *Atriplex* wächst, vorkommend, sowohl im Fiumanergeb., als in Istrien u. Croatien.

Herrmannella F. Auf dem Kalvarienberge, an Mauern u. Gebüsch auf *Chenopodium* geflogen.

Gelechia Pictella Z. Juni, auf Tersatto um Salbei bei Sonnenuntergang geflogen. Sehr selten.

Paucipunctella Metzn. Mai, auf dem Kalvarienberge in Poderen nach Sonnenuntergang geflogen.

Nigricostella F. R. Mai, hinter dem Pulverthurm Abends in dem Eschenwäldchen auf Gräsern vorkommend.

Campicolella Kollar in lit. Von der Grösse der kleinsten *Lithocolletiden*, d. Palpen abwärts hängend, den Kopf wenig überragend; die Hinterflügel wie bei *Gelechia* ausgeschnitten. Fühler hell und dunkel geringelt. Vorderflügel schmal und spitz, weiss mit feinen bräunlichen Atomen überflogen, die gegen den Innenwinkel zu mehr gehäuft sind; bloß mit staubigen u. schwachen schwarzen Punkten bezeichnet, von welchen drei im Mittelraume in Dreieckform stehen, einer aber mehr saumwärts gerückt ist, und sich ungefähr an der Stelle des Innenwinkels befindet, zwei undeutliche aber unfern der Basis in schräger Stellung nach aussen unter einander stehen. Hinterflügel grau, Fransen aller Flügel schmutzig weiss.

Parasia Neuropterella F. R. Juli, spät Abends an der Louisenstrasse auf Huflattig geflogen.

Acrolepia Granitella Tr. Mai, einige bei Hraszt gefangen.

Vesperella Z. April, bei Buccari einige auf Dornhecken gefangen.

Choreutis Incisalis Tr. Im Mai und Juni, auf Brombeerhecken.

Parialis F. R. Im Juli, auf den Blüthen der *Achillea* sitzend.

Alternalis Tr. Im Mai, nicht selten an Waldrändern und Mauern um *Parietaria officinalis* fliegend.

Micalis Kollar in lit. Nur von halber Grösse der *Vibralis*, dieser in Zeichnung gleichend, unter den im Mittelraume des Flügels befindlichen Metallflecken aber noch ein bei *Vibralis* nicht vorhandener kleinerer gegen den Innenrand zu, ungefähr bei $\frac{2}{3}$ dessen Länge. Mittelbinde der Hinterflügel deutlicher als bei *Vibralis* und entschieden weiss. Im Mai einige beim Pulverthurm auf Disteln gefangen.

Dolosana H. Sch. Im Mai auf Berglehnen hinter dem Pulverthurm.

Aechmia Thrasonella Scop. Mai, im Draga-Thale auf Wiesen, nicht selten.

Equitella Scop. Mai, bei Martinischza und beim Pulverthurm Abends auf Berglehnen.

Oculatella Z. Mai, beim Pulverthurm und bei Orechowiza.

Aechmia Fischeriella Z. Mai, hinter d. Pulverthurm in d. Eschenwäldchen.
Tinagma Dentellum Z. Mai, Martinischza u. beim Pulverthurm einzeln auf Berglehnen.

Balteotellum F. R. Mai, beim Pulverthurm auf Wachholder einzeln geflogen.

Transversellum Im Mai, auf dem Kalvarienberge und Tersatto-Schlossberge auf Gräsern in Poderen.

Stanneellum F. R. Mai, bei Martinischza zwei Stück auf jungen Eichen gefangen.

Argyrestia Ehippiella Fab. (*Pruniella* Hb.) Mai, an Dornhecken in sämtlichen Gegenden.

Spiniella Z. Juli, bei Clana und Groming einzeln vorkommend.

Mendica Haw. (*Tetrapodella* Z.) Mai, um Schlehenhecken nicht selten; im Fiumaner Gebiete, Istrien und Croatien.

Abdominalis Z. Juni, auf Draga und beim Pulverthurm auf *Juni-*
perus.

Fundella Tr. Mai, auf d. Monte maggiore aus Fichten gescheucht.

Illuminatella Z. Mai, auf dem Monte maggiore aus Fichten gescheucht.

Coleophora Mayrella Hb. Mai, in den Poderen bei Volosca aus Gras-
 lehen in Gebüsch.

Trochilipennella Costa. Mai und Juni, auf dem Kalvarienberge
 beim Pulverthurm Abends auf Huthweiden.

Alcyonipennella Kl. Juni, im Dragathal auf Wiesenrändern.

Paripennella Z. Mai auf Tersatto einige aus Gebüsch gescheucht.

Ballotella F. R. Juni, die Raupen nicht selten auf *Ballota nigra*.
 Falter im Juli.

Ornatipennella Hb. Mai, nicht selten, auf Berglehnen Abends
 auf Salbei-Blüthen überall geflogen.

Vibicella Hb. Juni, einige hinter dem Pulverthurm gefangen.

Fuscociliella Z. Mai, auf dem Kalvarienberge in Poderen gefangen.

Trifariella Z. Mai. auf dem Tersattoberge, bei Martinischza und
 beim Pulverthurm in Gebüsch einzeln vorkommend.

Flariella Mann. Nahe an *Trifariella* und *Oriolella*. Kopf und
 Palpen weiss; Fühler und die dicht schuppige Fühlerbasis gelb-
 lich, der übrige Theil der Fühler weiss und schwarz geringelt.
 Vorderflügel von dem angenehmen Gelb der *Gallipennella*, gegen
 die Flügelspitze zu etwas dunkler, blos mit drei schmalen, weissen,
 glänzenden, nicht sehr deutlichen Striemen bezeichnet; der am

Vorderrande befindliche vor der Flügelspitze auslaufend, der Mittelstriemen und der in der Flügelfalte befindliche noch undeutlicher. Fransen blassgrau; Hinterflügel grau, mit helleren Fransen. Im Mai, Abends im Eschenwäldchen beim Pulverthurm. *Vulnerariae* Z. Mai, in dem Eschenwäldchen beim Pulverthurme Abends nach Sonnenuntergang geflogen.

Serenella Dup. Juni, einzeln aus Hecken gescheucht.

Onobrychiella Z. Mai, bei Hrast auf Berglehnen einzeln vorkommend.

Albicostella Dup. Mai, in der ganzen Umgebung auf Berglehnen und Huthweiden.

Currucipennella Z. Juni, auf Eichen im Fiumaner Gebiete und Draga-Thale.

Auricella Bosc. Ende Mai, beim Pulverthurm einige gefangen.

Albifuscella Z. Mai, b. Martinischza a. Berglehnen Abends vorkomm.

Niveicostella Z. Juni, Kalvarienberg, Draga etc. Abends auf Berg-huthweiden geflogen.

Saponariella Z. bei Groming auf *Saponaria* einige bekommen.

Onosmella Brahm. Juni, im Dragathal a. Gebüschrändern geflogen.

Ciconiella H. Sch. Juli, auf Tersatto und beim Pulverthurme gefangen.

Therinnella Z. (*Trochilella* F. R.) Juni, in jungen Gebüschern auf Gräsern fliegend.

Lineariella Z. Mai, bei Martinischza auf Berglehnen.

Dryphid Mann. Aus der Verwandtschaft der *Murinipennella*. Etwas kleiner. Fühler und Palpen wie bei dieser Art, erstere aber scharf weiss und schwärzlich gerunzelt. Zeichnung ebenfalls wie bei *Murinipennella*, aber auf viel lichterem, braungelbem Grunde; die Striemen reiner weiss, besonders der am Vorderrande befindliche. Hinterflügel und Fransen ebenfalls viel heller. Im Juni die Säcke an *Dryphis spinosa* hinter Martinischza und bei Costrenna gesammelt.

Murinipennella Dup. April, beim Pulverthurm Abends auf Huthweideplätzen geflogen.

Argentula Steph. (*Cothurnella* F. R.) Juni, beim Pulverthurm auf Huthweiden Abends geflogen.

Micantella M. i. l. Mai, einige im Draga-Thale aus Gebüschern gescheucht, selten.

Coracipennella Hb. Juni, in Schlehenhecken, nicht selten in der ganzen Gegend.

Coleophora Lutipennella Z. Juli, auf Tersatto, dem Kalvarienberge und bei Volosca auf Eichen geflogen.

Limosipennella Z. Juli, bei Fiume Abends auf *Parietaria officinalis* geflogen.

Flavipennella H. Sch. Juni, beim Pulverthurm im Eschenwäldchen gefangen.

Zelleria Hepariella Staint. Mai, b. Fiume a. Ligusterhecken gescheucht.

Gracilaria Frankella Hb. April und Mai, im Fiumaner Gebiete, in Istrien und Croatien auf Eichen.

Rhodinella H. Sch. Mai, einige Stücke bei Draga von Eichen gescheucht.

Stigmatella Fab. April und Mai, in Eichengebüschen auf dem Kalvarienberge.

Semifascia Haw. (*Picipennella* L.) April, auf Tersatto v. Eichen gescheucht

Elongella L. Mai und Juni, im Fiumaner Gebiete, in Istrien und Croatien nicht selten in Gebüsch.

Tringipennella Z. Mai, beim Pulverthurm und bei Martinischza auf Berglehnen.

Limosella Dup. Mai, im Fiumanergebiete in Poderen vorkommend.

Syringella F. Mai, überall um *Syringus*-Hecken.

Aurogutella Steph. (*Lacertella* F. R.) Mai, einige im Dragathale an Gebüschrändern gefangen.

Quadrignella Z. Mai, bei Martinischza auf einer grasreichen Lehne einige gefangen.

Ononidis Z. Mai und Juni, auf dem Kalvarienberge u. bei Draga, auf Huthweiden, wo *Ononis* vorkommt, geflogen.

Kollariella Z. Mai, beim Pulverthurm in dem Eschenwäldchen.

Coriscium Brogniardellum Fab. (*Quercetellum* Z.) April, an dürrem Eichenlaub vorkommend.

Cucullipennellum Hb. (*Alaudellum* Dup.) Mai, um Liguster-Hecken gefangen.

Sulphurellum Haw. (*Citrinellum* Z.) April und Mai, beim Pulverthurm aus Laubgebüsch gescheucht.

Ornix Torquillella Z. April, auf Tersatto um Dornhecken.

Meagripennella Hb. April und Mai, überall um Schlehen und Dornhecken.

Anguliferella Z. Mai, auf dem Tersatto-Schlossberge von wilden Rosen gescheucht.

Orniæ Ampliatella Mann. i. l. Z. Mai, beim Pulverthurm u. bei Martinischza auf *Juniperus*.

Guttea Haw. (*Guttiferella* Z.) Juni, auf dem Kalvarienberge auf wilden Kirschhecken geflogen.

Cosmopteryx Argyrogrammos Z. (*Goldeggella* F. R. in lit.) Mai, beim Pulverthurm auf Huthweideplätzen.

Elachista Pontificella Hb. Mai und Juni, in sämtlichen Gegenden in jungen Gebüsch auf Grasplätzen fliegend.

Testaceella Hb. April, beim Pulverthurm von Eichen gescheucht.

Illigerella H. Juni, im Draga-Thale zwei Stück gefangen.

Rhamniella Z. Juni, Abends um Dornhecken bei Martinischza und auf dem Kalvarienberge einzeln vorkommend.

Tricolorella M. i. l. Mai, Fiumanergebiet einige Abends auf Huthweideplätzen gefangen.

Miscella Hb April und Mai, überall auf Berglehnen und Huthweiden vorkommend.

Ictella Hb. April und Mai, auf Berglehnen und Poderen, auf dem Kalvarienberge, Tersatto und in Istrien vorkommend.

Isabellella Costa. Mai, beim Pulverthurm einige auf der Huthweide gefangen.

Serratella Tr. Mai, auf dem Kalvarienberge und Tersattoberge auf Salbei einzeln geflogen.

Pomposella Z. Mai u. Juni, beim Pulverthurm u. bei Martinischza in den Abendstunden einzeln auf Salbei vorkommend.

Albiapicella H. Sch. April, Fiumergebiet auf Berglehnen auf Globularien-Blüthen.

Langiella Hb. Mai, auf dem Kalvarienberge aus Laubgebüsch gescheucht.

Modestella Dup. Mai, im Dragathal an Gebüschrändern bei Sonnenschein geflogen.

Concrisatella Z. in lit. Mai, bei Volosca und beim Pulverthurm und auf Berglehnen in jungen Gebüsch einige gefangen.

Quadrella Hb. Juni, auf dem Monte maggiore am Waldrande einzeln vorkommend.

Stadtmüllerella Hb. April und Mai, bei Fiume um Rosenhecken.

Brunnichella L. (*Magnificella* Z.) Juni, bei Martinischza und auf dem Kalvarienberge auf jungen Eschen.

Pullella H. Sch. April und Mai, an Rändern der Gebüsch um Fiume vorkommend.

- Elachista Parvulella* H. Sch. April, beim Pulverthurm auf Berglehnen.
- Griseella* Z. April und Mai, auf Berglehnen beim Pulverthurm.
- Dispositella* Z. i. l. Anfang April, bei Martinischza Abends auf Berglehnen.
- Squamosella* H. Sch. Mai, beim Pulverthurm und bei Castua auf Huthweiden.
- Desertella* Z. i. l. Mai, bei Martinischza und im Draga-Thale an Gebüschsäumen.
- Incanella* H. Sch. April und Mai, beim Pulverthurme Abends auf Huthweiden.
- Opacella* F. R. i. l. April, beim Pulverthurme in dem Eschenwäldchen.
- Nigrella* Tr. Mai, im Fiumaner Gebiete auf Berglehnen und Huthweiden.
- Cingitella* H. Sch. April, beim Pulverthurm u. bei Martinischza Abends um Wachholdersträucher.
- Cinctella* Z. Mai, beim Pulverthurm auf Eschen.
- Gangabella* Z. Mai und Juni, auf dem Kalvarienberge und bei Tersatto auf Eichen.
- Revinctella* Z. April und Mai, bei Martinischza und auf dem Kalvarienberge in jungen Gebüsch.
- Bisulcella* Z. April und Mai, beim Pulverthurm, im Draga-Thal und bei Volosca auf Eschen.
- Chrysodesmella* Z. Mai, bei Fiume in Eichengebüsch.
- Cerussella* H. b. Mai, im Draga-Thale Abends um feuchte Gräben auf Wiesen.
- Contaminatella* Z. Mai, beim Pulverthurm und bei Hraszt Abends um Hecken gefangen.
- Consistella* Heyd. i. l. April auf dem Tersatto- und Kalvarienberge an Berglehnen.
- Pollinariella* Z. April und Mai, auf Berglehnen und Huthweiden in sämtlichen Gegenden.
- Rudectella* H. Sch. April und Mai, im Fiumanergebiete und auf Tersatto auf Berghuthweiden.
- Collitella* Dup. Mai, auf dem Kalvarienberge, bei Martinischza, Volosca etc. auf Huthweiden.
- Anserinella* Z. Mai, auf dem Kalvarien- u. Tersattoberge in Poderen.
- Rufocinerea* H. a. w. (*Pratoliniella* M. i. l.) April, a. dem Tersatto- und Kalvarienberge nach Sonnenuntergang an Graslehnen.

Elachista Dispunctella H. Sch. Mai, im Draga-Thale und in jungen Gebüschern auf dem Kalvarienberge.

Triatomea Haw. (*Dispilella* H. Sch.) April, auf Berglehnen in der ganzen Gegend vorkommend.

Arenariella Z. Juni, auf dem Kalvarienberge auf Huthweiden um *Artemisia* geflogen.

Pollutella Z. April, auf Berglehnen und in Poderen in der ganzen Umgebung von Fiume Abends geflogen.

Cygnipennella H b. Mai, überall auf Berglehnen und Huthweiden.

Opostega Salaciella Z. Mai, im Draga-Thale auf Wiesen.

Crepusculella Z. Im Mai, bei Hraszt Abends an nassen Gebüschsäumen geflogen.

Trifurcula Pallidella Zell. Mai, hinter dem Pulverthurm in dem Eschenwäldchen.

Bucculatrix Nigricomella Z. Mai, beim Pulverthurm im Eichenwäldchen.

Ulmella Z. April, bei Fiume an Ulmenstämmen.

Crataegi Z. Mai, bei Fiume, Hraszt und Volosca, überall auf Weissdornbüschen.

Boyerella Dup. (*Albedinella* Z.) Mai, in der ganzen Gegend auf Ulmenhecken.

Frangulella Götze. (*Rhamnifoliella* F. R.) Juni, auf Rhamnus-Hecken beim Pulverthurm.

Hippocastani Z. Mai, beim Pulverthurm auf Eschen.

Nepticula Subnitidella Dup. Mai, Fiumanergebiet, auf Berglehnen um Gebüsche.

Hübnerella H. Sch. Mai, beim Pulverthurm in dem Eschenwäldchen.

Anomalella Götze. (*Centifoliella* Heyd.) Juni, bei Hraszt auf Rosensträuchen.

Argentipedella Z. Mai, beim Pulverthurm und auf Tersatto auf Schlehensträuchen.

Cursoriella Heyd. in lit. Im Mai, bei Fiume an Ulmenstämmen.

Lyonetia Prunifoliella H b. Im Mai, einige beim Pulverthurm aus Schlehenhecken gescheucht; selten.

Phytlocnistis Suffusella Z. April, bei Fiume an Pappelstämmen.

Cemiosstoma Spartifoliella H b. Mai, beim Pulverthurm und bei Castua um *Spartium*.

Scitella Z. Mai, einige hinter dem Pulverthurm in dem Eschenwäldchen und bei Draga gefangen.

- Lithocolletis Roboris* Z. April und Mai, auf Ahornbäumen u. Hecken.
- Scitulella* Z. Im April, beim Pulverthurm, Martinischza und Volosca auf Eichen.
- Hortella* Fab. (*Saportella* Dup.) Im Mai, im Fiumaner Gebiete, Draga-Thale etc. auf Eichen.
- Cupediella* H. Sch. Vom April bis Anfang Juni, Fiumaner Gebiet, Croatien und Istrien, auf Ahorn- und Olivenhecken Abends geflogen.
- Acernella* Z. Im April und Mai, auf dem Kalvarien- und Tersatto-Berge in Poderen auf Ahornsträuchen.
- Abrasella* Z. Im Mai, beim Pulverthurme einige auf Eichen gefangen.
- Quercifoliella* Zell. Im Mai und Juni, auf dem Kalvarienberge, bei Martinischza, im Draga-Thale etc. auf Eichen.
- Messaniella* Z. April, einige beim Pulverthurm von immergrünen Eichen gescheucht.
- Delitella* Z. Mai, beim Pulverthurm und bei Tersatto auf Eichen.
- Cramerella* F. Mai, beim Pulverthurm und bei Volosca aus Dornhecken gescheucht.
- Rajella* L. Mai, bei Clana um Buchen geflogen.
- Fagicolletta* H. Sch. Im Mai, bei Clana an Buchenstämmen.
- Ilicifoliella* Z. Mai, beim Pulverthurm u. bei Tersatto v. Eichen gescheucht.
- Pomifoliella* Z. Mai, auf dem Kalvarienberge, Tersatto, Draga-Thal etc. auf Weiss- und Schwarzdornhecken.
- Ulmifoliella* Hb. Juni, beim Pulverthurm und Tersatto auf Ulmen.
- Fraziniella* Z. Juni, hinter dem Pulverthurm in d. Eschenwäldchen.
- Emberizaepennella* Bouché. Mai, bei Fiume und Martinischza um Gebüsche geflogen.
- Kleemannella* Fab. Mai, bei Fiume, im Draga-Thale und in Istrien, an Weissdornhecken.
- Schreberella* Fab. Im Mai und Juli, auf Tersatto, bei Hraszt und auf dem Kalvarienberge auf Ulmengebüschen.
- Trifasciella* Haw. (*Heydenii* Z.) Mai, beim Pulverthurm und bei Groming einzeln um Hecken.
- Populifoliella* Tr. (*Fritillella* Tisch. in lit.) Juli, in Fiume an Pappelstämmen.
- Tischeria Complanella* Hb. Im Mai und Juni, im Fiumaner Gebiete, auf Tersatto, Volosca etc. auf Eichen.

Tischeria Emyella D u p. Im Mai, überall um Fiume auf Brombeerhecken.

Angusticolella D u p. Im Mai, auf Schlehenhecken beim Pulverthurm und bei Hraszt.

Pterophorus Rhododactylus S. V. Im Juni, bei Hraszt, auf dem Kalvarienberge, bei Volosca etc. um Garten- und wilde Rosen.

Gonodactylus S. V. Im Mai, im Fiumanergebiete und Draga-Thale an Lehen, wo Huflattig wächst.

Acanthodactylus H. Im April, beim Pulverthurm aus Lonicerae-Hecken gescheucht.

Tristis Z. Im Mai, auf dem Kalvarienberge, bei Tersatto etc. auf Huthweiden.

Distans Z. Mai, beim Pulverthurm und bei Martinischza auf Berglehnen und Huthweiden.

Parridactylus Haw. (*Obscurus* Z.) Im Mai und Juni, überall auf Berglehnen und Hutweiden.

Mictodactylus S. V. Im Mai, überall auf Huthweiden.

Coprodactylus Staint. Im Juni, auf dem Monte maggiore.

Fuscus Retz. Im Juli auf dem Kalvarienberge u. bei Groming.

Stigmatodactylus Z. Im Mai u. Juni, auf allen Berglehnen um Fiume.

Pterodactylus L. Vom April bis Juli, in der ganzen Gegend um Gebüsch.

Lienigianus Z. Im Juni, auf dem Monte maggiore an Waldrändern.

Carphodactylus Hb. Im Juni, auf dem Monte maggiore.

Microdactylus Hb. Im Mai, einige beim Pulverthurm gefangen.

Osteodactylus Z. Im Juni auf dem Monte maggiore.

Brachydactylus Kl r. Juni, b. Pulverthurm a. Hecken gescheucht.

Xanthodactylus Tr. Im Juli, beim Pulverthurm u. bei Groming.

Meristodactylus Mann. Nach Herrich-Schäffer V. Bd.

Pag. 385, nur Var. von *Tetradactylus*; scheint mir aber durch constant bleichere Färbung und schwächlicheren Bau davon verschieden. Im Juni, im Fiumanergebiete, in Croatien und Istrien auf Salbei, worauf die Raupe im Mai zu finden ist.

Pentadactylus L. Im Mai und Juni, überall um Fiume.

Baptodactylus Z. Im Juni, beim Pulverthurm Abends auf Huthweiden und Berglehnen.

Orneodes Polydactylus Z. Mai, b. Pulverthurm u. auf Tersatto in Poderen.

Hexadactylus Hb. Im Mai und Juni, auf dem Kalvarienberge und bei Martinischza auf Berglehnen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1857

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Mann Josef Johann

Artikel/Article: [Verzeichnis der im Jahre 1853 in der Gegend von Fiume gesammelten Schmetterlinge. 161-189](#)