

Entomologische Monatschrift.

Redaction und Expedition:
Landstrasse, Gärtnergasse Nr. 45.

In Commission bei
Carl Gerold's Sohn, Stadt Nr. 625.

Nr. 6.

IV. Band.

Juni 1860.

Lepidopterologische Mittheilungen.

Von H. D. J. Wallengrén.

II.

1. *Euchelia rostrata* n. sp. alis anticis supra albido-canescens, punctis et atomis acervatis nigris ad basin et finem cellulae, macula discoidali maculisque transverse biseriatis obsoletissimis et punctis marginis exterioris ferrugineis; posticis utrinque albidis. ♂

Hab. in Caffraria. Wahlberg. Mus. Holm.

Obs. Ad hoc genus non apte pertinet species. Forma corporis et directio costarum omnino generis *Eucheliae*, sed antennae pectinatae et palpi elongati, ante frontem longe porrecti, fere rostriformes. Pecten antennarum versus apicem attenuatum.

2. *Euchelia galapagensis* n. sp. alis anticis supra albicantibus, fusco-nebulosis, posticis infuscatis, ciliis omnium albidis. ♀

Ins. Galapagos. Mus. Holm. Statura *Emydiae cribrum*.

3. *Leptosoma fuscipenne* n. sp. alis anticis fuscis, fascia alba; posticis supra albis, fascia latissima marginis exterioris basique fuscis; abdomine cinereo linea laterali lutea, nigro-punctata. ♀ L. al. exp. 53 millim.

Caffraria Wahlberg. Mus. Holm. *L. insulari* Boisd. major et colore diversa.

4. *Spilosoma strigatum* n. sp. alis supra albo-flavicantibus, costis anticarum hinc inde late infuscatis; abdomine maculis l. punctis nigris quinquefariis. ♂

Caffraria. Wahlberg. Mus. Holm.

5. *Spilosoma punctulatum* n. sp. capite flavo; thorace alisque supra albis, punctis sparsis nigris; anticarum margine antico

infra fulvo-lutescente; abdomine supra fulvo-lutescente, subtus anoque albido, maculis quinquefariis nigris. ♀

Caffraria. Wahlberg. Mus. Holm. *S. menthastri* sat affinis.

6. *Chelonia cervina* n. sp. alis anticis supra ochraceo-rubrescente-cervinis, nigro-punctatis, posticis rubris, nigro-maculatis; omnibus infra rubris macula discoidali punctisque posticarum intramarginalibus nigris; abdomine trifariam nigro-maculato. ♀

Malacca. Mus. Holm. Statura *B. caprotinae* Cram.

Gen. **Munychia** Wallengr.

(Oefversigt of K. W. A. Forhandl. XV. 213.)

7. *Munychia callipyga* n. sp. alis anticis supra niveis, punctis minutissimis sparsis nigris margineque antico tenuissime flavo; posticis utrinque flavo-ochraceis macula discoidali nigra; margine scapularum flavo.

Caffraria. Wahlberg. Mus. Holm. *Ch. erythronotae* Boisd. affinis.

Gen. **Saenura** Wallengr.

(l. c. pag. 214.)

8. *Saenura alba* n. sp. alis utrinque albis, anticis infra ad marginem anticum, praesertim versus basin, flavescentibus; abdomine supra rubro, infra albo, trifariam nigro-maculato. ♀
- Caffraria. Wahlberg. Mus. Holm.
9. *Saenura flava* n. sp. alis utrinque pallide flavis; abdomine supra sulphureo, infra griseo, trifariam nigro-maculato. ♂
- Caffraria. Wahlberg. Mus. Holm.

10. *Laelia aliena* n. sp. alis utrinque niveis, anticis supra lineolis nigris, tenuissimis, versus marginem exteriorem signoque bi- l. tri-furcato nigro in disco; palpis nigris; fronte flavescente. ♂

Caffraria. Wahlberg. Mus. Holm. L. v-nigro minor et alae anticae magis rotundatae.

11. *Laelia proluxa* n. sp. alis utrinque flavis, anticis maris supra in disco punctis seriatis, feminae macula discoidali fuscis; corpore toto flavo. ♂ ♀ L. al. exp. circiter 34 millim.

Hab. ad Bojesmansrand. Wahlberg. Mus. Holm.

12. *Leucoma flavicapilla* n. sp. alis utrinque niveis, marginibus anticis infra flavescens; capite collarique flavidis. ♀

Caffraria. Wahlberg. Mus. Holm. L. salicis minor; antennae longius pennatae.

Gen. **Mallotodesma** Wallengr.

(l. c. pag. 212.)

13. *Mallotodesma discrepans* n. sp. alis utrinque antennisque albis; ore fusco; vertice flavido; abdomine albo, flavido-annulato, crista dorsali flavescens. ♀

Brasilia. Mus. Holm. Statura L. salicis.

14. *Psilura scurritis* n. sp. alis anticis supra nigro-fuscis atomis costarum ochraceis; posticis flavo-albidis margine exteriori fusco, ciliis flavidis; abdomine ochraceo maculis dorsi anoque nigro-fuscis. ♂ ♀ L. al. exp. 37—49 millim.

Ad Bojesmansrand. Wahlberg. Mus. Holm.

15. *Hypogymna cateja* n. sp. alis supra luteo-flavis, feminae pallidioribus; anticis fascia angulata ex atomis acervatis nigris, antica furcata, maculisque nigris versus marginem exteriorem; corpore toto luteo-flavo. ♂ ♀.

Var. Fascia alarum anticarum tenui maculisque versus marginem exteriorem nullis, tantum punctis minutissimis indicatis.

Caffraria. Wahlberg. Mus. Holm. Statura fere sequentis.

16. *Hypogymna melanura* n. sp. alis anticis supra rufo-fuscescentibus, infra cum posticis utrinque luteo-fulvescentibus; abdomine nigrescente.

Mas. Alis anticis supra strigis transversis arcuatis albidis, spatio inter eas nigro-pustulato maculisque prope marginem exteriorem ex atomis acervatis nigris, introrsum albedo-marginatis. L. al. exp. 29 millim.

Femina. Alis anticis supra hinc inde atomis nigris adspersis, versus marginem exteriorem in maculis minutis acervatis. L. al. exp. 40 millim.

Caffraria. Wahlberg. Mus. Holm.

Gen. **Eutimia** Wallengr.

(l. c. pag. 211.)

17. *Eutimia marpissa* n. sp. alis anticis supra linea longitudinali nigra in partes 2 divisis; parte anteriore ochracea, sed parte posteriore canescente et plaga ochracea a basi ornata; lineola nigra ad apicem ante colorem cinereum; posticis albidis.

Caffraria. Wahlberg. Mus. Holm.

18. *Hexaneura cinnamomea* n. gen. et sp. alis pallide cinnamomeis, versus margines pallidioribus; antennis nigris; palpis cinnamomeis. ♂

Caffraria. Wahlberg. Mus. Holm.

19. *Hexaneura maculifera* n. sp. alis anticis supra fuscis macula nigrescente discoidali; posticis supra albescentibus; antennis fuscis; palpis nigrescentibus. ♂

Caffraria. Wahlberg.

Gen. **Sirenopyga** Wallengr.

(l. c. pag. 210.)

20. *Sirenopyga ephippiata* n. sp. alis anticis supra pallide flavescenti albis, micantibus, maculis difformibus, indeterminatis et obsoletioribus, quasi aureo-nitentibus; posticis albidis; abdomine supra nigro, incisuris fulvescentibus anoque albido. ♂

Caffraria. Wahlberg.

21. *Stauropus interpellatrix* n. sp. alis anticis supra cinereis, atomis nigris adspersis, strigis transversis obsoletis fuscis strigaeque prope marginem exteriorem transversa, undulata, nigra; posticis utrinque et anticis infra infuscatis, illis supra ad marginem anticum late canis, signaturis nigris ornatis. ♀
L. al. exp. 52 millim.

Caffraria. Wahlberg. Mus. Holm.

22. *Cnethocampa melanospila* n. sp. alis anticis supra albis, micantibus, macula discoidali nigra; posticis nigris serie marginali macularum flavidarum; abdomine nigro, trifariam flavo-maculato anoque flavo. ♀

Ad Sidney Novae Hollandiae. Mus. Holm. *B. melanosticta*
Donov. ut videtur affinis sed fasciis 2 luteis plane caret.

23. *Phiala xanthosoma* n. gen. et sp. alis supra niveis, striga anticarum continua, posticarum punctata nigra; omnibus infra albis; abdomine fulvo. ♀ L. al. exp. 53 millim.

Caffraria. Wahlberg.

24. *Phiala dasypoda* n. sp. alis supra albis, argenteo-submican-
tibus serie communi punctorum nigrorum; infra pallide fla-
vescentibus; abdomine albedo. ♂ L. al. exp. 49 millim.

Caffraria. Wahlberg.

25. *Odontocheilopteryx myxa* n. gen. et sp. capite, thorace antice alisque posticis utrinque albis; alis anticis serie macularum albarum transversa atque nigro-punctata prope marginem exteriorem maculaque elevata albida ad finem cellulae.

Mas. thorace postice et alis anticis supra fusco-ferrugineis, costis omnibus albidis, ad basin marginis interioris strigaeque fasciformi per discum, hinc inde iridatis, albis; alis posticis infra fasciola infuscata abbreviata notatis. L. al. exp. 32 millim.

Femina. thorace postice pallide flavicante; alis anticis supra pallide ferrugineis, versus marginem exteriorem albicantibus, costis omnibus pallidioribus, linea transversa prope basin et altera obsoletiore extra medium alae, antice in maculas obscuriores transeuntibus, fuscis. L. al. exp. 39 millim.

Caffraria. Wahlberg. Statura *B. acaciae* Klug, quae species forte sit hujus generis.

26. *Borocera statii* n. sp. alis anticis supra ad basin fusco-ferrugineis, de cetero e fusco-ferrugineo et cano transversim variegatis; infra fusco-ferrugineis, ad basin flavo-pilosis; posticis utrinque ochraceo-albis, margine antico fasciaque lata postica fuscis. ♀ L. al. exp. 100 millim.

Caffraria. Wahlberg. Mus. Holm.

27. *Poecilocampa carinata* n. sp. alis integris, supra griseo-ferrugineis, anticis puncto baseos strigisque 2 transversis disci,

interiore abrupta, albidis; marginibus scapularum elevato-carinatis, albidis. ♀ L. al. exp. 70 millim.

Caffraria. Wahlberg. Mus. Holm.

28. *Gastropacha caffra* n. sp. alis anticis supra fuscescenti ferrugineis, striga versus marginem exteriorem obscuriorem obsoleta, fusca, punctoque ad finem cellulae albo; posticis fuscescentibus, versus basin pallidioribus. ♀ Lat. al. exp. 48 millim.

Caffraria. Wahlberg.

29. *Gastropacha nasutula* n. sp. alis anticis ochraceo-ferrugineis, strigis 2 transversis puncto intermedio punctisque subposticis nigricanti-fuscis; posticis rufo-ferrugineis; palpis productis.

Ad Sidney Novae Hollandiae. Mus. Holm. Species ut videtur *Bomb. nasutae* Lewin affinis, sed alae minime cinereae, ut Boisd. indicavit. Statura *G. ilicifoliae*.

Gen. **Strumella** Wallengr.

(l. c. pag. 209.)

30. *Strumella lanifera* n. sp. alis anticis supra cinereis strigis 2 transversis, sagittatis, serieque subpostica punctata fuscis, macula marginis interioris e squamis condensatis fuscis flavisque; omnibus infra pallide roseis posticis fascia ferruginea.

Ad Sidney Novae Hollandiae. Mus. Holm.

31. *Marmaroplegma paragarda* n. gen. et sp. alis anticis supra griseis, ferrugineo tinctis, strigis 2 transversis fuscis, costisque albis, figuras lanceolatas formantibus; posticis utrinque et anticis infra ochraceo-albis. ♂ L. al. exp. 56 millim.

Caffraria. Wahlberg. Mus. Holm. *B. vaninia* Cram. affinis.

Gen. **Striphnopteryx** Wallengr.

(l. c. pag. 209.)

32. *Striphnopteryx crepax* n. sp. antennis, fasciculo earum basali maculaque occipitis flavidis; alis anticis supra fuscis, disco brunnescente, strigis 2 repandis, approximatis extra cellulam alteraque prope basin obsoletis, fuscis, maculaque ad finem cellulae nigra, in medio brunnea; posticis supra brunnescentibus fascia latissima marginali fusca, striga pal-

lida intersecta, strigisque 2 disci obscurioribus. ♂ L. al. exp. 92 millim.

Caffraria. Wahlberg. Statura *S. edulis* Boisd.

Gen. **Thyella** Wallengr. — *Antheraea*

(l. c. pag. 141.)

33. *Thyella nyctalops* n. sp. thorace rufo-brunneo; alis supra rufo-brunneis fasciis 2 transversis albidis, exteriore duplicata; anticis spatio irregulari canescenti albedo marginis anticis, maculaque sat magna vitrea ad finem cellulae; posticis oculo fulvo, nigro albidoque circumcincto et macula rotundata vitrea notato. ♀

Caffraria. Wahlberg. *B. alcinoë* Cram. affinis sed alae anticae minime falcatae.

34. *Thyella punctigera* n. sp. thorace helvolo collari albo; alis supra helvolis, infra pallidis; anticis supra striga recta fuscescente duplicata, puncto subapicali nigro ocelloque obsoleto rubrescente, fusco canoque circumcincto et pupilla vitrea notato; posticis strigis transversis 2 fuscis ocelloque fulvo, late nigro-circumcincto, pupilla vitrea notata arcuque coerulescente ornata; ocello anticarum infra distincto, posticarum obsoleto. ♀

Locum natale incertum. Statura praecedentis.

35. *Opodiptera varicolor* n. gen. et sp. collari margineque antico alarum anticarum canescentibus; alis utrinque maris sulphureis, feminae pallide ferrugineis, oculo oblongo sulphureo l. rubrescente, tenue nigro-limbato; anticis supra fasciis 2 fuscis, exteriore recta, ad apicem alae angulata; posticis striga transversa fusca.

Ad Sidney Novae Hollandiae. Statura fere *Sat. paroniae* Lin.

36. *Epiphora scribonia* n. sp. alis supra griseis fascia repente postica communi alba, introrsum fusco-terminata, margine externo ferrugineo-rufo, anticarum linea valde repanda posticarum recta maculisque nigris antepositis notato; anticis macula rotundata apicali dimidiatim coerulea et nigra, lineam albam fulguratam in apicem emittente; omnibus oculo maximo vitreo, rufo nigroque circumcincto. ♀ L. al. exp. 140 millim.

Caffraria. Wahlberg. Forma alarum fere ut in *B. cecropia*
Cram.

Gen. **Sculna** Wallengr.

(l. c. pag. 139.)

37. *Sculna invenusta* n. sp. alis utrinque ferrugineis, posticis versus basin pallidioribus, macula discoidali fusciscente, in medio subvitrea; omnibus infra fascia communi obsoleta fusciscente, supra obsolete perlucente.

Caffraria. Wahlberg. Magnitudine *Ag. tau* affinis.

Gen. **Ancalaespina** Wallengr.

(l. c. pag. 140.)

38. *Ancalaespina tata* n. sp. alis anticis supra fusco-griseis, ad basin et marginem anticum canescentibus, strigis 3 transversis nigris, undulatis, fascia transversa pallidior maculaque disci subtrigona vitrea; posticis fusco-brunneis oculo maximo rubro et nigro discoidali, strigis transversis albis et nigris, fasciaque flavescens versus marginem exteriorem fusco-griseum. ♀

Caffraria. Wahlberg. Species maxima.

39. *Agrotis denticulosa* n. sp. alis anticis supra griseo-ferrugineis, ad basin et marginem anteriorem fuscis, lineis ordinariis 2; extrabasali duplicata indistincta, sed intermedia undata, valde denticulata ex arcibus nigris composita; macula claviformi ordinaria fundo concolori, fusco-limbata; macula rotunda minuta nigra maculaque reniformi nigro-fusca magna et normali; posticis albis et subhyalinis. ♂

Caffraria. Wahlberg. *A. segetum* affinis, sed minor.

40. *Agrotis crassilinea* n. sp. alis anticis supra brunnescenti-griseis, linea basali, extrabasali et intermedia distinctis, nigris, pallide limbatis, e maculis costalibus orientibus, linea subterminali pallida, e linea apicali obliqua oriente, macula reniformi, claviformi lineolisque intra lineam subterminalem fuscis; posticis supra infuscatis; omnibus infra fusciscentibus, macula discoidali posticarum fasciaque communi transversa fuscis. ♀

C. Bonae Spei. *A. porphyrae* sat affinis.

41. *Agrotis frivola* n. sp. alis anticis supra ferrugineis, fusco-indutis atomatisque, costa lineolis fuscis, macula ordinaria rotundata magna indistincta maculaque reniformi fusca; posticis albis, subhyalinis, angulo antico infuscato. ♂
Montevideo. Mus. Holm. *A. suffusae* affinis.

42. *Agrotis angulifera* n. sp. alis anticis supra griseo-fuscis, lineis ordinariis obsoletissimis in lineolis costalibus nigricantibus incipientibus, lineis 3 subapicalibus ad costam flavescens, maculis 2 ordinariis cellulae tenuissime nigro-cinctis maculaque claviformi angulum nigrum tenuissimum formante; posticis infuscatis, disco albedo. ♀
Buenos-Ayres. Mus. Holm. *A. ravidae* subaffinis.

43. *Hama latipennis* n. sp. alis anticis fuscis cinereo hinc inde adpersis, lineis ordinariis transversis albis, maculisque obsoletissimis, et punctis marginis antici albidis; posticis supra nigrescenti fuscis, ciliis dilutioribus, in medio marginis exterioris obscurius maculatis. ♂
Caffraria. Wahlberg. Alae anticae late et magis acuminatae quam in alia specie hujus generis.

44. *Hama exsiccata* n. sp. alis anticis supra flavidis, in disco et ad marginem anticum fuscis, linea extrabasali pallide marginata subrecta, intermedia tamen valde angulata nigris, maculis ordinariis distinctis, reniformi albedo-limbata triangularisque ad marginem exteriorem fuscis; posticis albidis, postice late infuscatis, infra puncto discoidali fasciaque transversa fuscis. ♀
Caffraria. Wahlberg. Magnitudo intermedia.

45. *Perigea chinensis* n. sp. alis supra brunneo-cinereis, anticis lineis transversis 2 discoidalibus ordinariis undulatis obscurioribus, macula reniformi subdistincta, pone illam macula et in margine antico versus apicem lineolis albis; alis omnibus infra striga communi transversa obscuriore. ♂
China. Mus. Holm. Magnitudo minuta.

46. *Noctua flavicosta* n. sp. alis anticis fusco-brunneis, versus marginem exteriorem dilutioribus, costa ochracea cum maculis 2 disci ordinariis concoloribus cohaerente; posticis grisescentibus, infra macula obsoleta discoidali fusca. ♂

Patagonia. Mus. Holm. Articulus ultimus palporum longior quam in speciebus reliquis hujus generis.

47. *Hadena teretipalpa* n. sp. alis anticis supra canescenti fuscis, macula reniformi magna albido-cincta, macula rotundata et claviformi approximatis, indistinctis, circulis nigris indicatis, linea transversa intermedia nigra et spatio extra illam canescente; posticis niveis. ♂

Caffraria. Wahlberg.

48. *Hecatera strigicollis* n. sp. alis anticis supra albidis, spatio basali ochraceo fuscoque marmorato, spatio intermedio ferrugineo-fusco, maculis cellulae 2 ordinariis albis, margineque exteriore extra lineam subterminalem undulatam cano; posticis griseis disco pallidioribus; collari ferrugineo, linea nigra transversa margineque canescente. ♂

California. Mus. Holm. Statura *H. serенаe*.

49. *Tephrias plumipes* n. gen. et sp. alis anticis supra griseo-testaceis, hinc inde fusco-indutis, macula difformi magna versus basin marginis interioris, puncto discoidali minuto, linea transversa vario modo angulata et undata punctisque intramarginalibus nigris; posticis supra griseis punctis intramarginalibus nigris.

Caffraria. Wahlberg. Genus pilositate pedum *Remigias* in memoriam reducit, sed nihil de cetero cum illis habet commune.

50. *Sesamia bombiformis* n. sp. alis grisescenti-albis, nitidis, anticis supra atomis minutissimis sparsis, strigis 3 longitudinaliter positae punctisque uniseriatis nigris. ♂

Montevideo. Mus. Holm. Statura *S. nonagrioidis*.

51. *Eurhipia cistellatrix* n. sp. alis anticis supra canis, apice infuscatis, lineis transversis extrabasali et intermedia angulatis fuscis, macula ordinaria reniformi ferruginea, obsoleta, lunulisque 2 apicis albis; posticis infra canis macula sat magna discoidali nigra fasciaque transversa fusca. ♀

Caffraria. Wahlberg. *E. adulatrici* affinis.

52. *Eurhipia operatrix* n. sp. alis anticis supra pallide flavis, lineis transversis, flexuosis, ochraceis, macula subapicali fasciaque transversa extrabasali fusco-myrtillina; posticis albido-flavicantibus, versus angulum anticum ochraceis.

Caffraria. Wahlberg. Mus. Holm. Statura praecedentis, sed abdomen laeve.

53. *Cucullia antarctica* n. sp. palpis albis, thorace alisque anticis supra obscure canis; alis posticis grisescentibus. ♀ *C. splendidae* affinis, sed alae anticae minus lanceolatae.

Patagonia. Mus. Holm.

54. *Cleophana australasiae* n. sp. antennis maris pectinatis; alis anticis latis, supra griseo-canis, atomis minutissimis fuscis adpersis lineisque 4 obsoletissimis transversis albis, sagittatis, lineisque adjectis fusco-ferrugineis, tantum ad marginem anticum distinctis; posticis fuscis. ♂

Ad Sidney Novae Hollandiae. Mus. Holm.

55. *Lophoptera squamifera* n. sp. alis anticis supra albido-canis, fusco-ferrugineoque atomatis, squamis hinc inde elevatis, spatio intermedio fuscescenti, lineis ordinariis nigris, linea subterminali in formam W obsolete fracta, strigis 2 transversis obsoletis ferrugineis ciliisque arcibus nigris ornatis; posticis albis, subhyalinis, postice diffuse infuscatis. ♀

Caffraria. Wahlberg.

56. *Lophoptera fumata* n. sp. alis anticis supra dilute albido-canis, dense fusco-atomatis, linea basali incompleta, linea extrabasali et intermedia undulata, maculaque coloris fundi pone cellulam maxima, reniformi, fusco circumcincta; posticis albis, subdiaphanis, postice tenue atque diffuse infuscatis. ♂

Caffraria. Wahlberg.

57. *Heliothis uniformis* n. sp. alis anticis supra flavo-viridibus, in disco lutescentibus, macula rotundata et reniformi obsoletis, in medio obscuris; posticis lutescentibus, macula discoidali fasciaque postica latissima fuscis; omnibus infra fascia communi et anticis maculis 2 disci fuscis. ♀

Caffraria. Wahlberg. *H. scutuligerae* affinis.

58. *Heliothis punctigera* n. sp. alis anticis pallide ochraceis, spatio subterminali obscuriore serie punctorum nigrorum, maculis ordinariis fere nullis, lineis ordinariis transversis intermedia et subterminali obsoletissimis; posticis albis, limbo

exteriore fusco, unicolore, infra maculam magnam formante; anticis infra macula discoidali fasciaque externa fuscis. ♂

Ad Sidney Novae Hollandiae. *H. armigerae* affinis.

59. *Anthoecia cystiphora* n. sp. margine antico alarum anticarum vesicam gerente; alis anticis supra griseo-ochraceis, linea intermedia denticulato-undulato, extra maculam reniformem maximam fuscam arcuata, macula claviformi maxima fusca lineaque subterminali ochracea, maculam marginis antici fuscam extrorsum terminante; posticis supra ochraceo-fuscescentibus macula disci, striga transversa margineque exteriore bis ochraceo-maculato fuscis; omnibus infra flavis, anticis macula disci reniforme strigaque transversa fuscis. ♀

Panama. Mus. Holm.

60. *Anthoecia inflata* n. sp. margine antico alarum anticarum vesicam gerente; alis anticis supra canescentibus, linea intermedia denticulato-undulata, extra maculam reniformem maximam fuscam arcuata, macula claviformi maxima fusca lineaque subterminali albida per spatium subterminalem fuscum currente; posticis supra ochraceo-fuscescentibus; macula disci, striga transversa margineque exteriore bis ochraceo-maculato fuscis; omnibus infra flavis, anticis macula disci unica strigaque transversa fuscis. ♂

Honolulu. Mus. Holm. Praecedenti affinis.

61. *Anthoecia onca* n. sp. margine antico alarum anticarum normali; alis anticis supra fusco-griseis maculis discoidalibus concoloribus, spatio ochraceo disjunctis, linea intermedia denticulato-undulata, arcuata, lineaque subterminali ochracea; posticis supra ochraceo-fuscescentibus, macula disci, striga transversa margineque exteriore haud ochraceo-notato fuscis; omnibus infra flavis, anticis maculis 2 disci strigaque transversa fuscis. ♂ ♀

Panama. Ins. St. Joseph et Ins. Galapagos. Mus. Holm. Statura praecedentis.

62. *Acontia simo* n. sp. alis anticis supra albis, versus marginem exteriorem late fuscis, nigro maculatis, strigis transversis baseos griseo-fuscis, maculis 2 marginis anterioris fuscis lineaque ordinaria subterminali, maculis albis indicata;

posticis supra flavidis, versus marginem exteriorem infuscatis. ♂ ♀

Caffraria. Wahlberg. Mus. Holm. Statura *A. Wahlbergi* Wallengr.

63. *Thalpochares caffrorum* n. sp. alis pallide ochraceo-flavis, anticis supra fascia lata fuscescente margineque exteriore brunnescente. ♂

Caffraria. Wahlberg. Species minutissima.

64. *Erastria fasciata* n. sp. alis anticis supra griseo-fuscis fascia transversa recta atque sat lata albida, linea ferruginea intersecta; posticis supra fuscis. ♂ ♀

Caffraria. Wahlberg.

65. *Erastria corniculans* n. sp. alis anticis cinereis, hinc inde ferrugineo-tinctis, lineis ordinariis pallidis (intermedia angulata), macula lunata punctisque 2 disci nigris; posticis brunnescente fuscis. ♀

Caffraria. Wahlberg.

66. *Microphysa hypoxantha* n. sp. alis anticis supra obscure brunnescenti fuscis, lineis maculisque ordinariis obsoletis macula apicali marginis anticis punctisque seriatis marginis exterioris flavis; posticis supra fusco-brunneis strigis 2 flavis, tantum ad angulum ani distinctis, infra fulvescenti flavis fascia transversa margineque flavo-maculato exteriore nigris. ♀

Caffraria. Wahlberg.

67. *Microphysa hypotaenia* n. sp. alis anticis supra canescenti fuscis, linea extrabasali recta, linea intermedia repente albidis maculaque reniformi nigra; posticis supra fuscis, fasciis 2 albis; omnibus infra fuscis fasciis 2 communibus albis. ♂ ♀

Caffraria. Wahlberg.

68. *Grammodes insulsa* n. sp. alis anticis supra cinerascenti griseis, lineis basali et extrabasali rectis, linea intermedia tortuosa, linea subterminali denticulata, omnibus pallidis, macula disci biloba maculaque subapicali trapeziformi nigris; posticis supra griseis fasciis 2 obsoletissimis pallidioribus ciliisque unicoloribus. ♂

Caffraria. Wahlberg. Var. *Aph. myopsis* Gn. ut videtur affinis.

69. *Grammodes moderata* n. sp. alis anticis supra cinereo-vio-
laceis, linea extrabasali albida undulata, linea intermedia
arcuata, punctulis albidis indicata, linea subterminali recta,
flavida, in spatio diffuse brunneo sita, maculaque reniformi
flavida, punctis 2 albidis notata; posticis griseis, striga
transversa, obsoleta, obscuriore ciliisque unicoloribus. ♀

Caffraria. Wahlberg.

70. *Ulotrichopus tortuosus* n. sp. alis anticis supra rufo-fuscis,
disco dilutiori, linea extrabasali, linea intermedia angulata,
denticulata, torsa, lineolisque versus marginem exteriorem
longitudinaliter positis, nigris; posticis supra flavo-albidis,
fascia latissima nigra macula flavo-albida notata. ♂

Caffraria. Wahlberg.

71. *Toxocampa remota* n. sp. vertice collarique nigro-fuscis;
alis anticis supra rufescenti griseis, fusco-irroratis, macula
ordinaria reniformi, macula magna irregulari prope basin
marginis interioris nigro-fuscis punctisque obsoletis marginis
exterioris fuscis; posticis albicantibus, ad marginem exte-
riorem late infuscatis. ♀

Caffraria. Wahlberg. Forma alarum anticarum fere ut in
T. lusoria.

72. *Epidromia xanthogramma* n. sp. alis anticis subfalcatis,
omnibus supra grisescenti fuscis linea communi tenui, ad
costam angulata punctisque marginalibus minutissimis flavi-
dis; anticis linea ordinaria basali et extrabasali ferrugineis,
umbra mediana fusca, maculaque reniformi nigrescente, ato-
mis albidis posticae accumulatis ornata; omnibus infra griseis
striga transversa communi fusca. ♀

Callao. Mus. Holm. *E. zetophorae* Gn., ut videtur, affinis.

73. *Renodes nephrophora* n. sp. alis anticis subfalcatis, omnibus
supra pallide ochraceo-cinereis macula lunata discoidali
vitrea lineaque transversa communi ferruginea, ad costam
geniculata; anticis linea extrabasali ferruginea, subundulata
marginique exteriore ferrugineo. ♀

Puna. Mus. Holm.

74. *Hyalea fulvidalis* n. sp. alis concoloribus dimidiatim aureo-
fulvis et fuscis, macula in fuscedine anticarum ovata aureo-

fulva, cum margine alae antico cohaerente. ♂ Exp. al.
18 millim.

Tahiti. Mus. Holm. *H. succinali* affinis.

75. *Isopteryx signiferalis* n. sp. alis minime sinuatis, supra griseo-fuscis, anticis macula fusca discoidali inter maculas 2 niveas fasciaque undata alba, a costa ad angulum posticum ducta, in posticis continuata; his macula discoidali nivea, e qua fascia alba ad angulum ani ducta. ♀ Exp. al. 17 millim.

Tahiti. *I. magnali* Gn. affinis.

76. *Rhodaria cinnamomealis* n. sp. alis anticis supra ochroleucis costa squamisque in disco sine ordine condensatis cinnamomeis, maculis ordinariis discoidalibus, figura irregulari pone cellulam fasciaque transversa in vitta fusca plumbeis; posticis albidis margine exteriori late sed obsolete infuscato. Exp. al. 20 millim.

C. Bonae Spei. Mus. Holm.

77. *Salbia squamosalis* n. sp. alis griseo-testaceis, anticis strigis transversis 3 pallidis, exteriori ante marginem posteriorem longe desinente et intermedia marginem alae anteriorem non attingente; posticis lineis transversis 2 pallidis, fere parallelis, exteriori postice abbreviata, interiori introrsum fusco-terminata; basi anticarum ad marginem anticum valde retuso squamosa. ♂ Exp. alis 27 millim.

Puna. Mus. Holm.

78. *Salbia continuatalis* n. sp. alis fusco-griseis, linea transversa communi albida, fere recta, introrsum fusco-terminata, margineque exteriori tenuissime fusco; anticis macula discoidali obsoleta, fusca; ciliis posticarum apice albidis; basi anticarum normali. ♀ Exp. al. 28 millim.

Honolulu. Mus. Holm.

79. *Thalassodes strigigera* n. sp. alis posticis obsoletius angulatis, omnibus supra albido-viridibus, strigis transversis undulatis albis creberrimis; anticis puncto discoidali obscuro; omnibus infra unicoloratis, posticis fere margaritaceis. ♀

Sidney Novae Hollandiae. Mus. Holm. Forma alarum fere *H. pu-*

tatarias.

80. *Gnophos fuscovariata* n. sp. alis denticulatis, supra pallide flavidis atomis creberrimis fuscis condensatis, lineas strigisque irregulares formantibus; anticis puncto discoidali fusco, posticis serie obsoleta postica punctorum alborum; omnibus infra albicantibus, puncto discoidali, apice anticarum atomisque rarioribus fuscis. ♂

Brasilia. Mus. Holm. *G. obscurariae* quoddammodo similis.

81. *Eubotia meridionalis* n. sp. alis anticis supra laete grisescenti ferrugineis, subnitidis, macula discoidali, costis divisa, strigaeque apicis, e puncto discoidali oriente, purpureis; posticis supra et omnibus infra grisescentibus, subnitidis.

Patagonia. Mus. Holm. *E. mensurariae* ad formam palporum et alarum similis.

82. *Cidaria insulariata* n. sp. alis anticis supra sordide ochraceo-testaceis, fascia baseos alteraque lata aequali discoidali, extrorsum obtuse bidentata, brunneis; posticis supra fusciscentibus; omnibus infra flavis, puncto discoidali, macula apicis anticarum maculaque anali posticarum nigricantibus. ♀

Madeira. Mus. Holm. *C. chenopodiatae* affinis.

Analytische Darstellung der Histeriden.

Nach Abbé de Marseul.

Von A. Czagl.

(Fortsetzung.)

Einteilung der Saprinen in Gruppen.

1. Stirne vor dem Kopfschild erhaben gerandet 5
- — — — — nicht gerandet 2
2. Flügeldecken mit scharf begrenzten rothen, gelben oder schwarzen Flecken I. Gruppe.
- — — — — einfarbig 3
3. Die Fühlergrube reicht nicht bis zum Vorderrande der Brust, sie ist von demselben durch einen grösseren Zwischenraum geschieden. — Nahtstreifen ganz, oder nur hinten etwas abgekürzt 4
- — — — — bis zum Vorderrande der Brust und ist nur durch einen schmalen Raum von ihm getrennt. — Nahtstreifen fehlend, oder rückwärts stark abgekürzt . IV. Gruppe.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1860

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Wallengren Hans Daniel Johan

Artikel/Article: [Lepidopterologische Mittheilungen. 161-176](#)