

mit breiter, doppelt klappenförmiger, das Weibchen mit einfacher breit klappenförmiger, darunter löffelförmiger Begattungswehr und letzteres mit einer sichelförmigen Legescheidenklappe.

Vorkommen. Am Altvater im Monate Juni.

Typen. In der Sammlung des k. k. Polytechnikums zu Brünn.

Chilopoda. Einfüssler.

Titanethes Schioedte. Berg-Scolopender.

Sudeticus Kolenati.

Albus, capite late cordato, in tota corporis superficie verrucis rotundis et setulis, oculis simplicibus, meso- et metanoto bilaminatis, cercis quinquearticulatis.

Longitudo corporis $1\frac{2}{3}$ '''.

Diese Art weissen Bergscolopenders fand ich im Juli und August an der Kuppe des Altvaters (4654 Wiener Fuss Seehöhe) und des Leiterberges in dem hohen Gesenke unter feucht liegenden Steinen. Das Collare ist sehr schmal, das Meso- und Metanotum doppelschilderig, die Fühler sind rosenkranzförmig und 23gliederig, der übrige Körper hat 12 Leibesringe und 12 viergliederige Fusspaare, die Fühlerglieder sind alle gleich kreiselbecherförmig, dicht kurzborstig, die Palpen sind fünfgliederig, die Fussglieder und der ganze Körper sonst schütter kurzborstig.

Typen. In der Sammlung des k. k. Polytechnikums zu Brünn.

Lepidoptera nova

in
paeninsula Malayica collecta

diagnosibus instructa

C. & R. Felder.

Series prima.

1. Papilio Rama Nob.

Alis supra fuscis, striga basali, fasciis duabus macularibus anticarumque maculis quatuor cellularibus virescentibus, subtus pallidioribus, maculis paginae superioris subargenteo nitentibus, posticis macula costali tribusque versus angulum analem sanguineis. ♂

Coll. Felder. — A P. Agamemnone L., cui pagina superior subsimilis, jam alis posticis ecaudatis diversus magis P. Arycli Boisd. affinis videtur.

2. *Myrina Amrita* Nob.

Alis bicaudatis, supra ♂ris nigro-fuscis, dimidio basali caeruleo atomato, ♀nae fuscis, posticis lunulis tribus analibus maculisque quatuor marginis analis albis, subtilus anticis utriusque sexus posticarumque apice laete fulvis, his caeterum albis, maculis biseriatis nigris in regione anali.

Coll. Felder. — *M. Tharide* Hübn., cui affinis, fere dimidio major.

3. *Myrina* *) *thecloides* Nob.

Alis supra fuscis, posticis bicaudatis, fascia anali fulva, subtilus omnibus glauco-albis, litura discali geminata strigaeque exteriore anticarum continua, posticarum bis refracta aurantiacis albo cinctis, anticis extus fulvescentibus, posticis macula subcostali concolore binisque analibus atris, exteriore in areola fulva. ♂

Coll. Felder. — *Colore Theclis* quibusdam haud absimilis.

4. *Amblypodia* **) *Nakula* Nob.

Alis breviter caudatis, supra saturate violaceo-cyaneis, ♀nae anticarum costa, limbo apicali et externo, posticarum costa late margineque anali fuscis, subtilus omnibus saturate brunneis, anticis maculis tribus cellularibus cyanescenti cinctis fasciisque binis exterioribus albido cinctis, fuscis, posticis maculis difformibus basalibus, fascia discali irregulari strigaeque postica undata fuscis, dilutius cinctis, lunulis tribus analibus atris densissime cyaneo-virescenti aspersis.

Coll. Felder. — Affinis *A. Centauro* Fabr.

5. *Amblypodia Vihara* Nob.

Alis caudatis, appendiculo anali brevissimo, supra obscure violaceo-cyaneis, nigro marginatis, ♀nae dilutioribus, fusco limbatis, anticis macula discali nigra, subtilus saturate brunneis, maculis basalibus, fascia marginali obsoleta, anticarum fascia abbreviata

*) *Species haec et ejus affines, M. Erylus* Godt. et *Sipylus* Feld. a *Myrinis* palporum articulo secundo capite brevior, tertio longo aciculari arcuato antennisque graciliter clavatis recedunt.

**) *Anglici auctores a cel. Horsfield usque ad felicem ejus successorem Moore sub hoc nomine diversissimas complectuntur species; hisce autem papilionibus antennis haud clavatis tam insignibus Boisduvalianum nomen „Arhopala“ aptius existimes; hoc vero nondum cum descriptione edito, in praesens Horsfieldianam denominationem retinemus.*

exteriore, posticarum fascia media maculari fuscis, dilutius cinctis, his lunulis tribus analibus atris, intus cyanescenti-cinctis.

Coll. Felder. — Affinis A. Cleandro Feld. amboinensi, appendiculo autem anali alarum posticarum viâ distincto sat diversa.

6. *Amblypodia Amphimuta* Nob.

Alis ecaudatis, supra saturate violaceo-cyaneis, ciliis fuscis, subtus brunneis, obsoletissime albido annulatis et strigatis, posticis maculis duabus analibus nigris, dense cyaneo atomatis (interiore minuta). ♂

Coll. Felder. — A. Epimutae Boisd. Moore affinis videtur.

7. *Amblypodia inornata* Nob.

Alis ecaudatis, supra nitide violaceo-cyaneis, ciliis fuscis, subtus omnino brunneis, fascia exteriore, anticarum maculis duabus cellularibus, posticarum septem in dimidio basali parum obscurioribus albido cinctis obsoletis. ♂

Coll. Felder. — In pagina inferiore alarum posticarum maculae cyaneae anales desunt.

8. *Amblypodia lycaenaria* Nob.

Alis breviter caudatis, supra dilute violaceo-caeruleis, nitidis, anguste fusco marginatis, subtus brunneis, striolis permultis albidis, posticis maculis duabus analibus nigris, plumbeo-cyanescenti cinctis. ♂

Coll. Felder. — Species colore Lycaenae Plutoni Fabr. subsimilis.

9. *Pseudolycaena Mantra* Nob.

Alis bicaudatis, supra ♂ris plumbeo-cyaneis, ♀nae saturatioribus, in utroque sexu costa apiceque late fuscis, subtus omnibus cano-brunneis, striga communi exteriore fusca, posticis maculis duabus analibus nigris, singula intus areola fulva terminata, extus plumbeo-cyanescenti cincta atomisque interjectis hujus coloris.

Coll. Felder. — P. Pseudo-Longino Doubldy accedit, sed alae posticae apud regionem analem magis elongatae et statura minor.

10. *Zemeros emesoides* Nob.

Alis repandis, posticis subrotundatis, omnibus supra in ♂re ferrugineo-, in ♀na dilute fulvis, subtus in utroque sexu palli-

dioribus, utrinque fasciis quinque parallelis subdiffusis fuscis strigaeque submarginali undata nigra.

Coll. Felder. — A. Z. Flegya Cram. jam alarum posticarum forma optime distinctus, habitu Emesidibus similis.

Abisara Nob.

Genus ab anglicis auctoribus cum Taxila Doubldy (T. Fylla, Durga) confusum, capite minore, collari distincto, antennis gracilioribus palpisque brevioribus dignoscendum.

11. Abisara Kausambi Nob.

Alis rufo-brunneis, supra anticis fascia transversa subapicali abbreviata, in ♂ re obsoleta, glauco-violascente, in ♀ na alba, posticis ocellis quatuor nigris, albo cinctis, subtus anticis strigis duabus glauco-violascentibus, in fasciam paginae superioris transeuntibus, posticis striga concolore discali ocellisque quinque atris albedo cinctis (tribus apicalibus, duobus analibus).

Coll. Felder. — A. Echerio Stoll affinis.

12. Abisara Savitri Nob.

Alis caudatis, concoloribus, rufo-brunneis (in ♀ na dilutioribus), anticis fasciis duabus exterioribus albidis, posticis cauda alba, fascia discali angulata, supra obsoleta, albida ocellisque quinque atris albo cinctis, secundo et tertio subapicalibus et multo majoribus.

Coll. Felder. — Species distinctissima, ad sectionem A. Echerii Stoll pertinens.

13. Abisara Damajanti Nob.

Alis rubris, supra immaculatis, subtus maculis discalibus cyaneis (singula maculae atrae imposita), posticis strigis quatuor submarginalibus, prima cyanea, secunda et quarta fuscis, tertia albida. ♂

Coll. Felder. — Species perpulchra A. Orphnae Boisd. valde affinis, pagina autem inferiore alarum anticarum maculis cyaneis ornata sufficienter diversa.

14. Euploea Ledereri Nob.

Alis anticis supra saturate brunneis, dimidio anteriore usque ad basin multo obscuriore, violaceo nitente, puncto costali, macula subcostali, duabus discalibus, quinque posterioribus (prima

multo majore) caeruleis, subtus punctis insuper exterioribus et marginalibus albis, posticis ibidem punctis exterioribus magnitudine decrescentibus aliisque marginalibus albis. ♂

Coll. Felder. — *Species pulcherrima, E. Nemerti* Hüb. n. (Eunicae Auct. francogall., Kadu Eschscholtz) *affinis, sed minor.*

15. *Euploea Ménétriesii* Nob.

Alis elongatis, anticis ♂ris margine interno parum convexo, supra saturate nigro-fuscis, certo situ violaceo nitentibus, stria velutina interna sat lata, ♀nae obscure brunneis, posticis in utroque sexu brunneis, supra maculis exterioribus elongatis maculisque marginalibus obsoletis albidis, subtus maculis paginae superioris distinctis albis aliisque septem discalibus subviolaceis (una in cellula).

Coll. Felder. — *E. Alcathoe* Godt. *proxima, alis autem elongatis, striae velutinae masculinae forma signaturisque feminae discrepans.*

16. *Euploea Bremeri* Nob.

Alis supra nigro-fuscis, serie communi marginali macularum albarum, anticis punctis duobus vel quatuor discalibus maculisque octo exterioribus (quarta et quinta multo majoribus) albis, posticis serie externa punctorum alborum plus minusve obsoleta, subtus omnibus fuscis, maculis exterioribus et marginalibus paginae superioris, anticis intus albidis, macula costali aliisque quatuor discalibus (una in cellula), posticis maculis sex vel septem discalibus (una in cellula) albis. ♂

Coll. Felder. — *E. Crameri* Lucas, Moore *affmissima, sed praesentia macularum marginalium alarum anticarum et exteriorum posticarum diversa.*

17. *Danaïs agleoides* Nob.

Alis fuscis, anticis stria costali, altera interna tenuibus, quatuor discalibus latioribus, maculis tribus costalibus, infra secundam harum binis elongatis, dein quinque in disco aliisque exterioribus et marginalibus seriatis subhyalinis, apice supra fusco, posticis striis septem e basi, maculis octo difformibus discalibus aliisque exterioribus inordinate biseriatis subhyalinis. ♂

Coll. Felder. — *D. Agleae* Cram. *proxime accedit, alae autem breviores et latiores.*

18. *Cirrochroa Malaya* Nob.

Alis supra fulvis, anticis apice margineque postico nigris, posticis striga discali, punctis quinque exterioribus strigisque tribus undatis nigris, subtus omnibus lilacino suffusis, fascia communi opalina, anticarum versus apicem dilatata, posticarum angusta recta, his punctis paginae superioris late ferrugineo cinctis. ♂ ♀

Coll. Felder. — C. Bajadetae Moore similis.

19. *Cirrochroa Orissa* Nob.

Alis supra saturate ferrugineo-fulvis, anticis fascia lata transversa diffusa flava trianguloque apicali adnato late nigro, posticis striga tenui discali, maculis sex exterioribus strigisque tribus submarginalibus nigris, subtus fulvescentibus, anticis fascia paginae superioris maculaque apicali in limbo fusco albidis, posticis fascia discali recta angusta strigisque binis submarginalibus opalinis, maculis nigris paginae superioris in fundo ferrugineo. ♂

Coll. Felder. — Alarum forma et signatura ab omnibus C. aequè differt.

20. *Doleschallia* *) *Pratipa* Nob.

Alis supra cervino-fulvis, anticis disco flavescente, macula grossa ad cellulae extimum limboque apicali et postico nigris, subtus cano-brunneis, nilentibus, extus virescenti variis, maculis basalibus difformibus submargaritaceis, striga communi discali tenui nigro-virescente, anticarum superius angulata, his maculis duabus costalibus albis, posticis ocellis tribus obsoletis. ♂

Coll. Felder. — D. Bisaltidae Cram. affinis, sed jam maculis paginae inferioris obsoletis et haud argenteis sat distincta.

Rhinopalpa Nob.

A Precide Hübn. Moore antennis et palpis longioribus, habitu robustiore, ramo tertio subcostali alarum anticarum longe post alae medium oriente, venaque secunda discoidali earum primae valde approximata, vix arcuata differt.

21. *Rhinopalpa fulva* Nob.

Alis supra saturate fulvis, anticis limbo, posticis margine externo nigro, his maculis quatuor posterioribus rotundatis nigris, subtus

*) De hac vide *Nova Acta Acad. Nat. Curios. Vol. XXVIII.*

omnibus nitenti brunneis, fasciis duabus basalibus fuscis, cyanescenti-cinctis, strigis binis adjacentibus undulosis cyanescentibus, tertia discali fasciaque exteriori fuscis, anticis ocellis sex, posticis quinque. ♂

Coll. Felder. — Rh. Polynicae Cram. valde affinis.

22. *Athyma Urvasi* Nob.

Alis supra nigris, subtus brunneis, utrinque fascia communi submarginali maculari alba, anticarum striga clarata cellulari cum fascia lata discali sinuata connexa, posticarum fascia basali albis. ♂

Coll. Felder. — Species egregia, nulli congeneri similis.

23. *Adolias Puseda* Moore.

♂ *Alis albo ciliatis, repandis, supra obscure fuscis, linea marginali nigra, anticarum limbo postico, posticarum limbo toto lato caeruleis, subtus pallide fulrescenti-brunneis, strigis duabus obsoletis fuscis, anticis lituris cellularibus, ut in ♀ na a cel. Moore descripta.*

Coll. Felder. — Auctor hujus speciei feminam tantum cognovit et propter signaturas in sectionem *A. Palgunae*, *Pulasarae* etc. palpis distinctissimam locavit. *A. Cocytus* Fabr. proxima autem ejus affinis est.

24. *Adolias Aruna* Nob.

Alis supra brunneis, subtus pallide flavescentibus, utrinque lituris dimidii basalis fuscis, lunulis septem magnis exterioribus albis (anali obsoleta), singula macula sagittata nigra ornata, anticarum quinque primoribus valde elongatis posticarumque quatuor inferioribus striga fusca divisis. ♂

Coll. Felder. — *A. Pulasarae* et *Palgunae* Moore similis, alarum posticarum vero signaturis primo intuitu dignoscenda.

25. *Lexias* *) *Dirtea* Fabr.

♂ *Alis supra nigro-fuscis, anticis maculis sparsis obsoletis fulvis limboque postico virescenti-griseo, posticis limbo externo late cyaneo, maculis orbicularibus aliisque binatis grossis marginalibus nigris diviso, subtus omnibus saturate fulvo-cervinis, maculis discalibus dilutioribus.*

*) De hac vide *Nova Acta Acad. Nat. Curios.* Vol. XXVIII.

Coll. Felder. — Species haec ab anglicis auctoribus cum *L. Boisduvalii* Gray confunditur, cujus feminam cl. Doubleday (*Gen. of diurn. Lep. Atlas*) optima icone expressit. Nos, permulta specimina ante oculos habentes, ♂rem fascia postica alarum anticarum latiore, ♀nam maculis ejusdem paginae flavido coloratis a *L. Boisduvalii* distinguimus.

26. *Eurytela Castelnau* Nob.

Alis inter cilia albo lunulatis, supra cyaneis, striga submarginali undata nigra, subtilus obscure brunneis, basi extusque albido variegatis, strigis tribus communibus discalibus fuscis. ♂

Coll. Felder. — Eur. *Horsfieldii* Boisd. forsitan affinis.

Dasyomma Nob.

A *Mycalesi* Westw. genus hoc oculis pilosis cellulaeque alarum anticarum longiore et angustiore recedit.

27. *Dasyomma fuscum* Nob.

Alis supra fuscis, anticis ocello caeco, posticis disco subviolaceo suffusis, ocellis binis rix distinctis, subtilus omnibus brunneis, fulvo atomatis, strigis duabus discalibus ferrugineis, anticis ocellis quatuor, posticis ocellis septem in fundo ferrugineo. ♂

Coll. Felder. — Pagina inferior hujus illi *D. Anapitae* Moore valde similis.

28. *Ismene malayana* Nob.

Alis supra fuscis, subtilus anticarum limbo costali, posticarum dimidio basali chalybaeis, his striga discali alba. ♂

Coll. Felder. — *J. Celeno* Cram. affinis.

Astictopterus Nob.

Genus vena secunda discoidali alarum anticarum ut in *Pamphila* posita, antennis autem *Ptergospidearum*.

29. *Astictopterus Jama* Nob.

Alis utrinque saturate fuscis, cervino atomatis. ♂

Coll. Felder. — A. pygmaeo Fabr. species haec in India continenti etiam occurrens, similis, sed alae breviores et latiores palporumque articulus tertius minutus.

30. *Astictopterus Sindu* Nob.

Alis utrinque fuscis, anticis fascia lata transversa subsinuata fulvo-aurantiaca. ♂

Coll. Felder. — Praecedenti affinis, sed minor pedibusque gracilioribus instructus.

31. *Pterygospipea trichoneura* Nob.

Alis utrinque fuscis, anticis maculis tredecim difformibus hyalinis, subtus aliis quoque exterioribus albidis, posticis supra venis cervino pilosis, area anali ciliisque posterioribus flavis, subtus dimidio inferiore albo, maculis elongatis discalibus nigris, ciliis posterioribus flaveolis.

Coll. Felder.

Traurige Folgen der Curpfuscherei.

Ich habe in dieser Zeitschrift (1859 pag. 371—74 und pag. 410—11) meine Ansichten über einige von Herrn Dr. Staudinger in der Stettiner entom. Zeitung (1859 pag. 140) als neu hingestellte Arten, keineswegs aber über Herrn Staudinger geäußert, mich also jedenfalls an die Sache und nicht an die Person gehalten.

Herr Staudinger dagegen veröffentlichte in der Stettiner Zeitung 1860 pag. 159 eine „Rechtfertigung“, in der er mir Dinge an den Bart warf, die nicht Jeder vertragen kann; so z. B. dass ich Behauptungen aufgestellt, die ich nicht beweisen könne: dass ich mich in leeren Vermuthungen ergangen, dass meine Angaben ins Bereich der Ideen gehörten, dass meine „Anzweiflungen“ von ihm durch Gründe widerlegt seien etc.

Der ganze Artikel zeigte von bedeutender Aufregung meines jungen Freundes und aus Mitleid mit seinem Zustande reichte ich ihm in der letzten Nummer ein sonst ganz harmloses Mittel, etwas Cremor tartari.

Leider muss ich meine Curpfuscherei bitter bereuen, denn statt Beruhigung erfolgte (Stettiner Ztg. p. 421) zuerst wirres Gefasel *), dann gänzliche Sprachlosigkeit.

Hippocrates hat wohl für derlei Fälle den Abderiten Niesswurz verschrieben, ich aber wage nicht, mein mich folterndes Gewissen noch

*) Es mag hier seine Stelle finden:

Erklärung:

Herr Jul. Lederer hat in der October-Nummer seiner entomologischen Monatschrift unter dem Titel: „Cremor tartari für Herrn Dr. O. Staudinger“, eine Art Schmähschrift gegen mich gerichtet, die, voller Persönlichkeiten und nebenbei Widersprüche, wohl nur dazu dienen soll, mir zu schaden. Indem ich es Herrn Lederer überlasse, auch fernerhin derlei Artikel gegen mich zu verfassen, und möglichst mit gesperrter Schrift in verschiedene Blätter drucken zu lassen, erkläre ich hiemit ein für alle Mal, dass ich es unter meiner Würde halte, darauf zu antworten. Diejenigen Herren Lepidopterologen aber, welche sich für die von mir in Andalusien aufgefundenen Lepidopteren interessiren sollten, verweise ich auf die Schrift, die ich im nächsten Jahre darüber herauszugeben gedenke.

Dresden.

Dr. O. Staudinger.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1860

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Felder Cajetan Freiherr von, Felder Rudolf

Artikel/Article: [Lepidoptera nova in paeninsula Malayica collecta diagnosibus instructa. 394-402](#)