

Zetterst. Ins. Lapp. 1840. 222. 2.

Aphthona Erichsoni. All. Ann. de l. Soc. ent. d. Fr.
Ser. III. t. VIII. 1860. 408. 131.

Der *H. Euphorbiae* Fab. sehr ähnlich, aber leicht unterscheidbar durch kleineren, kurz gerundeten, stark gewölbten Körper, äusserst glattes Halsschild, ohne Eindruck und ganz rothgelbe Beine. Schwarz, Flügeldecken blau, die 2 ersten Fühlerglieder und die Beine rothgelb, Halsschild sehr gewölbt und glatt; Flügeldecken stark gewölbt, schwach und fein runzlich punktirt. Hinterschienen stark gebogen.

Im südlichen Lappland von Zetterstedt, auf der Insel Gothland von Boheman gefunden.

H. curvifrons: Bach. Kf. Fn. f. N. u. M. Dtschl. III. 1856. 144. 34. — Oberseite schwarz mit bläulichem Schimmer, die drei ersten Fühlerglieder, sowie die ganzen Beine bräunlichroth; eine seichte fast gerade vertiefte Linie von Auge zu Auge, keine kiel-förmige Erhabenheit zwischen den Fühlern. Halsschild glatt, nach vorne nicht verengt, mit geraden Seiten. Flügeldecken viel breiter als das Halsschild, an den Seiten ziemlich stark gerundet, mit kaum vorragender Schulterbeule, undeutlich punktirt, mit an der Spitze beinahe abgerundeten Nahtwinkeln. $\frac{4}{5}$ '' lang.

Ein einzelnes Stück, von H. Kellner gesammelt.

(Fortsetzung folgt.)

Bücher-Anzeigen.

Von Jul. Lederer.

Annales de la Société entomologique de France. III. Serie. Tom. 8. (1860.) 4. Trimestre. Mit 4 Tafeln, einem Porträte und einem lithog. Briefe Dumeril's.

Bellier de la Chavignerie (pag. 701). Faune entomologique de Sicile. Lepidopteren Schluss. Als Anhang: *Coleoptera*, bearbeitet von Reiche, mit Beschreibung einiger neuer Arten, als: *Pachychyla quadricollis*, *Eryx Bellieri*, *Zonitis Bellieri*, *Anthonomus ornatus*, *Acalles Bellieri*, *Clytus clavicornis*, *Clythra (Macrolenes) Bellieri*, *Timarcha sicelidis*, *Adimonia sicana*. *Hemiptera* von Dr. Signoret, *Neuroptera* von Sélys-Longchamps und Hagen, von ersterem die Odonaten. *Hymenoptera* von Dr. Sichel, dabei an neuen Arten: *Cephus Bellieri*, *Cephus nigripennis*, *Scolobates nigripennis*, *Ischnoceros purgator*, *Bothrioceros europaeus* (und einen brasilianischen *Bothrioceros: americanus*), *Pompilus cingulatus*, *Pomp. nigripennis*, *Priocnemis Dahlbomii*, *Prioc. Bellieri*, *Andrena holomelaena*, *And. collaris*, *Anthophora*

uniciliata. *Diptera* von J. Bigot mit den neuen Arten: *Xyphura fulvida*, *Nemotelus maculiventris*, *Bombylus melanopygus*, *Exoprosopa Dyonisii*, *Ex. zona*, *Ex. archimedeae*, *Sphixea Bellieri*, *Lasiophthicus mecogramma*, *Phasia pulverulenta*, *Echinomyia rubidigaster*, *Exorista lateralis*.

Allard E. (p. 785.) Essai monographique sur les Galerucites anisopodes ou description des Altises d'Europe et des bords de la mer méditerranée. (Fortsetzung von pag. 39—144 des 1. Trim.)

Marseul (p. 835). Supplément à la Monographie des Histérides. (Fortsetzung von pag. 581 des III. Trimestre.)

Montrouzier (pag. 867). Essai sur la faune entomologique de la Nouvelle Calédonie et des Iles des Pins, Art, Lifu etc. (Fortsetzung von pag. 229—308.) Weitere 85 Arten Käfer aus den Gattungen *Spermophagus*, *Litocerus*, *Proscoporphinus* (n. g.), *Acanthopygus* (n. g.), *Oedecerus*, *Araecerus*, *Apion*, *Brenthus*, *Elytrocallus* (n. g.), *Pachyrhynchus*?, *Macropoda* (n. g.), *Geonemus*, *Otiorynchus*, *Sphaerorhinus*, *Geonemus*, *Elytrodon*, *Otiorynchus*, *Strophosomus*?, *Othorhinus*, *Alophus*, *Amerhinus*?, *Storeus*, *Pisodes*?, *Tylodes*?, *Prypnus*?, *Tachodes*?, *Baridius*?, *Cryphorhynchus*, *Erirhinus*, *Camptorhinus*, *Camptorhynchus*, *Arachnobas*, *Anomocerus* (n. g.), *Enthyrhinus*, *Tylodes*, *Acalles*, *Cryptorhynchus*?, *Tragopus*, *Gasterocercus*?, *Gonipterus*?, *Ithyporus*, *Ocladius*, *Sphenophorus* (Testardi Montr. = *Litophilus orizae*), *Sitophilus*, *Cossonus*, *Phloeophagus*, *Rhyncolus*, *Eumicterus*, *Alcides*?, *Nitidula*, *Gymnochila*.

Signoret (pag. 917). Faune des Hemiptères de Madagascar. (Fortsetzung von pag. 177—206.) Im Ganzen werden 195 Arten aufgezählt und zwar ausser aus den auf pag. 44 dieser Zeitschrift angeführten Gattungen noch aus folgenden: *Sphaerocoris* Burm., *Libyssa* Dalm., *Odontotarsus* Lap., *Podops* Lap., *Coptosoma* Lap., *Brachyplatys* Boisd., *Platycephala* Lap., *Picromerus* Am., *Zicrona* Am., *Micosoma* Dall., *Aethus* Dall., *Sciocoris* Fall., *Phricodus* Spin., *Dalpada* Am., *Atelocera* Lap., *Euschistus* Dall., *Mormidea* Am., *Sepina* Signoret (n. g.), *Pentatoma* Pal. de Beauvois, *Strachia* Hahn., *Coquerelia* Signoret (n. g.), *Nezaria* Am., *Rhaphigaster* Lap., *Peltagopus* Signoret (n. g.), *Aspongopus* Lap., *Oxypristis* Signoret (n. g.), *Mictis* Leach, *Physomerus* Burm., *Anisoscels* Lat., *Serinetha* Spin., *Alydus* Fab., *Leptocoris* Lat., *Phyllomorpha* Lap., *Hydara* Dall., *Gonocerus* Lat., *Clavigralla* Spin., *Acanthocoris* Am., *Chaerommatus* Am., *Corysus* Fall., *Lygaeus* Fab., *Atractophora* Stål, *Lethaeus* Dall.?, *Aphanus* Lap., *Rhyparachromus* Curt., *Plociomerus* Say, *Xylocoris* Duf., *Dermatinus* Stål, *Odontopus* Lap., *Piezodera* Signoret (n. g.), *Dysdercus* Am., *Monanthia* Pell. et Serv., *Tingis* Fab., *Mezira* Am., *Aneurys* Curtis, *Epidodera* Westw., *Peirates* Od.-Serv., *Rasahus* Am., *Tetroxia* Am., *Glymmatophora* Stål, *Cleptria* Stål, *Phonactomus* Stål, *Diaspidius* Westw., *Montina* Am., *Sycanus* Am., *Helenotus* Am., *Harpactor* Lap., *Darbanus* Am., *Hammatoscelis* Signoret (n. g.), *Leptogaster* Sign., *Conorhinus* Lap., *Lophocephala* Lap., *Sastrapada* Am., *Halobates* Eschsch., *Mononyx* Lap., *Naucoris* Geoff., *Macro-*

coris Sign. (n. g.), *Ranatra* Fab., *Sigara* Fab., *Anisops* Spin. Auf den beigegebenen 2 illum. Tafeln (pl. 13 und 14) sind 14 der neuen Arten abgebildet.

Lucas H. (pag. 973.) Observation sur un genre nouveau d'Arachnide Trachéenne, *Scotolemon* Lespesii, qui habite les Grottes de l'Ariège.

Derselbe. (pag. 984.) Note sur le *Scotolemon* Leprieurii, nouvelle espèce, qui habite la grotte de l'Ourse (Buco del orso) en Lombardie. Beide Arten auf Taf. 16 vergrößert abgebildet.

Martin M. (p. 989.) Rapport sur l'excursion provinciale, faite à Besançon, Pontarlier et Jougne en Juin 1860. Diese von 15 Mitgliedern der Société entomologique unternommene Excursion fiel nach der dem Aufsätze beigegebenen Liste von Coleopteren und Lepidopteren wenig ergiebig aus; von letzteren dürfte die auf dem Mont d'Or gesammelte *Seric. (Penth.) astrana* Guen. am ersten Erwähnung verdienen.

Auf pag. 1011 wird noch 1. zur Subscription auf ein Register über sämtliche von 1832—1860 erschienenen Annalen eingeladen, mit dessen Redaction Herr Arias Teijeiro betraut und dessen Preis auf wenigstens 20 Francs bemessen ist; wird 2. zu einem im Juli stattfindenden entomologischen Ausfluge nach Chambéry und die Gebirge von Savoyen eingeladen und 3. angezeigt, dass von den Annalen mit 1861 eine neue, die IV. Serie, begonnen wird, die sich durch compressern Druck auszeichnen und daher nicht so dicke Bände, wie die letzteren Jahre nöthig machen soll.

Aus dem Bulletin (Octbr.—Decbr.) wäre aus den verschiedenen Mittheilungen hervorzuheben: die Nachricht von Gautier des Cottés, dass die algierische *Feronia (Poecilus) aeraria* Coquerel et Fairm. auch um Cadix und in anderen Gegenden Spaniens vorkomme und die Beschreibungen von *Bolboceras excavatus* (v. Senegal) und *Otiorhynchus Raymondi* (aus den Basses-Alpes) von demselben Autor.

Annales de la Société entomologique de France. IV. Serie. Tom. I. 1861. 1. Trimestre. Mit 4 Tafeln.

Dufour Léon (pag. 1). Sur l'*Epeira sericea* et le *Pompilus croceicornis*. Beide von seinem Sohne auf der Cap-Vert'schen Insel St. Vincent erbeutet. Sur l'*Euchalcis Miegii*, nouveau genre et nouvelle espèce de Chalcidite (aus Madrid) et sur quelques autres Hymenoptères de ce même genre. (*Euch. hematomera* Duf. aus Madrid, *Euch. vetusta* Duf. aus Saragossa, *Euch. Dargelasii* Lat. aus Südfrankreich und Madrid.) Sur une nouvelle espèce d'*Astata*. (*Astata Miegii* Duf. aus Madrid, Barcelona, Ferrol.) Sur une nouvelle espèce de *Bembex*. (*Bemb. bipunctata* Duf. aus Madrid.) Sur une nouvelle espèce de *Cephus*. (*Cephus nigripennis* Sichel aus Madrid.) Sur une nouvelle espèce de *Phalangopsis* (*Phal. Linderi* Duf. aus den Höhlen der Pyrenäen.) Dankschreiben für seine Ernennung zum Ehrenmitgliede der Société entom. — Nekrolog des 1859 zu Madrid verstorbenen Prof. Mieg.

Doumerc Dr. (pag. 21.) Observations sur divers points d'Entomologie. Es werden zwei Arten: *Botys cobealis*, deren Raupe auf *Cobea scandens*

gefunden wurden und *Oecoph. telatella*, die in Ställen in alten Spinnengeweben leben soll, beschrieben, jedoch in einer so ungenügenden Weise, dass ein Urtheil darüber, welche Art etwa gemeint sein könnte, eine pure Unmöglichkeit ist.

Bellier de la Chavignerie (p. 29). Description de trois Lepidoptères nouveaux de l'île de Corse: *Mamestra sylvatica*, *Ellopiä pinicolaria*, *Liodes benesignata*. Die erste Art hatte ich zur Ansicht in Händen und ist den nackten Augen zufolge eine *Hadena* aus der Verwandtschaft der *Maillardi*, die zweite ist der Abbildung und Beschreibung nach gewiss nur Varietät von *prasinaria*, die dritte sah ich ebenfalls und scheint mir von *tibiaria* sicher verschieden.

Derselbe (pag. 31). Sur une lepidoptère hermaphrodite (*Chelonia Latreilli*). Links männlich, rechts weiblich.

Bruand d'Uzelle (p. 33). Note sur quelques espèces du genre *Pterophorus*, nämlich: *Pt. ischnodactyla*, *brunneodactyla*, *laetidactyla*, *Millieridactyla* und *baptodactyla*. Ganz abgesehen von der komischen und obendrein weiblichen Zwangsendung gegenüber einem männlichen Gattungsnamen wird dieser Artikel auch zur Aufklärung über die mit *Pt. trichodactylus* verwandten Arten nichts beitragen, denn *brunneodactylus* z. B., den ich von Herrn Bruand selbst erhielt, weiss ich nicht von dieser Art zu unterscheiden, über das dixaine d'espèces dagegen, das man nach Herrn Bruand's Meinung als Varietäten verbinden kann, hätte Herr Bruand früher das Nöthige in Zeller's Monographie der *Pterophoridae* nachlesen sollen, bevor er ein solches Urtheil abgibt.

Guenée (p. 39). Etudes sur le genre *Lithosia*, als: *Lith. cereola* Hb., *unita* S. V. (*aureola* Hb., Ochsh., welche = *unita* S. V. Esp., Hb. Bkh., Fuessly und Schrank sein soll,) *pallifrons* Z., *marcida* Mann, *luteola* S. V., *pygmaeola* Doubl. (mir fremd, nach Guenée selbst vielleicht nur *pallifrons* Var.), *palleola* Hb., *Beckeri Menétries* (Südrußland), *arideola* Hering, *caniola* Hb., *costalis* Z., *complanata* L., *molybdaeola* Guen. (aus England, soll mitten zwischen *complanata* und *plumbeola* stehen), *plumbeola* Hb., *griseola* Hb., mit der Var. *stramineola* Doubl., *deplana* Esp. (*depressa*, welcher Name bleiben muss, weil unter dem Namen *deplana* das Männchen von *L. quadra* von Linné beschrieben ist).

Signoret Dr. (pag. 55.) Description de quelques Hemiptères nouveaux. *Elvisura Spinolae* Sign. (Indien), *Spartocera trilineata*, *Molchina spinosa* Sign., *Sundara flavicollis* Sign., *Sund. acutus* Sign. (alle aus Peru) *Hiracia lacerdae* Sign. (Borneo), *Hir. Walkeri* Sign. (Indien), *Acrometopum senegalense* Sign. (Indien).

Montrouzier (p. 59). Essai sur la Faune entomologique de la Nouvelle — Calédonie etc. Es werden hier 52 Hemipteren aus verschiedenen Gattungen beschrieben. Die Beschreibungen sind von Signoret durchgesehen, mit den Typen verglichen und verbessert.

Leprieur C. E. (p. 75). De l'emploi de l'alcool saturé d'acide arsénieux pour la conservation des collections entomologiques.

Sichel Dr. (pag. 85). Courtes remarques sur les moyens de conserver

les collections entomologiques. Als bestes Mittel empfiehlt Herr Dr. Sichel in erster Linie gut schliessende Behältnisse, guten trockenen Standort und gute Aufsicht, jedenfalls Dinge, die sich von selbst verstehen; sodann Benzin. Ich habe letzteres selbst oft bei inficirten Gegenständen, besonders Käfern, angewandt und meist bloss auf den Boden der Laden gegossen; das Mittel hilft nicht auf einmal, auf mehr- (etwa 3—4-) maliges Wiederholen aber gewiss.

Reiche L. (pag. 87). Sur quelques espèces de Coleoptères du Nord de l'Afrique. *Pimelia Lucasii* Reiche, *Pim. papulenta* Reiche, *Blaps Strauchii* Reiche, *Blaps propheta* Reiche, *Helops aenescens* Reiche, *Urodon testaceipes* Reiche, *Anoplistes oblongomaculatum*, *Lema purpuricollis* Reiche.

Aubé Dr. (pag. 93). Description de quatre nouvelles espèces de Coleoptères, appartenant à un genre nouveau. *Theca* (zwischen *Xyletinus* und *Dorcatoma*) *pellita* (aus Algier), *pilula* (aus Südfrankreich und Algier), *byrrhoides* (aus Südfrankreich), *andalusiaca* (aus Andalusien) und *raphaelensis* (ohne Vaterlandsangabe).

Gautier des Cottés (pag. 97). Description de cinq nouvelles espèces de Coleoptères propre à la faune française. *Carabus glacialis* (v. Abriès und la Monte, auch vom Monte Rosa) ob nicht doch *depressus* Var.?, *Haliphus transversalis* (Hyères), *Omius Raymondi* (Hyères), *Trachyploeus spinosulus* (St. Raphael), *Mitomermes Raymondi* (eben daher).

Lucas H. (p. 101). Note sur une nouvelle espèce de Lamellicorne phyllophage (*Pachydema Lethierryi*), qui habite les possessions françaises du Nord de l'Afrique. In der Umgebung von Bathna von Lethierry entdeckt.

Derselbe (pag. 104). Description du *Mallaspis Moreletii* (male). Aus Vera-Paz. Lucas berichtet, dass er in den Annales 1851 pag. LXV. fälschlich das Weibchen als Männchen beschrieb.

Fairmaire et Germain (pag. 103). Revision des Coleoptères du Chili. 1. supplement aux Cerambycidae. Beschrieben werden *Hephestion nigricornis*, *H. concolor*, *H. violaceipennis*, *Necydalopsis cyanipennis*, *Callisphyris vespa*, *Stenorhopalus rugosus*, *Chenoderus bicolor*, *Ch. venustus*, *Ch. octomaculatus*, *Callidium globithorax*.

Chaudoir (pag. 109). Revision du genre *Agra*, d'après les espèces de la collection. Es werden 73 Arten beschrieben.

Derselbe (pag. 139). Description de nouvelles espèces des genres *Tricondyla* et *Therates*. *Tric. varicornis* und *punctulata* (von Wallace entdeckt), *Ther. bidentatus* (von demselben) und *Th. Dejeanii* (von Java und Borneo).

Marseul S. A. de (pag. 141). Supplément à la Monographie des Histérides. (Fortsetzung von pag. 835 des IV. Trim. 1860.)

Aus dem Bulletin ist hervorzuheben:

Pag. XI. Fairmaire's Beschreibung von *Phytoecia Grenieri*, von Grenier bei Collioure entdeckt und *Cryptocephalus inexpectus*, um Toulon von Martin gefunden.

Pag. CXV. Nachricht vom Abbé Chapelier aus Mustapha Inferieur lès-Alger über die Lebensweise des *Callicnemis Latreillei*. Das Thier liebt die sandigen Küsten des Meeres und hält sich unter den bei Ueberschwemmungen von den Flüssen fortgeführten und in den Sand vergrabenen Holztheilen und Abfällen auf, wo um Ende März und Anfangs April der Käfer noch mit Larven untermischt gefunden wird.

Verantwortliche Redacteurs: Julius Lederer und Ludwig Miller.

Gedruckt bei Karl Ueberreuter, Alservorstadt Nr. 146.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1861

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Bücher-Anzeigen. 292-296](#)