

brasiliensem in alis posticis eadem praebere discrimina (ut Cramerus optima icone expressit) et *H. Lenam* in regionibus fluminis Amazonum superioribus similiter transformari, ut *H. Astyoche* Erichs. (Cf. Hew. Exot. Butfl. Vol. II. gen. tab. Fig. 2).

148. *Haetera Lamia* Sulz. (*Dindymene* Cram.)

Tristis casus, quod e regione fluminis Negro marem solum, e Surinamia vero feminam tantum recepimus et cel. Cramer hanc solam icone delincauit. A speciminibus Brasiliae centralis (Bahiae), quae propriam constituunt varietatem, multum discrepant nostra. Plaga alarum anticarum viridi nitens multo minor, strigae fuscae supra distinctiores, alae posticae extus obscure violaceo-fuscae, puncta earum alba majora et indistincte fusco limbata.

(Concludetur.)

Novae Helomyzidarum in Europâ viventium species,

descriptae ab H. Löw.

Gen. I. *Helomyza* (setâ humerali nullâ).

1. *H. inornata*, testacea, pleurarum dimidio superiore et scutello toto hirtis, setâ antennarum pilosâ, apicibus venarum longitudinalium non fusco-limbatis. $2\frac{1}{2}$ lin.
2. *H. variegata*, lutea, abdomine nigro-fasciato, pleurarum dimidio superiore hirto, setâ antennarum pilis longis plumatâ, maculâ subapicali alarum permagnâ fusca. $2\frac{1}{3}$ lin.
3. *H. foeda*, lutea, thoracis dorso et scutello praeter marginem nudo ex cinereo subfuscis, pleurarum dimidio superiore hirto, setâ antennarum pilis mediocribus plumatâ. $3\frac{1}{2}$ lin.
4. *H. pectoralis*, ex testaceo flava, scutello praeter marginem nudo, pleurarum dimidio superiore hirto, setâ antennarum pilis mediocribus plumatâ. $3\frac{1}{6}$ lin.
5. *H. hispanica*, ex fusco testacea, hypopygio permagno flavo, setâ antennarum pilis longissimis plumatâ, pleurarum dimidio superiore nudo, femoribus intermediis setas aliquot validas gerentibus. $3\frac{1}{4}$ lin.
6. *H. laevifrons*, flava, fronte nitidâ, setâ antennarum breviter plumatâ, pleurarum dimidio superiore nudo, venis transversis venarumque longitudinalium apicibus fusco limbatis. $2\frac{1}{3}$ lin.
7. *H. pilimana*, testacea, thoracis lineâ mediâ subfuscâ, setâ mystacinâ utrinque unicâ, setâ antennarum pilosâ, scutello subnudo,

- dimidio pleurarum superiore prorsus nudo, venis transversis venarumque longitudinalium apicibus anguste fusco limbatis, pilis in metatarso maris antico longissimis. $2\frac{1}{3}$ lin.
8. *H. Zetterstedti*, flava, nitens, alis immaculatis, setulis costae brevissimis. $2\frac{1}{3}$ lin.
9. *H. montana*, flava, opaca, setâ antennarum pilosâ, genis angustis facieque albidis, alis immaculatis, setulis costae longis varioribus. $2\frac{1}{3}$ lin.
10. *H. vaginata*, flava, opaca, setâ antennarum pilosâ, genis latis et facie subflavicantibus, scutello piloso, pleurarum dimidio superiore prorsus nudo, alis immaculatis, venâ transversâ posteriore tamen obsolete fusco limbata, ultimo abdominis foeminae segmento elongato. $2\frac{7}{12}$ lin.
11. *H. parva*, testacea, abdomine nigricante, setâ antennarum brevissime puberula, scutello rare piloso, pleurarum dimidio superiore prorsus nudo, pedibus testaceis, alarum venis transversis venarumque longitudinalium apicibus anguste fusco limbatis, hypopygio maris magno. 2 lin.
12. *H. femoralis*, subfusca, abdomine femoribusque nigris, setâ antennarum brevissime puberulâ, scutello rare piloso, pleurarum dimidio superiore prorsus nudo, alarum venis transversis venarumque longitudinalium apicibus anguste fusco limbatis, hypopygio maris parvo. $2\frac{5}{6}$ lin.

Gen. II. *Allophyla* (setâ humerali, sed setâ supra coxas anticas nullâ).

Gen. III. *Scoliocentra* (calcaribus tiliarum intermediarum incurvis).

Gen. IV. *Crymobia* (venâ auxiliari perlongâ, setis scutelli sex).

13. *Cr. hiemalis*, tota ex nigro cinerea, halteribus fuscis. $2\frac{1}{12}$ — $3\frac{1}{3}$ lin.

Gen. V. *Eccoptomera* (oculis minutissimis, setâ antennarum perlongâ, tibiis intermediis supra non spinosis).

14. *Ecc. ornata*, testacea, abdomine praeter apicem nigro, venis alarum transversis nigro limbatis $2\frac{1}{4}$ lin.
15. *Ecc. filata*, tota flava, tertio antennarum articulo nigro, setâ longissimâ, alis immaculatis, femoribus posticis maris infra apophysi magnâ basali instructis. $1\frac{1}{2}$ lin.

16. *Ecc. excisa*, thorace obscure cinereo, abdomine latericio, interdum praeter apicem subcinerascens, scutello pedibusque luteis, femoribus maris posticis infra prope basim profunde excisis. 2 lin.
17. *Ecc. emarginata*, cinerea, apice abdominis pedibusque luteis, tibiatarum posticarum maris apice dilatato. 2 lin.
- Gen. VI. *Oecotheca* (tibiis intermediis supra spinosis).
18. *Oec. praecox*, testacea, thoracis dorso segmentorumque abdominalium singulorum basi cinerascens, antennis rufis. $2\frac{1}{2}$ lin.

Gen. VI. *Blepharoptera*.

19. *Bl. spectabilis*, cinerea, antennis rufis, abdomine latericio, pleurarum dimidio inferiore subtiliter pubescente. $3\frac{1}{3}$ lin.
20. *Bl. flavicornis*, cinerea abdomine latericio, antennis flavis, setulis costae brevissimis. 2 lin.
21. *Bl. variabilis*, flava, thoracis dorso et abdomine praeter apicem pallide cinereis, setulis costae raris, hypopygio maris magno. $1\frac{3}{4}$ lin.
22. *Bl. cineraria*, ex flavo cinerea, antennis et abdominis apice latericiis, humeris et scutello flavicantibus, pedibus flavis. $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{6}$ lin.
23. *Bl. crassipes*, mediocris, obscure cinerea, hypopygio magno pedibusque testaceis, pectore infra coxisque pilosissimis. $2\frac{1}{2}$ lin.
24. *Bl. pusilla*, minuta, cinerea, hypopygio pedibusque ex testaceo flavis, pectore infra coxisque modice pilosis. $1\frac{1}{2}$ lin.

Gen. VIII. *Heteromyza*.

- Gen. IX. *Tephrochlamys* (tribus setarum paribus in medio thoracis dorso).
25. *T. magnicornis*, antennis ex fusco rufis, articulo tertio magno, stigmate alarum perlongo. $2\frac{11}{12}$ lin.

Verantwortliche Redacteurs: **Julius Lederer** und **Ludwig Miller**.

Gedruckt bei **Karl Ueberreuter**, Alservorstadt Nr. 146.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1862

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Loew Hermann

Artikel/Article: [Novae Helomyzidarum in Europa viventium species. 126-128](#)