

brasiliensem in alis posticis eadem praebere discrimina (ut Cramerus optima icona expressit) et *H. Lenam* in regionibus fluminis Amazonum superioribus similiter transformari, ut *H. Astyoche* Erichs. (Cf. Hew. Exot. Buttfl. Vol. II. gen. tab. Fig. 2).

148. Haetera Lamia Sulz. (*Dindymene* Cram.)

Tristis casus, quod e regione fluminis Negro marem solum, e Surinamia vero feminam tantum recepimus et cel. Cramer hanc solam iconem delincavit. A speciminibus Brasiliae centralis (Bahiae), quae propriam constituunt varietatem, multum discrepant nostra. Plaga alarum anticarum viridi nitens multo minor, strigae fuscae supra distinctiores, alae posticae extus obscure violaceo-fuscae, puncta earum alba majora et indistincte fusco limbata.

(Concludetur.)

Novae Helomyzidarum in Europâ viventium species, descriptae ab H. Löw.

Gen. I. *Helomyza* (setâ humerali nullâ).

1. *H. inornata*, testacea, pleurarum dimidio superiore et scutello toto hirtis, setâ antennarum pilosâ, apicibus venarum longitudinalium non fusco-limbatis. $2\frac{1}{2}$ lin.
2. *H. variegata*, lutea, abdomine nigro-fasciato, pleurarum dimidio superiore hirto, setâ antennarum pilis longis plumatâ, maculâ subapicali alarum permagnâ fusca. $2\frac{1}{3}$ lin.
3. *H. foeda*, lutea, thoracis dorso et scutello praeter marginem nudo ex cinereo subfuscis, pleurarum dimidio superiore hirto, setâ antennarum pilis mediocribus plumatâ. $3\frac{1}{2}$ lin.
4. *H. pectoralis*, ex testaceo flava, scutello praeter marginem nudo, pleurarum dimidio superiore hirto, setâ antennarum pilis mediocribus plumatâ. $3\frac{1}{6}$ lin.
5. *H. hispanica*, ex fusco testacea, hypopygio permagno flavo, setâ antennarum pilis longissimis plumatâ, pleurarum dimidio superiore nudo, femoribus intermediis setas aliquot validas gerentibus. $3\frac{1}{4}$ lin.
6. *H. laevifrons*, flava, fronte nitidâ, setâ antennarum breviter plumatâ, pleurarum dimidio superiore nudo, venis transversis venarumque longitudinalium apicibus fusco limbatis. $2\frac{1}{3}$ lin.
7. *H. pilimana*, testacea, thoracis lineâ mediâ subfuscâ, setâ mystacinâ utrinque unicâ, setâ antennarum pilosâ, scutello subnudo,

dimidio pleurarum superiore prorsus nudo, venis transversis venarumque longitudinalium apicibus anguste fusco limbatis, pilis in metatarso maris antico longissimis. $2\frac{1}{3}$ lin.

8. H. *Zetterstedti*, flava, nitens, alis immaculatis, setulis costae brevissimis. $2\frac{1}{3}$ lin.
9. H. *montana*, flava, opaca, setâ antennarum pilosâ, genis angustis facieque albidis, alis immaculatis, setulis costae longis varioribus. $2\frac{1}{3}$ lin.
10. H. *vaginata*, flava, opaca, setâ antennarum pilosâ, genis latis et facie subflavanticibus, scutello piloso, pleurarum dimidio superiore prorsus nudo, alis immaculatis, venâ transversâ posteriore tamen obsolete fusco limbata, ultimo abdominis foeminae segmento elongato. $2\frac{7}{12}$ lin.
11. H. *parra*, testacea, abdomine nigricante, setâ antennarum brevissime puberula, scutello rare piloso, pleurarum dimidio superiore prorsus nudo, pedibus testaceis, alarum venis transversis venarumque longitudinalium apicibus anguste fusco limbatis, hypopygio maris magno. 2 lin.
12. H. *femoralis*, subfusca, abdomine femoribusque nigris, setâ antennarum brevissime puberulâ, scutello rare piloso, pleurarum dimidio superiore prorsus nudo, alarum venis transversis venarumque longitudinalium apicibus anguste fusco limbatis, hypopygio maris parvo. $2\frac{5}{6}$ lin.

Gen. II. *Allophyla* (setâ humerali, sed setâ supra coxas anticas nullâ).

Gen. III. *Scoliocentra* (calcaribus tibiarum intermediarum incurvis).

Gen. IV. *Crymobia* (venâ auxiliari perlongâ, setis scutelli sex).

13. Cr. *hiemalis*, tota ex nigro cinerea, halteribus fuscis. $2\frac{1}{12}$ — $3\frac{1}{3}$ lin.

Gen. V. *Eccoptomera* (oculis minutissimis, setâ antennarum perlongâ, tibiis intermediis supra non spinosis).

14. Ecc. *ornata*, testacea, abdomine praeter apicem nigro, venis alarum transversis nigro limbatis $2\frac{1}{4}$ lin.
15. Ecc. *filata*, tota flava, tertio antennarum articulo nigro, setâ longissimâ, alis immaculatis, femoribus posticis maris infra apophysi magnâ basali instructis. $1\frac{1}{2}$ lin.

16. Ecc. *excisa*, thorace obscure cinereo, abdomine latericio, interdum praeter apicem subcinerascente, scutello pedibusque luteis, femoribus maris posticis infra prope basim profunde excisis. 2 lin.
17. Ecc. *emarginata*, cinerea, apice abdominis pedibusque luteis, tibiarum posticarum maris apice dilatato. 2 lin.
Gen. VI. **Oecothaea** (tibiis intermediis supra spinosis).
18. Oec. *praecox*, testacea, thoracis dorso segmentorumque abdominalium singulorum basi cinerascentibus, antennis rufis. $2\frac{1}{2}$ lin.

Gen. VI. **Blepharoptera**.

19. Bl. *spectabilis*, cinerea, antennis rufis, abdomine latericio, pleurarum dimidio inferiore subtiliter pubescente. $3\frac{1}{3}$ lin.
20. Bl. *flavicornis*, cinerea abdomine latericio, antennis flavis, setulis costae brevissimis. 2 lin.
21. Bl. *variabilis*, flava, thoracis dorso et abdomine praeter apicem pallide cinereis, setulis costae rarissimis, hypopygio maris magno. $1\frac{3}{4}$ lin.
22. Bl. *cineraria*, ex flavo cinerea, antennis et abdominis apice latericis, humeris et scutello flavicantibus, pedibus flavis. $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{6}$ lin.
23. Bl. *crassipes*, mediocris, obscure cinerea, hypopygio magno pedibusque testaceis, pectore infra coxisque pilosissimis. $2\frac{1}{2}$ lin.
24. Bl. *pusilla*, minuta, cinerea, hypopygio pedibusque ex testaceo flavis, pectore infra coxisque modice pilosis. $1\frac{1}{2}$ lin.

Gen. VIII. **Heteromyza**.

- Gen. IX. **Tephrochlamys** (tribus setarum paribus in medio thoracis dorso).
25. T. *magnicornis*, antennis ex fusco rufis, articulo tertio magno, stigmate alarum perlongo. $2\frac{11}{12}$ lin.

Verantwortliche Redacteure: **Julius Lederer und Ludwig Miller.**

Gedruckt bei **Karl Ueberreuter**, Alservorstadt Nr. 146.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1862

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Loew Hermann

Artikel/Article: [Novaes Helomyzidarum in Europa viventium species. 126-128](#)