

An den Seiten der Grundhälfte des Schildes einige dichter schwarzpunktirte Flecke. Der Raum hinter den ziemlich breit und dicht schwarzpunktirten Winkelstrichen graugelb, vor denselben graulich. Unterseite schmutzig weissgelb, dichtschwarzbraun in Querreihen und zerstreut punktirt, mit untermischten glatten Fleckchen, die Randknoten gelblichweiss. Schenkel schwarzbraun, uneben, zerstreut klein-knotig, fein kurz beborstet, Endrand weissgelblich. Schienbeine schwarzbraun fein dicht klein stachelknotig, die obere Mittelkante schmutzig-gelblich.

β. Bisweilen ist der schwärzliche Rückenstreif und die schwarze Punktirung der Winkelstriche verloschen und nur Spuren der Zeichnung auf dem Schilder übrig.

Dieser Fall mag wohl auch bei *Ph. Flori* vorkommen und sind dann solche Exemplare wahrscheinlich die *Tetyra lapponica* Zett.

## Enumeratio

### dipterorum, quae C. Tollin ex Africâ meridionali (Orangestaat, Bloemfontein) misit.

Auctore Dr. H. Loew.

1. *Plecia ruficollis* Fabr. (= *Plecia dorsalis* Macq.). ♀
2. *Pangonia brevis* nov. sp. ♂ et ♀ — Atra, nitida, antennis, pedibus aliquo concoloribus, thorace antice punctis quatuor albis notato, colore abdominis obscure rufo apicem versus per fuscum in nigrum mutato, cellularum posteriorum primâ et quartâ clausis. Long. corp. 8 lin. — Long. al.  $7\frac{1}{4}$  lin.  
Obs. A *Pangoniâ biclausâ*, cui proxima, corpore latiore et abdominis picturâ differt; frons foeminae latior et secundus palporum articulus obscurior angustiorque quam in illâ. — A *Pangoniâ melanopyggâ* cellulâ posteriore quartâ clausâ distincta est.
3. *Pangonia ramulifera* nov. sp. ♀ — Fusca luteo-pilosa, duobus primis abdominis segmentis sordide rufis, reliquis nigris, omnibus in margine postico albo-pilosis, proboscide brevi, alis subfuscis basim versus luteis, cellularum posteriorum primâ clausâ et in apice appendiculatâ, quartâ apertâ. Long. corp.  $7\frac{1}{2}$  lin. — Long. al. 7 lin.

Obs. A *Pangoniā cafrā*, cui valde affinis, capite majore, proboscide breviore, abdominis segmentis singulis in margine postico albo-pilosis, tertio et sequentibus nigroribus et in disco maculam obsoletam trigonam, pilis pallidioribus vestitam gerentibus differt.

4. *Tabanus sericiventris* Loew. ♀

5. *Tabanus corax* nov. sp. ♀ — Totus ater, subopacus, oculis nudis, infero frontis angustae callo quadrangulo, subobsoleto, antennarum articulo primo lutiusculo, galericulato. Long. corp.  $10\frac{2}{3}$  lin. — Long. al. 9 lin.

Obs. A *Tabano noctis*, qui apicem alarum cinereum habet, alis totis atris differt.

6. *Laparus foedus* nov. sp. ♂ — Thoracis brunnei dorsum vittis tribus obsoletioribus olivaceo-brunneis signatum; antennae ex fusco nigrae; facies nigra, flavido-pollinosa; abdomen piceum, apicem versus atrum; pedes ferrugineo-brunnei, femoribus superne obscurioribus; alae latiusculae, distincte brunnescentes, basi paulo dilutiore, anteriore venae tertiae ramulo subappendiculato; setae mystacinae quatuor validae nigrae. Long. corp. 6 lin. — Long. al.  $5\frac{1}{2}$  lin.

Obs. *Laparo squalido* simillimus, antennis non rufis, sed ex fusco nigris, facie non testaceâ, sed nigrâ et alis latioribus bene distinctus.

7. *Microstylum remicorne* nov. sp. ♂ — Totum atrum, subopacum, halteribus, pulvillis, setis pilisque concoloribus, alis ex fusco nigris, venis ferrugineis; antennarum articulus tertius apicem versus modice dilatatus, stylo terminali obsoletissimo; faciei albido-pollinosae triens infimus pilis tenuibus albidis confertim barbatus. Long. corp.  $9\frac{5}{12}$  lin. — Long. al.  $6\frac{2}{3}$  lin.

8. *Microstylum lituratum* nov. sp. ♂ — Cinereum, marginibus thoracis lateralibus ex albido cinereis, abdomine nigro, marginibus lateralibus, segmentorum singulorum margine postico et ventre toto dilute cinereis; triens faciei infimus pilis confertis albis barbatus; antennarum articulus secundus, vertex, thoracis dorsum praeter margines abdominalisque segmenta, marginibus lateralibus et posticis tamen exceptis, nigro-pilosa; reliqui corporis pili et

setae albicantes; pedes pilis setisque albidis vestiti, nigris aduersus tibiarum apicem intermixtis, in tarsis plerisque nigris; alae hyalinae, secundo costae dimidio cinereo limbato cellulisque plerisque obscure cinereo litoratis. Long. corp.  $12\frac{1}{2}$  lin. — Long. al.  $9\frac{1}{2}$  lin.

**9. Microstylum dispar Loew. ♂**

**10. Xiphocerus tricolor nov. sp. ♂ et ♀** — Niger, antennis, humeris, postico thoracis limbo latissimo, scutello pedibusque rufis, abdominis segmentis secundo, tertio et quarto utrinque maculâ flavâ ornatis, sequentibus flavo-marginatis, ultimis totis flavis facies albo-pollinosa, mystace flavo sive fulvo; palpi nigro-pilosí; pleurae immaculatae; alarum dimidium basale limpidum, aduersus marginem posticum subinfuscatum, dimidium apicale fuscum, discis cellularum interdum valde elutis; vena longitudinalis quinta obscure fusco limbata; costa, vena auxiliaris, vena longitudinalis prima et prima duarum sequentium segmenta laete ochracea. Long. corp.  $6\frac{1}{4}$  lin. — Long. al.  $5\frac{1}{4}$  lin.

Synon. *Xiphocera Reynaudii* Macquart, Dipt. Exot. I. II. 48. variet.

**11. Discocephala semitestacea nov. sp. ♂** — Fusca, fusco-pollinosa, opaca, thorace non vittato, abdomine pedibusque testaceis, tarsis apicem versus fuscis, alis nigris; antennae nigrae, stylo terminali breviusculo, in apice pilis minutis nigris penicillato; mystace pilisque palporum nigrorum dilute subfuscis. Long. corp. 2 lin. — Long. al.  $2\frac{1}{4}$  lin.

Obs. Stylus antennarum penicillatus ut in *Oligopogonibus*, sed reliqua omnia ut in *Discocephalis* genuinis, a quibus non separanda.

**12. Hoplistomera nobilis Loew. ♀**

**13. Laxenecera mollis Loew. ♂**

Obs. A foeminâ differt pilis mystacis mediis fere omnibus nigris.

**14. Alcimus stenurus Loew. ♀**

Obs. Paulo minor et obscurior quam specimina a Wahlbergio missa maculisque segmentorum abdominalium mediis paulo latioribus. Tertius antennarum articulus praeter basim

testaceam ex nigro fuscus. Femoribus posterioribus infra testaceis alisque minus pure hyalinis variat.

15. **Atherix longipes** nov. sp. ♂ — Ex *Ather. crassipedis* affinibus. Fusco-nigra, tertio antennarum articulo, scutelli margine abdomineque subfulvis, primo hujus segmento praeter marginem apicalem atro, segmento secundo maculis atris ornato, segmentis tribus sequentibus atro-fasciatis, segmento sexto subtiliter atro-marginato; pedes longi, cum coxis fulvo-testacei, tibiis tarsisque anterioribus tarsisque posticis praeter basim nigris, tibiis posticis tarsorumque posticorum basi fuscis; alae infuscatae, in disco subnebulosae, stigmate fusco, furcâ venae longitudinalis tertiae perlongâ. Long. corp.  $3\frac{3}{4}$  lin. — Long. al.  $3\frac{1}{4}$  lin.
16. **Bombylius ornatus** Wied. ♂
17. **Bombylius delicatus** Wied. ♂ et ♀.
18. **Bombylius analis** Fabr. ♂ et ♀
19. **Bombylius fulvonotatus** Wied. ♂ et ♀
20. **Bombylius hypoxanthus** nov. sp. ♀ — Ater, breviter albopilosus, vittis thoracis tribus, scutello abdomineque atris, segmentis hujus tertio et quarto maculas ternas, quarto fasciam utrinque abbreviatam, quinto denique maculas duas albas gerentibus; coxae fulvo-pilosae; venter utrinque vittâ insigni albâ marginatus, praeter apicem nigro-pilosum pilis fulvis vestitus; alae hyalinae, basi et maculâ permagnâ quadrangulâ, costae subcontiguâ nigris. Long. corp.  $4\frac{1}{2}$  lin. — Long. al.  $5\frac{1}{2}$  lin.
21. **Bombylius impurus** nov. sp. ♂ — Supra niger, scutello tamen ferrugineo, infra obscure cinereus, totus pilis pallide lutescentibus vestitus, pilis setisque apicalibus scutelli ferrugineis, pilis longioribus in postico segmentorum abdominalium singulorum margine nigris; antennae nigrae, stylo terminali minuto; proboscis dimidiâ corporis longitudinem excedens, nigra; oculi contigui; pili in supero occipitis margine longi; pedes ochracei, setis concoloribus, femorum dimidio basali tarsorumque apice nigricantibus; alae hyalinae, basi et cellulâ costali sublutescentibus. Long. corp.  $4\frac{5}{12}$  lin. — Long. al.  $4\frac{1}{6}$  lin.

22. *Bombylius mundus* nov. sp. ♀ — Cinereus, duobus primis antennarum articulis, facie, palpis, scutello, lateralibus abdominis marginibus segmentorumque singulorum margine postico, ventre, coxis pedibusque flavis, totus laete flavo-pilosus, setis omnibus concoloribus; pili in supero occipitis margine breves; proboscis nigra, corpori subaequalis; tertius antennarum articulus niger, stylo terminali tenui, minuto; alae hyalinae, imâ basi flavicante. Long. corp.  $3\frac{2}{3}$  lin. — Long. al.  $3\frac{1}{2}$  lin.

23. *Eurycaenus latifrons* Loew. ♂

Obs. Mas a foemina, cui ceteroquin valde similis, oculis subcontiguis distinguitur.

24. *Systoechus fuligineus* nov. sp. ♂ — Totus ex fusco niger, scutello obscure ferrugineo, pilis confertis fuscis setisque intermixtis nigris obtectus, alis nigro infuscatis, adversus costam et basim ex fusco nigris. Long. corp.  $6\frac{1}{12}$  lin. — Long. al. 6 lin.

25. *Systoechus nigripes* nov. sp. ♂ — Niger, antennis, proboscide pedibusque concoloribus, pilis dilutissime lutescentibus laeteque albo-micantibus vestitus; alae cinereae, adversus basim et costam fuscae; oculi subcontigui; pili verticis frontisque nigri; mystax e pilis nigris lutescentibus mixtus; in thorace et in abdome pili nigri omnino nulli; pili in superiore pleurarum margine subfulvi; pedes tomento luteo setulisque nigris vestiti. Long. corp.  $3\frac{5}{12}$  lin. — Long. al.  $3\frac{5}{6}$  lin.

26. *Dischistus coracinus* nov. sp. ♂ — Totus ater, opacus, pilis nigris longioribus, sed minus confertis vestitus, halterum capitulo praeter basim albido, tibiis praeter apicem tarsorumque basi testaceis, alis hyalinis vix in imâ basi subnigricantibus, venis luteis; tertius antennarum articulus linearis; proboscis dimidio corpori subaequalis. Long. corp.  $1\frac{3}{4}$  lin. — Long. al.  $2\frac{1}{12}$  lin.

27. *Dischistus frontalis* nov. sp. ♀ — Ex cinereo niger, thoracis dorso scutelloque atris, tomento subaureo et pilis flavis vestitus, setis thoracis lateralibus setisque scutelli et marginis segmentorum abdominalium singulorum postici nigris; proboscis dimidio corpore paulo brevior, nigra; articuli antennarum nigrarum primi duo pilis flavis et nigris hirti; mystax breviusculus, fla-

vus; frons tomento aureo obtecta pilisque longioribus nigricantibus praedita, in margine antico utrinque fasciculo pilorum nigrorum ornata. Pedes flavi, femorum anteriorum basi femoribusque posticis praeter apicem nigricantibus, tarsis fuscis, setis nigris. Alae pure hyalinae, infimâ basi sublutescente. Long. corp.  $3\frac{2}{3}$  lin. — Long. al.  $3\frac{2}{3}$  lin.

**28. *Dischistus pectoralis* nov. sp. ♂** — Ater, pilis lutescentibus vestitus, pilis nigris in thoracis dorso, in pleuris et in abdomine nullis; proboscis nigra, dimidio corpore paulo brevior; barba menti nigricans, pilis tamen pallide lutescentibus permixtus; mystax prope oris aperturam lutescens, prope orbitam et prope antennas niger; antennae nigrae, pilis articulorum basarium longis nigris; oculi longe contigui; vertex, pectus, coxae excepto anticum apice femorumque basis nigro-pilosae; pedes nigri, setulis concoloribus, femorum apice tibiisque flavis, tarsorum basi testaceâ; alae hyalinae, imâ basi lutescente. Long. corp.  $2\frac{3}{4}$  lin. — Long. al. 3 lin.

**29. *Anthrax mixta* Loew. ♂ et ♀.**

**30. *Anthrax spectabilis* Loew. ♂**

**31. *Anthrax obesa* nov. sp. ♀** — Valida, obscure badia, breviter albo- et fusco-pilosa, pilis longioribus setisque in corpore toto nullis, capite rotundo, oris aperturâ minimâ, proboscide palpique brevissimis, antennarum articulo tertio in stylum producto, pedibus obscure testaceis, pulvillis nullis, alis hyalinis, cellulis costali et primâ basali fuscis, cellulis primâ submarginali et tertiatâ posteriore appendiculatis. Long. corp.  $9\frac{1}{3}$  lin. — Long. al.  $7\frac{3}{4}$  lin.

**32. *Exoprosopa venosa* Wied. ♂ et ♀**

**33. *Exoprosopa dimidiata* Macq. ♂**

**34. *Exoprosopa ignava* Loew. ♂**

**35. *Exoprosopa longipennis* Loew.**

Obs. Duo specimina accepi, alterum solitâ magnitudine, alterum giganteum, 8 lin. longum.

36. **Exoprosopa Tollini nov. sp. ♂** — Nigra, nigropilosa, capite, scutello, ventre pedibusque obscure ferrugineis, margine thoracis antico marginibusque pleurarum antico et supero rufo-pilosis, basi abdominis albo-pilosâ, segmento tertio utrinque maculâ albo-tomentosâ ornato; alae nigrae, apice sinuque postico hyalinis, cellulis submarginalibus tribus; proboscis capite longior; tertius antennarum articulus conicus, stylo terminali tenui, longissimo. Long. corp. 8 lin. — Long. al.  $9\frac{1}{12}$  lin.
37. **Baccha flavicornis nov. sp. ♂** — Aeneo-nigra, subtiliter albo-pubescent, antennis ochraceis, pedibus anticis rufis, tarsis praeter basim fuscis, pedibus posticis nigris, femorum basi rufâ, genibus tibiarumque dimidio priore luteis, tarsorum basi ex rufo badiâ, halteribus sulphureis, alis pure hyalinis, maculâ minutâ apicali et cellulâ stigmaticalî totâ atris. Long. corp.  $5\frac{1}{3}$  lin. — Long. al.  $4\frac{1}{4}$  lin.
38. **Myopa oestracea nov. sp. ♂** — Helva, opaca, maculis obscure fuscis maculisque albo-pollinosis variegata; frons ochracea; facies alba, utrinque punctis aliquot fuscis aspersa; oris apertura parva, proboscis mediocris; tertius antennarum articulus maculâ albâ ornatus; alae ex fusco cinereae; basi ochraceâ. Long. corp.  $5\frac{1}{6}$  lin. — Long. al.  $3\frac{1}{2}$  lin.
39. **Cephalomyia variolosa nov. sp. ♂** *Cephalomyiae ovis* simillima, sed major; frons latior quam in illâ; sulci faciei supra latius distantes, infra multo magis approximati; verrucae thoracis minores, scutelli rariores; segmentum costae, quod interest inter venas primam et secundam, multo longius. Long. corp.  $6\frac{1}{2}$  lin. — Long. al.  $5\frac{1}{4}$  lin.
40. **Stegosoma vinculata nov. sp. ♂** — Flava, nitens, femoribus posticis tibiisque omnibus in summo apice atris, tarsorum anticorum articulo secundo fusco, sequentibus atris, tarsorum posteriorum penultimo fusco, ultimo atro; alae hyalinae, dilutissime subflavantes, venis flavis. Long. corp. 3 lin. — Long. al.  $3\frac{1}{12}$  lin.

Obs. Novum genus, quod *Stegosoma* appellavi, a *Rhynchomyia*, cui proximum, scutello permagno inflato, abdome abbreviato tumido antennarumque setâ prorsus nudâ differt.

41. *Echinomyia obliqua* nov. sp. ♂ — Nigra, capite ex flavo albido, abdomine obscure testaceo, segmento ultimo praeter basim atro, nitido; antennae atrae; pedes nigri, tibiis testaceis, anterioribus tamen infra nigris, intermediis supra setas aliquot nigras validissimas gerentibus; alae ex nigro fuscae, basi et costae dimidiae limbo subfulvis. Long. corp.  $5\frac{2}{3}$  lin. — Long. al. 5 lin.

42. *Trypeta munda* nov. sp. ♀ — Superius testacea, inferius pallidissime flavescentia, vittis thoracis, scutelli disco, metanoto, tribusque abdominis fasciis nigro-fuscis; alae hyalinae, vittâ biarcuatâ nigro-fuscâ ornatae. Long. corp. cum terebrâ 3 lin. — Long. al. 3 lin.

Obs. *Trypetae (Hemileae) excellenti* persimilis est, sed vittâ alarum biarcuatâ latiore abdomeque trifasciato distinguitur.

43. *Trypeta fasciolata* nov. sp. ♂ et ♀ — Lutescens, vittis thoracis confluentibus, metanoto abdominisque fasciis latissimis fuscis, his in anterioribus segmentis interruptis; occiput nigro bimaculatum; superus pleurarum margo albo-vittatus, alae pure hyalinae, maculâ stigmaticalii, maculâ subapicali, strigulâ interjectâ costali fasciisque tribus angustis utrinque valde abbreviatis nigris, summo apice albicante, venâ longitudinali tertiatâ setosâ, ultimo quartae segmento arcuato. Long. corp. ♂  $2\frac{1}{2}$ , ♀  $3\frac{2}{3}$  lin. — Long. al. 3 lin.

Obs. *Trypetae (Rhacochlaenae) toxoneurae* similis et valde affinis.

44. *Argyrites melaleucus* nov. sp. ♂ — Ater, antennis, pedibus, halteribusque concoloribus, abdomine argenteo: alae albidae, venis longitudinalibus secundâ et tertiatâ apicem versus divergentibus, tertiatâ et quartâ convergentibus; frons et facies angustae, setosae. Long. corp.  $1\frac{1}{6}$  lin. — Long. al.  $1\frac{1}{6}$  lin.

Obs. Ab *Argyr. parvo* Macq. halteribus nigris alarumque setâ costali nullâ differt.

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1863

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Loew Hermann

Artikel/Article: [Enumeratio dipterorum, quae C. Tollin ex Africa  
meridionali \(Orangestaat, Bloemfontein\) misit. 9-16](#)