

## Ein Zwitter von *Bombyx pini*.

Beschrieben von **J. Lederer**.

Hiezu Taf. 1, Fig. 14.

Die rechte, etwas kleinere Seite zeigt ein vollkommenes Männchen von lebhaft rostbrauner Färbung, während wir in der linken, grösseren ein Weibchen von aschgrauer Grundfarbe und lichtbrauner Zeichnung vor uns haben. Der rechte Fühler ist männlich, der linke weiblich, der Halskragen, Rücken und Hinterleib rechts rothbraun, links heller und zwar derart, dass die rechte Seite des Halskragens und die rechte Schulterdecke rothbraun, die linke Seite des Halskragens sammt Schulterdecke und dem übrigen Rücken graubraun erscheint. Auch der Hinterleib ist bis zum vorletzten Gelenke rechts rothbraun, links gelbbraun, dann breitet sich erstere Farbe über das ganze Gelenk aus. Der Zeugungsapparat scheint mir, so weit sich diess in der Behaarung ohne Abschuppung ausnehmen lässt, vollkommen männlich, aber kleiner und verkümmerter zu sein.

Es wurde dieser Zwitter von Herrn Heinrich Sander in Wien erzogen.

## Ein neuer Grottenkäfer aus der Gruppe der Scaritiden

beschrieben von **L. Miller**.

Hiezu Taf. 1 Fig. 15.

### *Spelaeodytes* n. g.

Caput modice elongatum, antice bisulcatum.

Oculi nulli.

Palpi maxillares articulo ultimo elongato, acuminato.

Antennae pilosellae, articulo secundo tertio duplo longiore, tertio et quarto longitudine aequalibus, sequentibus breviter ovatis, ultimo obtuse acuminato.

Mandibulae tenues, acutae.

Prothorax convexus, apice truncatus, lateribus rotundatus.

Coleoptera prothoraci pedunculo mesothoracis affixa, illo duplo latiora, ovalia, lateribus explanatis.

Tibiae anticae intus emarginatae, extus bidentatae, apice digitatae.