

# WIENER Entomologische Monatschrift.

Redaction und Expedition:

Landstrasse, Gärtnergasse Nr. 20.

In Commission bei

Carl Gerold's Sohn, Stadt Nr. 625.

Nr. 5.

VII. Band.

Mai 1863.

## Lepidopterologische Mittheilungen.

Von H. D. J. Wallengren.

### III.

1. *Syrichtus ferax* n. sp. alis supra nigricante fuscis serie duplci communi punctata intramarginali alba, serie exteriore in ciliis anastomosante; anticis supra maculis majoribus difformibus albis, in disco sparsis; posticis supra punto baseos maculaque maxima transversa disci albis; anticis infra fuscis, margine antico apiceque albicante flavo-viridibus maculisque albidis discoidalibus; posticis infra albicante flavo-virescentibus costis concoloribus, fasciis 3 continuis pallidioribus margineque interno late albo, immaculato. ♀

Species inter *S. vindicem* et *galbam* quasi intermedia, sed ab illa serie intramarginali punctorum alborum duplci partis superioris alarum et ab hac colore partis inferioris mox dignoscitur. In territorio fluminis Kuisip Africae legit Wahlberg.

### Parasa n. gen.

(Fam. *Setiariae*.)

Antennae extrorsum crassiores, subclavatae; clava arcuata fasciculo apicali piloso minuto instructa. Pedes postici usque in tarsis abunda et longe pilosi. Costae duae e latere posteriore cellulae orientis. Costa 2. al. post. ex angulo anteriore cellulae egrediens, biramosa. Costa 2. al. ant. e latere posteriore et costa 3—4 ex angulo posteriore cellulae orientes; costae 8—9 ita approximatae, ut costam unicam biramosam fere forment. Alae squamatae.

2. *P. aureosquamata* n. sp. antennis nigris, violaceo-submicantibus, hinc inde argenteo-squamatis; palpis fulvis; capite thoraceque

fulvescentibus; abdomine nigro, violaceo-subnigra; tibiis, tarsisque pedum posticorum pilis lateris exterioris fulvis, sed pilis lateris interioris nigris; alis anticis supra nigro-fuscis, aureo-squamatis, posticis nigro-fuscis, violaceo-nitentibus. Exp. al. 35 millim.

In Caffraria orientali.

**Anaudia** n. gen.

(Fam. *Setiariae*.)

Antennae extrorsum crassiores, apice recurvo, fasciculo piloso minuto. Pedes postici squamosi, pilis brevissimis vestiti; tarsi eorum nudi. Costa unica e latere posteriore cellulae al. post. egrediens. Costa 2. al. post. ex angulo anteriore cellulae oriens, simplex. Costae 2—3. al. ant. e latere posteriore et costa 4. sola ex angulo anteriore cellulae orientes. Costae omnes al. ant. simplices. Costae 1—2. al. post. distantes; costa 4. biramosa. Lingua fere nulla. Fasciculus analis distinctus. Alae omnes squamatae.

3. **A. Felderi** n. sp. antennis fuscis, infra albidis; palpis fronteque albis; vertice nigro, thorace nigro macula humerali alba fasciisque 2 longitudinalibus obsoletis pallidis; abdomine nigro, cingulo gracili albido; tibiis posticis macula alba; alis anticis supra fuscis squamulis griseis hinc inde sparsis maculisque seriatis posticis utrinque griseis; posticis utrinque nigro-fuscis. Exp. al. 20 millim.

In territorio lacus N' Gami legit Wahlberg.

**Gen. Thyretes** Boisd.

4. **Thyretes caffra** n. sp. fronte alba; thorace griseo-fusco; collari albo; abdomine supra fusco, punctis dorsalibus flavis uniseriatis, infra cinereo serie macularum laterali alba; alis anticis fuscis, maculis 8 albo-hyalinis, posticis 5 fasciam continuam, in apicem excurrentem, constituentibus; posticis albo-hyalinis maculo anguli analis margineque tenuissime fuscis. ♂ Exp. al. 30 millim.

In Caffraria orientali et in territorio fluminis Kuisip invenit Wahlberg.

**Epitoxis** n. gen.

(Fam. *Syntomidae*.)

Antennae infra longius pectinatae. Palpi brevissimi, hirsuti, fere abortivi. Lingua fere nulla. Calcaria pedum posticorum 4. Costae

alarum posticarum 5. Cellula al. post. distincta. Costa 7. al. ant. quadriramosa, e latere anteriore cellulae nec ex ejus angulo anteriore oriens. Costula transversa, cellulam al. ant. claudens, spuria, recta. Costae alarum omnium ceteroquin ut in gen. *Syntomis*. Typus generis: *Thyreutes amazonula* Boisd. Voyage de l'Afr. austr. par Deleg. II. 597. 126.

### *Buthysia* n. gen.

(Fam. *Syntomidae*.)

Antennae in medio incrassatae, infra breviter pectinatae l. serratae. Palpi breves, squamato-pilos. Lingua crassa, sat longa. Calcaria ped. post. 4. Cellula al. post. distincta. Costa 7. al. ant. quinqueramosa, e latere anteriore nec ex angulo anteriore cellulae oriens. Costula transversa, cellulam al. ant. claudens, spuria, tenuissima, fere recta. Costae al. post. 4, sed al. ant. tantum 8.

5. *B. sangaris* (Dalm.) antennis fuscis, apicem versus albis; capite nigro, fronte fulva; collari fulvo; thorace nigro, macula scopoliarum fulva; abdomine fusco, macula baseos marginalibusque segmentorum late fulvis; pectore fusco macula laterali fulva pedibus fuscis; alis nigro fuscis, anticis maculis 7 flavicante albido-hyalinis; posticis macula maxima baseos flavo-hyalina maculisque 2 posticis coadunatis albido-hyalinis.

*Zygaena sangaris* Dalm. Mus. Holm.

Ex insula Java.

### *Asinutea* n. gen.

(Fam. *Syntomidae*.)

Antennae in medio crassiores, infra breviter pectinatae l. serratae. Palpi breves, hirsuti. Lingua brevis. Calcaria ped. post. 4. Costae al. post. 5. Cellula al. post. distincta. Costa 7. al. ant. triramosa, e latere antico nec ex angulo anteriore cellulae oriens. Costula transversa, cellulam al. ant. claudens, spuria, tenuissima, recta. (Costae al. omnino ut in genere praecedente, sed anticarum 9. costa 8. non procul a costa septima e latere anteriore cellulae et costa 9. e basi orientes.) Abdomen subdepressum, hirsutum, aequo fere latum. Alae latiores, subrotundatae.

6. *A. atricornis* n. sp. antennis, corpore toto pedibusque nigris; alis nigris, anticis maculis discoidalibus 2 maculisque 3 posticis albo-

hyalinis; posticis macula baseos aurantiaca maculaque postica rotundata alba, subhyalina. Exp. al. 25 millim.

Habitat in Caffraria orientali. Wahlberg.

### Ceryx n. g.

(Fam. *Syntomidae.*)

Antennae simplices, in medio crassiores. Palpi brevissimi, hirsuti, debiles. Lingua brevissima, abortiva, haud ulla. Calcaria ped. post. 4. Costae al. post. 3. Cellula al. post. aperta (nulla). Costa 7. al. ant. quadriramosa. (Alae graciles, posticae breves. Costa 1. al. post. e basi libera, prope marginem alae; costa 2. etiam e basi libera, extra medium alae biramosa et 3. e basi simplex. Costae al. ant. 8. costa 1. e basi, 2.—3. e latere posteriore, 4.—5. ex angulo posteriore, 6. ex angulo anteriore et 7. e latere anteriore cellulae, sed 8. iterum e basi orientes. Cellula discoidalis al. ant. fere aperta.)

*Naclia thyrotiformis*, *N. anthraciformis* et *N. fuscicornis* Wallengr.

Wiener Ent. Monatschr. 1860 Nr. 2 sunt species hujus generis.

### Pletura n. g.

(Fam. *Cocliopodes.*)

Antennae maris a basi usque ad medium sat longe bipectinatae deinde simplices et infra dentibus brevissimis armatae; feminae simplices. Palpi sat longi, recti, porrecti, squamato-pilos; articulus ultimus brevissimus. Alarum margines rotundati. Areola inventitia al. ant. nulla, Costa 8. al. ant. simplex, sed costa 9. biramosa. Cellula al. bipartita. Partes cellulae discoidalis al. post. aeque longae. Costa 1. al. post. erga basin libera, sed costula transversa obsoleta cum cellula intra angulum ejus anticum connexa. Costae 2—3. al. post. et costae 8—9. al. ant. ex angulo anteriore cellulae orientes. Lingua fere nulla. Calcaria ped. post. 4.

*Heterogenea squamosa* Wallengr. Wien. Ent. Monatschr. 1860 Nr. 2 est hujus generis.

### Apluda n. g.

(Fam. *Cocliopodes.*)

Antennae maris infra a basi usque ad medium lamellis, antrorsum emarginatis, uniseriatis armatae, deinde simplices; feminae

simplices. Palpi feminae graciliores, maris erga apicem latiores; utriusque sexus recti. Alarum margines rotundati. Areola invectitia al. anticarum distincta, cuneiformis, brevis. Costa 1. al. post. erga basin cum cellula conjuncta; costa 2. biramosa. Pars anterior cellulae discoidalis al. post. parte posteriore brevior, fere plane aperta. Costae 5—6 al. ant. e diversis locis cellulae discoidalis orientes. Alae deflexae, discolores, marginibus integris. Lingua nulla.

a) *Calcaria pedum posticorum* 4.

7. *A. plebeja* n. spec. alis anticis supra vebrescente fuscis linea obliqua nigra transversa cum altera concolore postica prope apicem excurrente; posticis pallidioribus. ♂ Exp. al. 25 millim.

Hab. in territorio fluminis Kuisipi Africæ. Wahlberg.

b) *Calcaria pedum posticorum* 2.

8. *A. (Heterogenea) invitabilis* Wallengr. Wien. Ent. Monatschr. 1860 Nr. 2.

**Taeda** n. g.

Antennæ maris usque ad apicem pectinatae; pecten compressum. Palpi brevissimi, hirsuti. Alarum margines rotundati. Areola invectitia al. ant. distincta, cuneiformis, elongata, sat lata. Costa 8. al. ant. simplex, sed costa 9. biramosa. Costa 1. al. post. usque ad basin libera; costa 2. simplex. Pars anterior cellulæ discoidalis al. post. parte posteriore brevior, distinete clausa. Cellula al. ant. tripartita. Costae 5—6 al. ant. e diversis locis cellulæ orientes, et costa, cellulam claudens, inter eas geniculata. Alae deflexae, discolores, marginibus integris. Lingua nulla. *Calcaria pedum posticorum* — — — Statura generis praecedentis, sed caput sub thorace valde retractum.

9. *T. aetitis* n. sp. alis anticis supra flavicante virescentibus maculis 2 connatis versus basin, maculis 3 connatis versus angulum analem maculaque ad finem cellulæ rotundatis albo-argenteis, fusco-cinctis; posticis supra nigris, margine interiore late flavicante-fulvo. ♂ Exp. al. 33 millim.

Hab. in Caffraria interiore. Wahlberg.

**Tetropa** n. g.

(Fam. *Cocliopodes*.)

Antennæ maris usque ad apicem late bipectinatae fere ut apud *Bombyces*. Palpi breviores, lati, porrecti. Alae anticae subangulatae,

posticae bidentatae. Areola inventitia al. ant. distincta, cuneiformis, gracilis, brevis. Costa 8. al. ant. triramosa. Costa 1. al. post. erga basin cum cellula conjuncta; costa 2. biramosa. Pars anterior cellulae discoidalis al. post. parte posteriore brevior, distincte clausa. Cellula al. ant. tripartita. Costae 5—6 al. ant. ex eodem loco (apice partis posterioris) cellulae orientes. Alae patulae, concolores. Lingua nulla. Calcaria pedum posticorum — — — (Genus forte typus familiae novae).

10. *E. ancilis* n. sp. alis utrinque flavidis, atomis marginis interioris alarum posticarum condensatis, striga arcuata communi lineaque marginis exterioris utrinque fuscis. ♂ Exp. al. 25 millim.

Hab. in Caffraria orientali. Wahlberg.

#### *Usta* n. gen.

(Fam. *Saturnides*.)

Antennae utriusque sexus pectinatae, pectine expanso, utrinque simplice, erga apicem attenuato. Palpi brevissimi, pilosissimi, penduli. Lingua brevissima, haud ulla. Calcaria pedum posticorum 2, brevissima. Alae ampliae, subrotundatae, sat crassae; posticae ecaudatae. Alae anticae costis 9. Costa 8. al. ant. e latere anteriore cellulae et costa 9. e basi orientes. Tibiae anticae antrorsum ad insertionem tarsorum spina unica valida, sed tibiae intermediae spinis 2 inaequalibus armatae. Cellula al. omnium costula transversa tenui clausa. Costae 3—4 al. post. (haec ex ampio antico) et 5—6 al. ant. (haec ex ampio antico) e diversis locis cellulae orientes. Costa 7. al. ant. triramosa; ramuli ejus ultimi in apicem alae libere excurrunt. Femina alata. *Usta (Saturnia) Wallengrenii* Felder. Wien. Ent. Monatschr. 1859. p. 323. Nr. 23, tab. VI. f. 2 typus hujus generis.

#### *Palasea* n. gen.

(Fam. *Orgyides*.)

Antennae feminae brevius pectinatae, pectine extrorsum sensim attenuato. Palpi breves, cylindrici, breviter hirsuti. Lingua nulla. Calcaria pedum posticorum 4. Areola alarum ant. nulla. Costa unica e margine anteriore cellulae al. ant. oriens. Costa 2. al. post. e margine anteriore, sed costa 3. ex angulo anteriore cellulae orientes. Costa 7. al. ant. 4-ramosa; ramuli ejus omnes liberi. Areola accessoria basalis al. post. aperta. Costae 4—6 al. post. ex angulo fere

ipso posteriore cellulae et costa 7. al. ant. sola ex angulo anteriore cellulae quadriramosa, ramulum primum in marginem anteriorem alae mittens, orientes. Costa 6. al. ant. e costula transversa cellulae longe pone angulum ejus anteriorem oriens et costa 5. al. post. simplex. Fasciculus analis feminae nullus, sed oviductus ejus brevis, hirsutulus. Alae tenues.

11. *P. albimacula* n. sp. alis anticis supra grisescenti fuscis macula maxima alba transversa marginis anterioris, costis fuscescentibus intersecta; posticis utrinque flavis. ♂ Exp. al. 48 millim.

E Caffraria orientali. Wahlberg.

**Ornithopsyche** n. gen.

(Fam. *O r g y i d e s*.)

Antennae maris longe pectinatae. Palpi elongati, porrecti, hirsuti. Lingua haud ulla. Calcaria ped. post. 4. Areola auxiliaris al. ant. nulla. Costa unica e margine anteriore cellulae al. ant. oriens. Costa 2. al. post. simplex cum costa 3. ex angulo anteriore cellulae oriens. Costa 7. al. ant. 4-ramosa, ramuli ejus omnes liberi. Areola accessoria basalis al. post. contagione trunci communis superioris clausa. Costa 5. al. post. biramosa, sola ex angulo posteriore cellulae oriens et costa 7. al. ant., sola ex angulo anteriore cellulae egrediens, 4-ramosa, ramulum primum in marginem exteriorem mittens. Costa 6. al. ant. e costula transversa cellulae longe pone angulum ejus anteriorem oriens. Fasciculus analis maris pilosus, compressus. Femina forte aptera.

12. *O. hypoxantha* n. sp. alis anticis supra sordide flavicantibus, puncto discoidali, lineis 2 transversis geniculatis apiceque late fuscis; posticis fulvis, margine anteriore late nigricante margineque interiore late infuscato; omnibus infra fulvis fascia obliqua, anticarum linea transversa geniculata punctoque discoidali posticarum fuscis. ♂ Exp. al. 33—35 millim.

E Caffraria orientali. Wahlberg.

Gen. *Earias* Hübn.

13. *Earias fulvidana* n. sp. alis anticis brevioribus, supra fulvis margine exteriore extra maculas obsoletissimas flavas griseofuscescente, ciliarum apicibus pallidis; posticis subpellucidis albis, margine postico gracile flavicante. ♀ Exp. al. 18 millim.

Hab. in tractibus lacus N' Gami. Wahlberg.

**Setoctena** n. gen.(Fam. **Haltides.**)

Antennae elongatae crenelatae. Palpi graciles cylindrici subadscendentes. Lingua sat crassa. Calcaria ped. post. 4. Areola auxiliaris al. ant. adest. Costa unica e margine anteriore cellulae al. ant. oriens. Costa 2. al. post. simplex, ex angulo anteriore cellulae cum costa 3. oriens. Costa 8. al. ant. biramosa. Areola accessoria basalis al. post. contagione sat longa trunci costarum communis superiore plane clausa. Costae 4—6 al. post. inter se remotae ex angulo posteriore cellulae orientes. Costa 7. al. ant. simplex e margine posteriore areolae auxiliaris, sed costa 8. ex apice ejusdem areolae orientes. Costa 6. al. ant. prope angulum anteriorem cellulae, costa 9. e margine anteriore areolae auxiliaris et costa 10. e margine anteriore cellulae orientes.

a) Margo interior al. ant. fere rectus, haud arcuatus.

14. **S. Ledereri** n. sp. alis anticis supra virescente canis fascia lata media transversa, extrorsum angulata obscuriore; posticis utrinque griseo-albis, subpellucidis, linea marginali tenui flavicante. ♂  
Exp. al. 25 millim.

Hab. in tractibus fluminis Swakop Africæ.

b) Margo interior al. ant. valde arcuatus.

15. **S. Stalii** n. sp. alis anticis supra fulvo-flammeis, margine interiore obliqua ad apicem alae cano, ferrugineo-tincto, flamma obsoletiore flava maculisque uniseriatis obscuris ornato punctisque 2 disci nigris; posticis subpellucidis grisecente albis. Exp. al. 22 millim.

Hab. in tractibus lacus N° Gami. Wahlberg.

Fam. **Lithosides** Boisd.

Genera hujus familiae, in terra Caffrorum occurrentia, cum europaeis, ut sequitur, disponuntur:

1. Costa, e margine anteriore cellulae al. ant. oriens, libera, in margine anteriore alae anastomosans, areolam nullam formans.
  - A. E margine anteriore cellulae al. ant. costae duae orientes, altera simplex, altera biramosa. . . . . Sarothripa.
  - B. E margine anteriore cellulae al. ant. costae 1—2 orientes, semper simplices.

download unter [www.biologiezentrum.at](http://www.biologiezentrum.at) 145

- 1) E costula transversa cellulæ al. post. (interdum prope angulum ejus posteriorem) costa egrediens. Areola auxiliaris al. ant. nulla.

a) E latere anteriore cellulæ al. ant. costa unica egrediens.

Nola.

- b) E latere anteriore cellulae al. ant. costae 2 egressentes.  
 (1) Costa 1. al. post. intra medium cellulae discoidalis  
 et longe ante angulum ejus anteriorem a costa 2.  
 se separat.

(a) Costa 6. al. ant. triramosa, 7. simplex.

Nudaria.

(b) Costa 6. al. ant. simplex, 7. triramosa.

*Melania* n. gen.



- 2) E costula transversa cellulae al. post. costa nulla egrediens.  
 E latere anteriore cellulae al. ant. costae 2 egredientes.  
 a) Areola auxiliaris al. ant. nulla. Costa 6. al. ant. quadrilatera ramosa. . . . . Lexis n. g.  
 b) Areola auxiliaris al. ant. adest. Costa 7. al. ant. triangularis ramosa.

2. Costa, e margine anteriore cellulæ al. ant. oriens, in costa, e basi oriente, anastomosans, l. cum costa, e basi oriente, costula transversa connexa, ut areolam clausam basalem ante cellulam formet.

A. Costa e costula transversa cellulæ al. post. nulla egrediens.

I. *Truncus costarum communis inferior* al. post. bi- l. *triramosus*.

a) Areola auxiliaris al. ant. adest. Costa, e margine anteriore cellulae al. ant. oriens, in costa, e basi oriente anastomosans. *Manulea* n. g.

b) Areola auxiliaris al. ant. deest.

1) Costa 3. al. ant. simplex. Truncus costarum communis inferior al. post. biramosus.

(a) Costa, e margine anteriore cellulae ant. oriens, in costa, e basi oriente, anastomosans.

*Lepista* n. g.

(b) Costa, e margine anteriore cellulae al. ant. oriens, cum costa, e basi oriente, costula transversa connexa. . . . . *Sozusa* n. g.

2) Costa 3. al. ant. biramosa. Truncus costarum communis inferior al. post. triramosus. Costa, e margine anteriore cellulae al. ant. oriens, in costa, e basi oriente, anastomosans.

a) Costa, ex angulo anteriore cellulae al. ant. oriens, biramosa. . . . . *Samera* n. g.

b) Costa, ex angulo anteriore cellulae al. ant. oriens, triramosa.

(1) Costa 2. al. ant. aut intra aut ad medium cellulae et longe itaque ante hujus angulum posteriorem a trunco communi se separat.

*Lithosia*.

(2) Costa 2. al. ant. longe extra medium cellulae et prope angulum hujus posteriorem a trunco communi se separat. *Pusiola* n. g.

II. Truncus communis costarum inferior al. post. quadri- ramosus. Areola auxiliaris al. ant. deest. (Costa, e margine anteriore cellulae al. ant. oriens, in costa, e basi oriente, anastomosans. Costa 3. al. ant. simplex. Costa, ex angulo anteriore cellulae al. ant. oriens, triramosa.) . . . *Setina*.

B. Costa e costula transversa cellulae al. post. egrediens.

*Tumicla* n. g.

Gen. *Melania*. Typi sunt: *Lith. nigropunctata*, *punctipennis* et *pustulata* Wallengr. Wiener Ent. Monatschr. 1860 Nr. 2.

Gen. *Lexis*. Species typica: *Lith. bipunctigera* Wallengr. l. c.

Gen. *Manulea*. Species typicae sunt: *Lith. gilveola*, *complana*, *lurideola*, *arideola* etc. ex Europa et *Lith. gracilipennis* Wallengr. l. c. ex Africa.

Gen. *Lepista*. Species typica: *Lith. pandula* Boisd. Voy. de l'Afr. Austr. par Deleg. II. pag. 597. n. 130.

Gen. *Sozusa*. Species typica: *Lith. scutellata* Wallengr. l. c.

Gen. *Samera*. Species typica: *Lith. muscerda* ex Europa.

Gen. *Lithosia*. Species typicae: *Lith. aureola*, *luteola*, *pallifrons* etc. ex Europa.

Gen. *Pusiola*. Species typicae: *Lith. flavigaster* et *cinerella* Wallengr., ut etiam *P. Zelleri* n. sp. (vide infra).

Gen. *Tumicla*. Species typica: *Setina faginaria* Wallengr. l. c. ex Africa et *Setina pectinata* Wallengr. Eugenies Resa omkring Jorden. Ins. p. 370. N. 44.

16. *Pusiola Zelleri* n. sp. capite collarique sordide ochraceis; thorace alisque anticis supra albidente flavescentibus; alis posticis utrinque et anticis infra ochraceis; abdomine ochraceo. ♂ Exp. al. 18 millim.

Hab. in Caffraria orientali. Wahlberg.

#### Alytarchia n. gen.

(Fam. *Arctiides*.)

Antennae maris infra serratae, pilis brevissimis atque densissimis biseriatis, feminae simplices pilis brevioribus atque rarioribus parce instructae; articulus earum basalis crassus, nudus. Palpi breviores, infra dense ac breviter hirsuti; articulus ultimus nudus, brevis, subcordiformis. Calcaria pedum post. 4. Areola auxiliaris al. ant. deest. Costa independens alarum post. adest, e costula transversa cellulae ante ejus angulum posteriorem, a costa quinta sat remota, oriens. E margine anteriore cellulae al. ant. costae duae orientes. Costa 1. al. post. intra medium cellulae et prope basin alae a costa secunda se separat. Costa 6. al. ant. mox pone angulum anteriores cellulae et 7. ex illo angulo, sed 8. e margine anteriore cellulae oriens. Costa 7. al. ant. triramosa et 8. simplex. Costae duae ex angulo anteriore cellulae al. post. orientes, simplices; costae duae e margine posteriore et costa unica ex angulo posteriore ejusdem cellulae orientes. Abdomen laeve, fasciculis carens, lingua elongata, crassa. Typi generis: *Euchetia pilotis* Drury et *Euchetia amanda* Boisd. Voy. de l'Afr. austr. par Deleg. II. 597, 133.

17. *Agrotis varians* n. sp. alis anticis supra albido-canis, spatio terminali obscuriore, linea subterminali albida, haud repente, lineolis marginis antici brunnescens, maculaque discoidali maxima irregulariter malleiformi fusca; posticis albis. Exp. al. 50 millim.

Var. a) alis anticis supra flavis, maculis marginis anticis fere nullis.

Hab. in territorio fluminis Swakop Africae.

18. *Perigea vexabilis* n. sp. alis anticis supra griseo-testaceis, liniis ordinariis obsoletissimis undulatis fuscescentibus, macula ordinaria reniformi obsoletissima et pone illam macula rotundata flava; posticis fuscescentibus, omnibus infra pallidis linea undulata fusca punctoque discoidali posticarum nigricante. ♂ Exp. al. 24 millim.

Hab. in Caffraria orientali.

19. *Perigea trivenesica* n. sp. alis anticis supra obscure griseis, lineis ordinariis haud distinguendis, macula ordinaria reniformi discoidali haud ulla et pone illam macula alba cordiformi; posticis obscure fuscis; omnibus infra fuscescentibus linea communi undulata fusca punctoque medio posticarum nigro. ♂ Exp. al. 35 millim.

Hab. in tractibus fluminis Swakop Africae.

20. *Perigea urba* n. sp. alis anticis supra griseis, hinc inde canindutis, linea basali et extrabasali duplicatis, umbra media et linea subterminali distinctis, linea intermedia e punctis nigris albo-notatis indicata, maculaque ordinaria reniformi obsolete canescente et pone illam macula cordiformi alba; posticis supra fuscis; omnibus infra fuscescentibus, linea communi undulata fusca punctoque medio posticarum obsoletissimo. ♀ Exp. al. 35 millim.

Hab. in tractibus fluminis Kuisip Africae.

21. *Tapinostola taenioleuca* n. sp. alis anticis pallide flavicante fuscis, margine anteriore costis omnibus strigisque longitudinalibus duabus latioribus flavicante albis; posticis utrinque flavicante albis. Exp. al. 32 millim.

Hab. in territorio fluminis Kuisip Africae.

22. *Thalpochares parectata* n. sp. alis anticis supra albis, margine anteriore limboque exteriore roseis, striga transversa terminoque interiore limbi fulvis lineaque subterminali undulata obsoletiore chalybea; posticis albis margine exteriore supra infuscato; anticis infra fuscis. ♂ Exp. al. 22 millim.

Hab. in territorio lacus N' Gami Africae.

23. *Xanthoptera anachoresis* n. sp. alis anticis dimidiatim flavis et cinnamomeis, linea transversa discoidali, punctis marginalibus

- obsoletis punctisque 2 ad finem cellulae nigris; posticis fulvis.  
 ♀ Exp. al. 14 millim.  
 Hab. in tractibus fluminis Kuisip Africae.
24. *Bocula tripalis* n. sp. alis anticis supra griseis, praesertim extrorsum dense fusco-atomatis, lineis 2 transversis brunneis, flavido limbatis, linea subterminali undulata pallida punctisque 2 discoidalibus nigris; posticis griseo-fuscis. ♂ Exp. al. 25 millim.  
 Hab. in Caffraria orientali.
25. *Polydesma determinata* n. sp. alis omnibus denticulatis, fusco-cinereis, ad extimum haud obscurioribus, anticis supra maculis 4 costalibus nigris, strigas totidem undulatas transversus fuscas per discum mittentibus punctoque albo in loco maculae veniformis; posticis supra strigis 2 nigris discoidalibus; omnibus infra striga undulata transversa fusca. ♀  
 Hab. in territorio fluminis Kuisip Africae.
26. *Pandesma opposita* n. sp. alis denticulatis, anticis supra flavicante griseis, ad extimum concoloribus, lineis undulatis tenuissimis confusis nigris; posticis albis fascia terminali flavicante-grisea, striga obsoleta flavicante ornata; omnibus infra albis fascia abbreviata fusca. ♂ Exp. al. 40 millim.  
 Hab. in tractibus fluminis Kuisip Africae.
27. *Thermesia zygia* n. sp. alis supra sordide griseo-testaceis linea communi flava, introrsum fusco-limbata, anticarum valde angulata, posticarum obsolete geniculata; anticis linea extrabasali undulata, obsoleta, fusca, macula ordinaria reniformi fusco-limbata; omnibus infra striga communi maculaque discoidalii fuscis. ♂ Exp. al. 31 millim.  
 Hab. in Caffraria orientali.
28. *Thermesia vestispica* n. sp. alis supra testaceis serie communi punctata, antrorsum angulata, nigra; anticis umbra mediana, macula discoidalii, linea extrabasali undulata punctisque posticis seriatis nigris; omnibus infra flavicantibus dense fusco-atomatis striga media communi flava, nigro punctata maculaque discoidalii obsoleta nigra. ♀ Exp. al. 32 millim.  
 Hab. in Caffraria orientali.
29. *Herminodes poderis* n. sp. alis anticis supra fuscis, ad extimum brunneo-testaceis, lineis 2 transversis mediis undulatis nigris,

subparallelis, linea subterminali obsoleta, obscura, undulata maculaque discoidali semilunari, fundo concolora, nigro-circumcincta; posticis supra fuscis; omnibus infra albicantibus limbo latiore strigaque communi fuscis. ♂ Exp. al. 30 millim.

Hab. in Caffraria orientali.

30. *Jodis vicinitaria* n. sp. alis posticis rotundatis, omnibus utrinque virescentibus, fronte cinnamomea pedibusque pallide flavicantibus. ♂ Exp. al. 26 millim.

Hab. in Caffraria orientali interiore. (Ex apice areolae adventitiae costula tenuis ante costam biramosam oritur. Costae 4—5 al. post. e diversis locis anguli posterioris cellulae discoidalis orientes. Tarsi postici graciles.)

31. *Jodis inrenusta* n. sp. alis posticis rotundatis, omnibus utrinque virescentibus ciliis albis; pedibus pallide flavicantibus. ♂ Exp. al. 20 millim.

Hab. in territorio fluviorum Limpoponis et Gariepis. (Ex apice areolae adventitiae costula tantum biramosa oritur. Costae 4—5 al. post. ex angulo posteriore cellulae discoidalis conjunctius oriuntur. Tarsi postici graciles.)

22. *Eucrostis frustratoria* n. sp. alis utrinque flavo-viridibus linea obsoletissima communi supra albicante ciliisque concoloribus; fronte ferruginea pedibusque flavicantibus. ♀ Exp. al. 16 millim.

Hab. in Caffraria orientali.

33. *Timandra Ledereri* n. sp. alis anticis acutis, posticis acute angulatis, omnibus supra virescente griseo-isabellinis, striga media transversa communi obscuriore, extrorsum albido-limbata, punctisque posticis seriatis obsoletissimis; puncto discoidali anticarum nigro, posticarum albo; omnibus infra flavicantibus, posticarum disco albicante. ♂ ♀ Exp. al. 27 millim.

Hab. in Caffraria orientali.

34. *Acidalia pygarata* n. sp. alis latis omnibus supra albido flavis, atomis rarioribus nigris adspersis, punctis marginalibus minutis nigris, anticis lineis transversis 2 undulatis fuscis punctoque discoidali nigro; omnibus infra pallidioribus, anticis lineis 2, posticis unica punctoque posticarum discoidali fusco, obsoleto. ♀ Exp. al. 26 millim.

Hab. in Caffraria orientali. Statura *A. diversariae* Zell.

35. *Acidalia nemorivagata* n. sp. alis latis omnibus supra flavo-albidis, vernicosis, lineis 2 transversis communibus undulatis ferrugineis maculisque rotundatis I. sublunaribus fuscis mox pone lineam posteriorem transverse seriatis punctoque discoidali nigro; infra pallidioribus linea transversa communi fere fulgurata, linea altera anticarum punctoque discoidali fuscis. ♀

Hab. in Caffraria orientali. Statura fere *A. bisetatae*.

36. *Acidalia antiloparia* n. sp. alis latis, rotundatis, supra albis, puncto discoidali nigro, fasciis transversis 5 communibus argillaceis punctisque marginis posterioris nigris seriatis; anticis infra infuscatis posticis albis, fasciis transversis fuscescentibus obsoletioribus anticarum tribus, posticarum 2, punctoque discoidali. ♂

Hab. in tractibus fluminis Kuisip Africæ. Statura *A. osseatae*.

37. *Acidalia gazellaria* n. sp. alis anticis acutis, omnibus supra albis, fusco-atomatis, striga media recta communi fusco-argillacea, strigis 3 posticis argillaceis; interiore fusco-punctata et undulata punctisque marginis exterioris seriatis et puncto discoidali nigris; infra fuscedine indutis signaturis partis superioris obsoletis. ♂

Hab. in Caffraria orientali. Statura *A. osseatae*, sed alae anticae acutiores.

## Beiträge zur Kenntniss der europäischen Halticinen.

Von F. Kutschera.

(Fortsetzung.)

B. Flügeldecken pechschwarz, braun oder rothbraun, Schultern und Spitze bisweilen heller; Unterseite ebenfalls pech- oder rothbraun.

Schultern sehr breit mit stark entwickelter Beule.

Käfer röhlich-pechbraun, stark glänzend mit Metallschimmer; Flügeldecke an Schulter und Spitze heller, stark und bis über die Mitte deutlich gereihtpunktirt . . . 16. *fulgens*.

Käfer pechbraun, mässig glänzend, ohne Metallschimmer; Flügeldecken an Schulter und Spitze gelbbraun, ziemlich fein und undeutlich gereihtpunktirt . . 17. *submaculatus*.

Schultern mässig vorspringend, jedoch mit deutlich erhabener Beule.

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1863

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Wallengren Hans Daniel Johan

Artikel/Article: [Lepidopterologische Mittheilungen. 137-151](#)