Noch einige Worte über *Cyphonotus* und *Microphylla*.

Von Edm. Reitter in Mödling.

Mein verehrter Freund Herr Dr. Kraatz tritt im vorhergehenden Artikel für die Abtrennung seiner Gattung *Microphylla* von *Cyphonotus* ein, nachdem ich in dieser Zeitung 1890, pag. 265, für deren Zusammenziehung gesprochen habe.

Wenn es sich um die Aufstellung einer neuen Gattung handelt, so müssen gewiss erheblichere Verschiedenheiten vorliegen, als es hier bei *Microphylla* der Fall ist. Dass bei *Cyphonotus* die ♀ in der Mehrzahl, bei *Microphylla* hingegen stets in der Minderzahl vorhanden sind, kann nicht in Betracht kommen. Die feine Behaarung des *Cyphonotus testaceus* gibt nun Herr Dr. Kraatz zu. Wäre jedoch die Verschiedenheit in dieser Hinsicht noch so gross, so könnte sie eine generische Abtrennung nicht begründen, denn bei den sehr nahestehenden Gattungen, z. B. *Anoxia*, tritt dieselbe ebenso zu Tage, ohne dass man an deren Abzweigung gedacht hat. Ich erinnere hier an *Anoxia orientalis* und *villosa*, wo bei der ersten der Bauch fast staubartig, bei der anderen lang und zottig behaart erscheint. Die Tolle des *detritus* und *pauper* ist bei *testaceus* durch die an Zahl und Länge geringeren Haare am Kopfe mehr als angedeutet.

Auch die Form des Kopfschildes kann als kein generischer Unterschied angesehen werden, denn derselbe ist wohl bei *Cyph. detritus* vorn gerade, bei *pauper* aber in ganz gleicher Weise ausgebuchtet, und aus diesem Grunde konnte ich darin nur einen spezifischen Unterschied erblicken und auch der gesperrte Text hierüber konnte mich nicht anders überzeugen. Die Hinterwinkel des Halsschildes sind bei *Cyph. testaceus* abgerundet, die Ecke ist noch immerhin angedeutet, bei *pauper* und *detritus* sehr stumpf, mit abgerundeter Ecke. Auch dieser Unterschied ist daher ganz unbeträchtlich, zumal diese Winkel auch bei *testaceus* nicht mehr herabgebogen sind, als bei den von mir verglichenen Arten.

Ich sträube mich gewiss nicht gegen die Aufstellung neuer Gattungen, wenn sie wirklich auf generischer Basis aufgebaut werden, was ich vielfach documentirt habe. Aber in diesem Falle handelt es sich nicht um generische, sondern um spezifische Unterschiede, welchen nicht einmal eine präzise Verschiedenheit zugesprochen werden kann, da es sich in allen Fällen um ein „mehr oder weniger“ handelt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Noch einige Worte über Cyphonotus und Microphylla.
137](#)