

Ueber einige bekannte und neue Borkenkäfer.

Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

Uebersicht der mir bekannten Kissophagus-Arten.

- 1'' Vorderrand des Halsschildes glattrandig.
- 2'' Die anliegenden Härchen insgesamt gleichmässig der Quere nach gelegt. Grundtoment der Flügeldecken äusserst kurz, am ersten Zwischenraume dichter stehend und daher heller gefärbt erscheinend, die Börstchen der Reihen auf den Flügeldecken aufstehend, wenig lang, weiss. **pilosus** Ratzeb.
- 2' Die anliegenden Härchen des Halsschildes hinter der Mitte strahlenförmig zusammenlaufend. Grundtoment der Flügeldecken weniger kurz, fein haarförmig, die reihenweise gestellten aufgerichteten Börstchen der Zwischenräume länger, gelb, haarförmig, die Zwischenräume breiter als die Punktstreifen, fein punktiert und gerunzelt. **hederae** Schmidt.
- 1' Vorderrand des Halsschildes mit einem Marginalkranze feiner aufgebogener, kerbartiger Höckerchen, welche an den Seiten etwas mehr vortreten; die anliegenden Härchen des Halsschildes hinter der Mitte strahlenförmig zusammenlaufend. Grundtoment der Flügeldecken spärlich, fein haarförmig, die reihenweise gestellten, aufgerichteten Börstchen der Zwischenräume lang, haarförmig, die letzteren an der Naht sehr wenig breiter als die Punktstreifen, gerunzelt und von groben Punkten durchsetzt. Etwas grösser und breiter als *hederae*, diesem sonst sehr ähnlich, braun, Halsschild und Unterseite nicht schwärzlich, nur der Kopf dunkler. L. 2—2·2 mm. Zara. **Novaki** n. sp.

Uebersicht der mir bekannten Xylocleptes-Arten.

- 1'' Nahtwinkel der Flügeldecken beim ♂ gemeinschaftlich eingebuchtet. Grössere braune Art. L. 3 mm. **bispinus** Duft.
- 1' Nahtwinkel der Flügeldecken auch beim ♂ mit dem Apicalrande des Absturzes gemeinschaftlich und gleichmässig abgerundet. Kleine Arten von höchstens 2 mm Länge.
- 2'' Kastanienbraun, Fühler und Beine gelb, Oberseite lang und ziemlich dicht greisgelb beharrt, Nahtstreifen furchenartig, das Schildchen erreichend. Syrien. W. 87. 196 **bicuspis** Reitt.
- 2' Schwarz, glänzend, Beine braun, Fühler und Tarsen gelblich; Oberseite kürzer und spärlich, die Flügeldecken reihenweise weiss beharrt; Nahtstreifen furchenartig, das Schildchen nicht erreichend. Dalmatien: Zara. **biuncus** n. sp.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1894

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Ueber einige bekannte und neue Borkenkäfer. 45](#)