

## Die Verwandten des *Ophonus sabulicola* Panz.

Von **Edm. Reitter** in Paskau (Mähren.)

- 1'' Die kurze aufstehende Behaarung der Oberseite ist schwarz.\*)  
Oesterreich, Mittelmeergebiet. **obscurus** F.
- 1' Die kurze, aufstehende Behaarung der Oberseite ist braungelb.
- 2'' Hinterwinkel des Halsschildes stumpf, Unterseite desselben an den Seiten grob punktirt. Grosse Art von 14—18 mm. Mittel- und Süd-Europa, Kaukasus. **sabulicola** Panz.
- 2' Hinterwinkel des Halsschildes abgerundet; Unterseite desselben an den Seiten fein punktirt. Kleinere Arten bis zu 14 mm Länge.
- 3'' Halsschild und Flügeldecken ziemlich gleichmässig punktirt.
- 4'' Halsschild vorn kaum breiter als an der Basis. Kopf und Halsschild grob punktirt, Flügeldecken tief gestreift, Zwischenräume dicht und kräftig punktirt, sehr schwach gewölbt, Behaarung im Profile gesehen sehr deutlich, länger als bei der nächsten Art. Mitteleuropa, Algier. **diffinis** Dej.
- 4' Halsschild zur Basis stark verengt, vorn daher viel breiter als hinten; Kopf und Halsschild feiner, letzterer ungleich fein und gröber punktirt, Flügeldecken sehr fein gestreift, Zwischenräume sehr dicht und fein punktirt, ganz flach, ihre Behaarung äusserst kurz, schwer sichtbar. Flügeldecken blau (Stammform) oder schwarzbraun oder schwarz (var. *discicollis* Waltl) Südwestl. Eur., Alg. **rotundicollis** Fairm.
- 3' Halsschild nur an den Seiten und an der Basis wenig dicht und deutlich punktirt, die Scheibe mit wenig auffälligen Pünktchen besetzt; Flügeldecken sehr fein, wenig deutlich, an der Spitze und die 2—4 Zwischenräume an den Seiten dicht und normal stark punktirt; am 3., 5. und 7. Zwischenraum mit einer weitläufigen Reihe starker Punkte. Im übrigen dem *rotundicollis* sehr ähnlich. Flügeldecken blau, Halsschild zum Theile mit grünlichem Scheine. Long. 10.5 mm Spanien. Von Herrn L. Miller als *quadricollis* Dej. erhalten, der es, nach der Beschreibung zu urtheilen, wohl nicht sein kann.
- marginepunctatus** n. sp.

\*) Die Färbung der Haare muss auch bei anderen Arten in Betracht gezogen werden; sie ist auch z. B. bei *O. puncticollis* und *cordatus* das verlässlichste Merkmal; bei dem ersteren ist die Behaarung schwarz, bei dem letzteren braungelb.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1894

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Die Verwandten des \*Ophonus sabulicola\* Panz. 61](#)