

Zehnter Beitrag zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches.

Von Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

1. **Coscinia striata** n. sp. *Ferruginea, mandibulis apice nigricantibus, antennis obscurioribus, pedibus pallidioribus; antennarum articulo secundo subglobozo; capite irregulariter punctato cum oculis thorace vix angustiore, prothorace haud latitudine longiore, deplano, parce, fortiter punctato; elytris latis, deplanatis, subtiliter punctato-striatis, interstitiis sat latis, parce subtiliter punctulatis et breviter erecte pubescentibus. Long. 6 mm.*

Sefir-Kuh, im Gebirge nördl. von Herat. Von H. Hauptmann Fr. Hauser eingesendet. Von allen bekannten Arten durch die fein punktirten Streifen der Flügeldecken abweichend.

2. **Sphodrus (sens. stricto) rotundicollis** n. sp. *Niger, nitidus, convexus, palpis antennarum basi pedibusque obscure ferrugineis, palpis maxillaribus articulis duobus ultimis longitudine aequalibus; capite magno, thorace parum angustiore, fere laevi, prothorace latitudine parum aut vix longiore, obsolete transversim rugato, sublaevi, foveolis basalibus minus profundis, lateribus anguste marginato, antice valde rotundatim ampliato, postice subconstricto parallelo, angulis posticis acutis retrorsum productis, anticis parvulis; scutello parvo, laevi; elytris convexis, ovalibus, in mare nitidis, tenuissime striatis, striis indistincte subpunctulatis, angulo suturali acuminato; tibiis intermediis leviter curvatis, tarsis anticis maris minus dilatatis, omnibus supra strigosis, glabris, apice longissime ciliatis, extus vix sulcatis, tarsor. posticor. articulo primo extus leviter bisulcato, trochanterib. posticis ♂ angustis, elongatis, apice acuminatis. L. 24—25 mm.*

Sefir-Kuh; von Herrn Hptm. Fr. Hauser eingesendet.

Diese Art unterscheidet sich in mehrfacher Beziehung sehr wesentlich von *leucophthalmus*, in dessen Nähe sie gestellt werden muss. Der Körper ist, obgleich ebenfalls gross, gewölbter, die 2 Endglieder der Palpen sind gleichlang und die Tarsen wie bei *Sphodropsis* oben gestrichelt, aber nur das einzige erste Glied der Hinterfüsse ist seitlich und zwar wenig deutlich doppelt gefurcht. Dadurch wird der Bestand der Gattung *Sphodropsis* auf Grund der bisher angeführten Merkmale sehr alterirt und ist wohl als Untergattung von *Pseudotaphoxenus* aufzufassen. Es gibt nämlich eine Menge Arten des letzteren Genus, welche die Tarsensculptur von *Sphodropsis* besitzen, nur sind bald eine, bald zwei,

bald gar keine Furchen an den Seiten der hinteren Tarsen vorhanden. Einen durchgreifenden Unterschied, wodurch man *Sph. Ghiliani* von diesem turkestaner *Pseudotaphoxenus* trennen könnte, ist mir aufzufinden nicht gelungen.

3. **Pseudotaphoxenus (Sphodropsis) refleximargo** n. sp. *Nigropiceus, palpis antennis tarsisque ferrugineis; oblongus, deplanatus, nitidus. Antennis tenuibus, articulo tertio valde elongato, levissime curvato. Capite parvo, thorace parum brevior, laevi, nitido, impressionibus frontalibus obsoletis, collo parum constricto, oculis mediocribus, convexis. Prothorace latitudine longiore, antice exciso, angulis anticis leviter prominulis, haud acutis, lateribus tenuiter explanato, ante medium gradatim leviter rotundato, basim versus parum angustato, ante angulos posticos acute rectos levissime lateque sinuato; basi parum emarginata, disco depresso, linea media et impressionibus basalibus elongatis sat profunde impressis, vix punctato. Elytris ellipticis depressis, ante apicem vix sinuatis, modice striatis, striis punctatis, margine praecipue medio valde late reflexo-elevato, carinula basali leviter arcuata, denticulo humerali nullo; epipleuris antice latis, postice angustis. Corpore subtus impunctato, laevi, nitido. Metathoracis episternis latitudine vix longioribus. Pedibus elongatis, gracilibus, tarsis omnibus sat longis et tenuibus, supra strigulosis, posterioribus externe tenuiter sulcatis. Long. 15—19 mm.*

Die Art muss dem *P. reflexipennis* Sem. Hor. XXIII. 372 von Ordoss sehr ähnlich sein, aber durch ganz flachen Körper, anderen Halsschild und undeutliche Stirnfurchen sich unterscheiden. Unter *Sphodropsis* verstehe ich die Arten dieser Gattung mit gestrichelten Tarsen. — Nördliche Mongolei (Hans Leder.)

4. **Agonom punctibasis** n. sp. Gross, schwarz, glänzend, leicht gewölbt, gestreckt. Erstes Glied der Fühler und die Spitzen der Palpenglieder rothbraun, die drei Wurzelglieder der Fühler unbehaart. Kopf schmaler als der Halsschild, glatt, Stirnfurchen seicht, Augen gross, vorragend. Halsschild viel schmaler als die Flügeldecken, so lang als breit, an den Seiten etwas gerundet, vor der Mitte am breitesten, schmal abgesetzt, Vorderrand schwach ausgeschnitten, Basis gerade, Hinterwinkel stumpf, aber deutlich, die Scheibe undeutlich quer gewellt, Basalgruben flach, die Basis überall, in den Gruben deutlicher punktirt. Flügeldecken mit der Spur eines grünlichen Scheines, oder ohne solchen, leicht und gleichmässig gewölbt, ziemlich tief gestreift, in den Streifen deut-

lich punctirt, der 3. Zwischenraum mit 3 eingestochenen Punkten besetzt. L. 9—10 mm. Gruppe des *lugens*; hier schon durch deutlich punctirten Halsschild abweichend. — Sefir-Kuh-Gebirge nördl. von Herat. Von Herrn Hptm. Fr. Hauser erhalten.

5. **Ophonus (in spec.) hystrix** n. sp. *Nigro-piceus, nitidulus dense erecte fulvo-pilosus, antennarum basi palpis tibiis tarsisque testaceis; capite thorace angustiore, fortiter punctato, prothorace transversim cordato coleopteris parum angustiore, basin versus contracto, parallelo, angulis acuto-rectis, dorso convexo, dense fortiter punctato, intermedia linea tenui insculpta, basi haud marginato, utrinque leviter striatim impresso; scutello parvulo, brevissimo, laevi; elytris striatis, striis parce punctatis, interstitiis confertissime sut fortiter punctulatis; tibiis apice obscurioribus, tarsis anticis et intermediis maris leviter dilatatis; posticis articulo primo secundo minus longiore.* Long. 5—6 mm.

Var. b. *Dilute brunneis, capite obscuriore, elytris sutura et apicem versus sensim nigricantibus; mandibulis rufis, apice nigris.*

Eine neue Art aus der Verwandtschaft des *rufibarbis*, aber durch Wölbung, Kleinheit des Körpers, starke Punktirung und verhältnismässig lang geschorene Behaarung auffällig abweichend. — Quellengebiet des Irkut und nördl. Mongolei (Leder).

Loxophonus, nov. gen. Harpalidarum. Augen auf der Unterseite des Kopfes vom Maxillarausschnitt getrennt. Flügeldecken an der Basis vollständig gerandet. Seitenrand der Stirn über den Fühlerwurzeln einfach. Schienen normal bedorn. Wangen ohne Fühlerfurche. Mandibeln gleich gebildet. Kopf viel schmaler als der Halsschild, Tarsen auf der Oberseite kahl. Die erweiterten Glieder der Vorder- und Mitteltarsen des ♂ auf der Unterseite mit zwei Längsreihen schuppig erscheinender Tasthaare besetzt. Kopf ohne rothen Stirnflecken, hinter den Augen verengt. Erstes Glied der Hintertarsen merklich länger als das zweite.

Diese Charaktere stimmen mit *Harpalus* überein; *Loxophonus* unterscheidet sich aber durch fast scheibenförmigen, glatten Halsschild, dessen Hinterwinkel abgerundet sind, und durch grob und wenig dicht punctirte Interstitien der Flügeldecken, welche auch (nicht dicht) kurz geschoren behaart sind, wie bei *Ophonus*; von *Ariabas* Gozis durch die schlanke langgestreckte, fast *Ditomus*-artige Gestalt, hohen glatten Halsschild, der nur längs des ganzen Seitenrandes grobe setatragende Porenpunkte besitzt, durch die auf der ganzen Oberfläche der Flügeldecken gleichmässig ver-

theilten groben Punkte, endlich durch kürzere Epimeren der Hinterbrust, normale, nicht verdickte Schenkel und normale Coxen der Hinterfüsse. Die letzteren erreichen nicht ganz die Mitte der Schenkel. — Ist zwischen *Ophonus* und *Harpalus* zu stellen.

6. **Loxophonus setiporus** n. sp. *Elongatus, brunneus, palpis, antennis pedibusque dilute ferruginis, antennis gracilibus, thoracis basin haud attingentibus; capite laevi thorace angustiore, sulcis frontalibus brevibus, foveiformibus; prothorace minus transverso, coleopteris minus aut vix angustiore, antice rotundato, laevi, antice et basi tenuiter marginato, basin versus magis angustato, angulis anticis obtusis, deflexis, posticis rotundatis, ad marginem lateralem punctis foveiformibus plurimis piliferis impressis; elytris elongato-ovalibus, striatis, vix punctatis, interstitiis aequalibus, deplanatis, parce fortiter punctatis, punctis breviter piliferis, striola scutellari distincta, apice in mare vix sinuatis, subtus sublaevibus, parce fulvo pilosellus; forcipe maris obtuso, introrsum subdentato. L. 11·5 mm.*

Kulab in Turkestan. Von Dr. Staudinger und A. Bangh aas erhalten.

7. **Bradycellus nigrutilus** n. sp. *Leviter convexus, niger nitidus, palpis, antennarum articulo primo, margine laterali prothoracis elytrorumque angustissimo pedibusque rufo-testaceis; capite thorace angustiore, laevi, sulcis frontalibus inter antennis foveiformibus; prothorace transverso, coleopteris angustiore, basin versus magis angustato, laevi, linea media integra distincte impressa, foveolis basalibus oblongis profundis subtiliter punctatis; scutello parvo, laevi, triangulare; elytris subparallelis, apice conjunctim rotundatis et leviter emarginatis, supra striatis, striis vix punctatis, interstitiis aequalibus, interstitio 3. pone medium puncto impresso, striola abbreviata scutellari perspicua; tarsis intermediis ♂ haud dilatatis, posticis extus haud carinatis; prosterno antice marginato. Long. 5—5·6 mm.*

Durch Färbung und geringere Wölbung von den bekannten Arten abweichend. — Wladiwostok in Ostsibirien (Graeser).

8. **Bradycellus glabratus** n. sp. Dem *Br. harpalinus* und *collaris* sehr ähnlich, ähnlich gefärbt, doch etwas grösser; von diesen hauptsächlich durch den viel grösseren Kopf zu unterscheiden, der wenig schmaler ist als der Halsschild. Letzterer ist nach hinten stärker verengt, die Hinterwinkel sind ebenfalls abgerundet, die Basaleindrücke ziemlich tief, länglich, im weiteren Umkreise punktirt. Flügeldecken nachhinten deutlicher verbreitert,

der dritte Zwischenraum hinten mit einem eingestochenen Punkte, der Scutellarstreif kurz. Der Kopf ist nicht bis zu den Augen in den Halsschild eingezogen, die Schläfen lang. Long. 5 mm.

Im Quellgebiet des Irkut, von Hans Leder gesammelt.

9. **Cymindis pilosissima** n. sp. *Fusco-picea, leviter convexa, nitida, longe fulvo-pilosa, ore, antennis pedibusque testaceis, elytrorum margine tenue laterali ferrugineo. Capite cum oculis thorace vix angustiore, fortiter sparsim punctato, temporibus longis, angustatis. Antennis dimidium corporis attingentibus. Prothorace longitulline parum aut minus latiore, convexo, sparsim grosse punctato, linea intermedia sulciformi, lateribus postice cordatim angustato, angustissime marginato, angulis posticis lateralibus parvulis subrectis, basi in medio subtruncata, apice vix evidenter emarginata. Elytris lato-ovalibus, tenuiter marginato-explanatis subtilissime striatis, striis vix perspicuis, subtiliter punctulatis, interstitiis fortiter subuniseriatim punctatis, epipleuris ferrugineis. Palpis maris simplicibus. Unguiculis haud serratis. Long. 7—8 mm.*

Nördliche Mongolei, aus dem Gebirge. Von Leder gesammelt. Ich wüsste keine andere Art, mit welcher diese auffällige, fast unicolore, ein Bindeglied zwischen *Cymindis* und *Menas* bildende Art zu vergleichen wäre.

10. **Dromius Hauseri** n. sp. *Pallide testaceus, capite thoraceque rufis, capite magno, lato, cum oculis thorace haud angustioribus, laevi, nitido, temporibus angustatis, sat elongatis; prothorace subcordato, levissime transverso, angusto, basin versus fortiter angustato, laevi, nitido, glabro, angulis posticis parvulis obtusis, sublateralibus, antice recte truncato, lateribus vix explanato, tenuiter marginato; elytris elongato-obovatis, sat dilatatis, postice sensim latioribus, lateribus leviter subrotundatis, apice oblique, minus distincte truncatis, abdomine haud tegentibus, supra subtiliter striatis, striis indistincte punctulatis, interstitio tertio punctis tribus impressis. — Long. 7.3 mm.*

Wohl die grösste, robusteste Art, besonders durch den breiten glatten Kopf ausgezeichnet. — Transkaspische Wüste: Karakum; von Freund Fr. Hauser erhalten und ihm zu Ehren benannt. Die Scheibe der Flügeldecken zeigt oft einen unbestimmten dunklen gemeinschaftlichen Flecken.

11. **Übersicht der mit signifer Reitt. und Ramburi Pioch. verwandten Metabletus-Arten.** Dieselben zeichnen sich aus durch gelbe Fühler und Beine, queren Halsschild, welcher vor der Basis

eine quere Furche besitzt, die den andern Gruppen fehlt und durch gelb und schwarz gezeichnete Flügeldecken.*)

- 1'' Flügeldecken schwarz, eine dreieckige Makel an den Schultern gelb. Corfu. *signifer* Reitt.
- 1' Flügeldecken gelb, eine oder zwei Querbinden schwarz.
- 2' Kopf schwarz, Flügeldecken gelb, eine breite Querbinde hinter der Mitte schwarz. Mittelmeergebiet, bis Syrien. *Metabl. Myrmidon* Reitt., non Fairm. *Ramburi* Pioch.
- 2' Kopf schwarz, Clypeus bis zu den Fühlerwurzeln roth, Flügeldecken gelb, eine breite Querbinde in der Mitte, eine schmälere an der Spitze, letztere seitlich mit der anderen zusammenhängend, schwarz. Grösser als die vorige Art, mit dünneren und längeren Fühlern und deutlicheren Streifen auf den Flügeldecken. Long. 2·8 mm. Transkaspien. **fascifer** n. sp.

12. **Potosia Königi** n. sp. Von der Form einer grossen *Cet. floricola*, unten blau mit grünem Schimmer und fein gelblich behaart, oben dunkel violett, glatt und glänzend. Kopf stark punktirt, normal geformt. Halsschild auf der Scheibe sehr fein und wenig sichtbar, an den Seiten kräftiger punktirt, letztere stark gerandet, vor den Hinterwinkeln leicht ausgeschweift, Basis dreibuchtig, die Basalränder mit schmalgrünlichem Scheine. Schildchen blank, glänzend, unpunktirt. Flügeldecken an den Seiten mit Bogenpunkten, hinten gegen die Naht zu gereiht, im Umkreise des Schildchens glatt, Scheibe hinter der Mitte ohne deutliche Querimpression, die Nahtwinkel etwas lappig vorgezogen. Halsschild auf der Unterseite längsrunzelig, Hinterbrust querrunzelig punktirt, letztere in der Mitte glatt. Mesosternalfortsatz sehr lang, stark nach vorn vorragend und gleichzeitig etwas nach abwärts geneigt, glatt, Bauch an den Seiten mit in die Quere gezogenen Punkten, die beiden vorletzten Segmente spärlich aber ganz punktirt. Ende der Mittelschienen lang gegabelt, die Enddornen lang, zugespitzt, unten (wie gewöhnlich) ausgehöhlt, der Länge nach gestrichelt, alle Schienen ohne Kniemakeln, wodurch diese Art in die Verwandtschaft der *metallica* und *cardui* gehört, denen sie auch habituell gleicht. Sie entfernt sich von beiden durch die violette, stark glänzende Oberseite und den mangelnden Discoidaleindruck auf den Decken. Long. 23—24 mm. — Aus Jerusalem. Von Herrn E. Koenig mitgetheilt.

*) Siehe auch Deutsche Ent. Ztschr. 1887 p. 501.

13 **Otiorrhynchus lencoranus** n. sp. Diese Art wurde bisher mit dem kaukasischen *echinatus* Hochh., dem sie sehr ähnlich ist und sehr nahe steht, vermengt, ist aber durch nachfolgende Merkmale sicher specifisch verschieden: Kopf und Rüssel kürzer, der letztere parallel, die Augen sind mehr nach oben gerückt und von obenher sichtbar, auch etwas grösser und weniger flach; Halsschild gröber sculptirt, an der Basis schmaler als am Vorderende, Flügeldecken kürzer eiförmig und mehr gewölbt; endlich ist die ganze Oberseite nicht mit weissen, sondern schwarzen viel länger aufstehenden, an der Spitze verdickten Borstenhaaren besetzt. — In Lenkoran von Leder gesiebt.

14. **Scolytus Koltzei** n. sp. *Scol. pruni* Ratzb. *valde similis sed elytris apice fortiter depressis, depressione dense fortiter substrigose punctata, striis ad latera profundioribus, interstitiis uniseriatim, ad latera irregulariter fortiterque punctatis; pedibus obscurioribus.* Long. 3·5—4·5 mm.

Dem *Scolytus pruni* im hohen Grade ähnlich, und vielleicht bisher als *pruni* aufgeführt. Er unterscheidet sich hauptsächlich und leicht durch die Spitze der Flügeldecken, welche tief niedergedrückt und daselbst grob und dicht etwas längsrunzelig punktirt ist, davor tritt die Anteapicalbeule stark hervor; an den Seiten der Flügeldecken sind einige Streifen stärker vertieft und ihre Zwischenräume stark, ungleich punktirt, ohne Reihen; die Zwischenräume der Scheibe mit einer dichten aber feineren Punktreihe als jene der Streifen. — Chingan (Amur); eine ganze Reihe von Individuen von Herrn W. Koltze in Hamburg erhalten.

15. **Anaglyptus (Cyrtophorus) mysticoides** n. sp. Dem *A. mysticus* L. äusserst ähnlich und bisher mit demselben verwechselt. Er unterscheidet sich hauptsächlich durch die starke Verbreiterung der kurzen, centralen weissen Haarbinde in der Mitte, welche sich meist nach unten bis zu der weissen Binde hinter der Mitte ausbreitet. Ferner dadurch, dass die Seitenstücke der Hinterbrust sehr wenig dichter und heller behaart sind als der übrige Theil der Brust, während diese bei *mysticus* durch ihre dichte weisse Behaarung grell abstechen. Beim ♀ ist die Spitze der Flügeldecken abgerundet, beim ♂ stumpf und schräg abgestutzt, nicht wie beim ♂ vom *mysticus* eine Spitze bildend. — Alle Exemplare aus dem centralen Kaukasus gehören dieser Art an, soweit ich nach den mir vorliegenden Stücken beurtheilen kann.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1894

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Zehnter Beitrag zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches. 122-128](#)