Trigonocnemis nov. gen. Melolonthidarum.

Beschrieben von Dr. G. Kraatz in Berlin.

Herr Hauptmann Hauser theilte mir eine, durch sehr schlanke, dreigliederige Fühlerkeule und kurze, fast dreieckige Hinterschienen ausgezeichnete, mit keiner der mir bekannten Rhizotrogiden-Gattungen unmittelbar verwandte Rhizotrogiden-Gattung aus Turkestan mit, welche sich etwa folgendermassen beschreiben lässt.

Caput clypeo semicirculariter elevato, linea elevata inter oculos a fronte separato. Labrum leviter emarginatum. Mandibulae haud prominentes; palpi maxillares parum prominentes, crassiusculi, acuminati.

Antennae clava triarticulata, maris valde elongata, capite fere longiore, feminae brevior, novemarticulatae, articulo primo apice tumidulo, duobus sequentibus conjunctim longitudine aequali, articulo tertio secundo paullo longiore, 3—5 longitudine inter se subaequalibus, sexto minimo, vix perspicuo, 7—9 clavam valde elongatam formantibus.

Thorax transversus, angulis omnibus obtusis, subrotundatis, supra creberrime, subtilissime punctulatus, pilis tenuibus parum erectis tectus.

Scutellum creberrime punctulatum.

Elytra basi thorace vix latiora, pone medium leviter ampliata, dorso subtiliter punctato-striata (striis 6—8), latera versus irregulariter punctata, angulo suturali fere recto, haud pilosa.

Pygidium crebre subtiliter exasperato-punctatum, longe pilosum.

Abdomen lateribus crebre punctulatum et pilosum.

Mesosternum creberrime et subtilissime punctulatum, longe villosum sicuti prosternum.

Pedes tibiis tarsis multo brevioribus, anticis acute bidentatis, posticis subtriangularibus, tarsis anticis unguiculo exteriori apice fisso, interiore simplici, tarsis posticis articulo primo triangulari, sequentibus sensim paullo minoribus, apice intus longe biciliatis, quinto elongato, unguiculo interno parti basali aequali, externo hoc etiam longiore.

Corpus totum pallide testaceum.

Trigonocnemis Hauseri: *Pallide testacea, thorace dense subtilissime punctulato, pygidio pectore abdomineque fulvo-villosis, capite crebre punctulato, basi laevi, elytris dorso subtiliter punctato-striatis, tibiis posticis subtriangularibus.*

Mas: *Capite minus crebre et subtiliter punctato.*

Fem.: *Capite minus crebre subtilissime punctulato, femoribus tibiisque posticis etiam fortius dilatatis quam in mare.*

Long. 11—12 mm, lat. $5\frac{1}{2}$ mm. (♂)

Ganz bleich strohgelb, der Thorax und die Basis des Kopfes noch heller. Fühlergeißel sehr schlank, etwa von der Länge des Kopfes, die Stirn etwas weniger dicht als der Clypeus punktirt, von ihm durch eine deutliche Linie getrennt, welche etwa in einer Linie mit dem Augenkil liegt. Der Thorax ist an den Seiten sanft gerundet, vor der Mitte verengt, alle Winkel stumpf abgerundet, sehr dicht punktulirt, äusserst fein, lang, ziemlich anliegend behaart. Das Scutellum ist kaum weniger dicht punktirt. Die Fld. sind etwas weniger glänzend als Kopf und Halsschild, auf dem Rücken leicht punktirt gestreift, an den Seiten unregelmässiger, unbehaart. Das Pygidium ist rauh punktirt, lang behaart. Die Hinterschenkel sind ziemlich angeschwollen, die vorderen und mittleren nicht. Die Spitze der Hinterschienen ist nierenförmig, der Rand kurz bedornt. Die beiden Dornen am Innenrande sind kräftig, stumpf zugespitzt. Die Hinterschenkel sind ziemlich stark angeschwollen, wenig länger als die Schienen, welche vor und hinter der Mitte einen Borstenkranz zeigen.

Coleopterologische Notiz.

Von Dr. G. Kraatz in Berlin.

Herr Brenske gibt (pag. 60 dieses Jahrg.) an, dass seine Behauptung, dass das Vorkommen des *Rhizotrogus pilicollis* Ganglb. in Oesterreich noch nachzuweisen, begründet gewesen sei; der Käfer ist aber von Gyllenhal (in Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 90) nach österreichischen, von Megerle mitgetheilten Exemplaren beschrieben.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1894

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Kraatz Gustav

Artikel/Article: [Trigonocnemis nov.gen. Melonthidarum. 171-172](#)