

Beiträge zur geographischen Verbreitung der Tenthrediniden.

Von Prof. P. Gabriel Strobl in Admont.

III. Theil.*)

III. Trib. Lophyrini.

9. *Monoctenus* Ht. (Nur A. M.).

juniperi L. (Ad. 73, Ht. 171). Ai.: (Eb. ♂♀), Melk, an der Bielach häufig um *Juniperus* schwärmend (3 5 Str. 6 ♂, 2 ♀), Seitenstetten, Blümlsberghöhe auf *Quercus*-Laub (13/5 Str. ♀).

obscuratus Hrt. 172, Ad. 74. Melk, Wachberg auf *Pinus*-Scheitern (29/5 Str. ♂). * Mecklenburg (Kon. ♀).

10. *Lophyrus* Ltr.

(H. M., alle von Kon. determinirt und A. M.).

nemorum F. (Ad. 59, 63, Ht. 116). Ai.: (Rog. 2 ♂, 2 ♀, Da. ♀, an *Picea excelsa*-Stämmen Ende Mai Ul. ♂), Wien, Mödling (Rog. 3 ♀), Piesting (Ts. ♂♀). * Harz (Wi ♂♀). A. M.: Germ. bor. (Bri. ♂).

laricis Jur. (Ad. 61, 66, Ht. 131). Ai.: (Meg. 3 ♀), Wien (Rog. 2 ♀), Piesting (Ts. ♂, 4 ♀). * A. M.: Germ. bor. (Bri. ♂♀).

Thomsoni Kon. Ai.: (Kol. ♀). * Fürstenberg in Mecklenburg (Kon. 2 ♂, 3 ♀, A. M. ♂♀).

virens Klg. (Ad. 61, 65, Ht. 119) Ai.: (Da., Eb., Mann, Rog. 3 ♂, 5 ♀), Wien (Mazzola ♀), Baden (August, ♀), Piesting (Ts. 3 ♂, 2 ♀), Gloggnitz (Rog. ♀). A. M.: Hal.: Lemberg (S. G. ♀). * Zerbst (Lamprecht 3 ♀).

pallidus Klg. (Ad. 61, 64, Ht. 126) H. M. Ai.: (Kol., Mann, Si. 2 ♂, 2 ♀), Wien (♂), Dornbach auf *Iinus* (17/10 Rog. 2 ♀), Vöslau (♀), Ti.: Bozen (Mann ♀). A. M.: Ficht 15/6 67, S. G. ♂). * Rheinsberg (Lamprecht ♀), Berlin (Schirmer 3 ♀), Germ. bor. (Bri. ♂♀).

hercyniae Ht. 123 (Ad. 60. 65). H. M. Ai.: Piesting, an der Wand (6/5 66 Ts. ♂). Ban.: Mehadia (Mann ♀). * Kiel (Boje ♀). * A. M.: Schleswig (Kon. ♀ als *herc.*) Sachsen, (Kon. 2 ♀ als *polytomus*; ich kann sie aber von *hercyniae* nicht unterscheiden.), Erzgebirge (Lange 6 ♀ als *pol.*).

polytomus Ht. H. M.: Ai.: (Si., Da., Kol. ♂, 6 ♀), Wien, Dornbach, Doifelhütte im Wienerwalde, Gresten (Rog. 7 ♀), Brühl

*) II. Theil siehe pag. 171.

(Do.), Piesting (Ts. 2 ♂, 16 ♀, Rog. 4 ♂), Mödling (Sf. ♀), Lunz (Kol. ♀). Mor.: Czeladna (Kol. ♀). Boh.: Prachatitz (Ha. 5 ♀). Ban.: Mehadia (Mann 2 ♀). * Berlin (Rog. ♀).

abietis Stein in Wien. Ent. Ztg. 1886, pg. 141—149.

H. M. Ai.: (Rog., Kol. 2 ♂, 3 ♀), Kempilen (♂), Piesting, an der Wand (Ts. 19 ♀, 28 ♂, Rog. 1 Raupe), Crt.: Raibl (Mann ♀). D.: (Kol. ♀). Boh.: Prachatitz (Ha. ♀). A. M. Boh. (Kon. ♀), Erzgebirge (Lange ♂♀).

variegatus Ht. 137, Ad. 60, 69. Ai.: (Kol., Da., Ha., Si. 2 ♂, 8 ♀), Wien (Mazzola ♀, Rog. 2 ♂, 7 ♀). Leithagebirge, Doifel im Wienerwalde, Neuhaus an der Triesting (Rog. 2 ♂, 3 ♀) Piesting, (Ts. ♂, 10 ♀), Kempilen (♀), Schneeberg auf *Pinus pumilio* (Mann ♀), Mödling (Sf. ♂). Boh.: Rostock b. Prag (8/6 S. G. ♂). Ti.: Bozen (Mann 2 ♀). Ban.: Mehadia (Mann ♀). * Berlin (Rog. ♀), Petersburg (Mor. ♀).

frutetorum F. (Ad. 60, 70, Ht. 134) A. M.: Wien, auf *Finus silv.* (S. G. 8/5, ♀ = var. 5 Ht.). * Germ. bor. (Bri. ♂♀).

pini L. (Ad. 59, 67, Ht. 141). H. M. Ai.: (Kol., Si., Wachtl 10 ♂, 7 ♀), Bisamberg (Kol. ♂), Wien, Hainfeld, Furth, Kornenburg (Rog. 3 ♂, 5 ♀), Brühl (Mann ♀), Dornbach (Ha. 3 ♂), Piesting (Ts. 2 ♂, 2 ♀), Neuhaus (2 ♂). * Bautzen (♂♀), Cycladen (Si. 2 ♀). A. M.: St.: Kaiserau bei Admont, 1300 m, auf einer *Pinus Cembra* einst so häufig, dass der Baum fast nadellos wurde (Str. aus Puppen ♂♀), Waldlichtungen des Dörfstein bei Admont (18/6 Str. ♀). Hal.: Lemberg (S. G. ♂, ♀ u. Puppen). * Zerbst (Lamprecht 5 ♂, 5 ♀).

similis Ht. 160, (Ad. 61, 69 und *eremita* Thms. Ad. 67):

H. M. Ai.: (Da., Si., Wachtl ♂, 3 ♀, Rog. 2 Raupen), Triesting (Rog. ♀). * Hessen (♀). * A. M. Mecklenburg (Kon. ♀).

socius Klg. (Ad. 60, 71, Ht. 167). H. M. Ai.: (Da., Mann ♂, 2 ♀), Wien (Rog. ♂, 5 ♀, 3 Raupen), Piesting (Ts. 5 ♂). A. M. Ai. (Eb. ♂). Rostock bei Prag (S. G. ♂).

rufus Retz (Ad. 62, 71, Ht. 164). Ai.: (Da., Eb., Kol., Rog., Si. 27 ♂, 15 ♀), Wien, Prater (Hammer und Rog. ♂, 3 Raupen), Dornbach auf *Pinus silv.* (Rog. 6 ♀), Pottenbrunn (2 ♀), Piesting (Ts. 2 ♀), Seitenstetten im Franzosenwäldchen (29 9 Str. ♀). As.: Kirchdorf (Rog. 2 ♂). Boh.: Prag (S. G. ♂). Hal.: (Henschel 9 ♀). Tr. Torva (Mann ♀). * Germ. bor. (Bri. ♂), Petersburg (Mor. ♀), Toscana (Mann ♀).

pallipes Klg. H. M. Aus? (Si. ♂).

IV. Trib. Lydini.**II. Lyda F.**

(H. M. und A. M. — Wichtig ist die Abhandlung Giraud's über die in Oesterreich beobachteten Arten in Zool. Bot. Ges. 1861, pag. 81—92.)

reticulata L. (Ad. 508, Ht. 334, Gir. 83) Ai.: (Fr., Wi. 2 ♀), Wien und botan. Garten (2 ♀), Kahlenberg (♂), Melk, Seitenstetten, auf *Pinus silv.* (Mai, Str. 2 ♀). Mor.: (Rog. ♀). Boh.: Prachatitz (Ha. ♀). Sil.: Meltsch (♀). Ti.: Bozen (Schletterer ♂).

hypotrophica Ht 336 (Ad. 515. Gir. 83) Ai.: (Eb., Kol., Da., Henschel 37 ♂, 6 ♀), Donauauen (Ha. ♀), Piesting (Ts. 7 ♂, 2 ♀), Mödling (Kollar ♂), Lunz (Kaufmann ♂), Melk, Donauleithen auf *Picea excelsa* (6/6, Str. ♂), Seitenstetten, im Huberholz und Franzosenwäldchen um *Picea excelsa* fliegend häufig, selten auf *Quercus*-Laub und *Corylus*, 1/5—2,6 (Str. 14 ♂, 1 ♀), Sonntagberg an *Picea excelsa* (9,8 Str. ♂). Mor.: Ostrau (Kol. ♀). Boh.: Prachatitz (Ha. ♀), Erzgebirge (Lange, ♀). Crt.: Raibl (Mann ♂). * Toscana (Mann ♀).

var. saxicola Ht. 339. (als Art). Lemberg (S. G. ♂. — Konow bestimmte sie mir als *hypotr.*; sie stimmt genau mit *saxic.*).

arvensis Pz. (Ad. 515, *alpina* Kl. Ht. 340, Gir. 86). Ai.: Piesting (21/4 67, Ts. ♀), Melk auf Gesträuch bei Pöverding (30/5 Str. ♂), Seitenstetten auf einem Baumstamme (17/4, Str. ♂). Boh.: Prag (S. G. ♀), Erzgebirge (Lange, ♀). St.: Waaggraben bei Hieflau (28,5 75, Str. ♂).

var. 1. Ht. 341 = v. *testacea* Zadd. Ai.: (Eb., Da., Kol., Si., Ul. 11 ♀, 1 ♂), Piesting (Ts. 3 ♂). Boh.: Erzgebirge (Lange 2 ♀). Cro.: Fiume (Mann ♀). * Petersburg (Mor. ♀).

var.? Falleni Dlm. (Gir. l. cit. 84 u. Ad. 514 als Art, Konow in litt. als v. *annulicornis* Ht. 343). Ai.: (Si. ♀), Piesting (Ts. 3 ♂, 3 ♀), Seitenstetten, im Lärchenwäldchen unter Bäumen s. lfg. (4/5 91 Str. 19 ♂). Boh.: Erzgebirge (Lange 2 ♀). Färbung beim ♂ sehr constant: Kopf mit 7—9 gelben Flecken; die 2 Schaftglieder der Fühler theilweise schwarz; Geisselglieder anfangs hellroth, dann braun, alle — besonders deutlich die ersten — an der Spitze äusserst fein weiss geringelt. Thorax schwarz, nur Schüppchen und Rand des Pronotum rostroth. Hinterleib schwarz, aber oben und unten überall mit rothgelbem Seitenrande; die 2—4 vorderen Schenkel in der Basalhälfte oder wenigstens an der Basis schwarz.

erythrogastra Ht. 339, Ad. 513. Im H. M. nur vom Harz 1 fragliches ♀. Bei Seitenstetten im Franzosenwäldchen auf *Picea excelsa* (5/5, Str.) 1 ♂, von Kon. determ.; hat ganz gelbe Schenkel; dürfte wohl Var. von *hypotr.* sein.

stellata Christ (Nur H. M.) Ai.: (Da., Meg., Rog., Si., Wi. 2 ♂, 6 ♀), Elsdorf, Oberweiden (Kol. ♂, 3 ♀), Gloggnitz (Rog. ♀), Marchfeld (Kollar 2 ♀). Boh.: Prachatitz (Ha. ♀). Hal.: Krakau ♂). Crt.: Grossglockner (Mann ♀).

laricis Gir. Z. B. G. 1861, 91. Ad. 493. Ai.: Neuhaus a. d. Triesting auf *Larix europ.* (Rog. 2 ♂). Piesting (Ts. ♂ ♀ A. M.).

campestris L. (Ad. 493, Ht. 334, Gir. 82) Ai.: (Da., Ul. 2 ♀), Wien (Br. ♀), Vöslau (♀), Piesting (18, 6 90 Ts. als *aurant.* in A. M.). Carn.: (Mann ♀). Hal.: Lemberg (♀). * Petersburg (Mor. ♀).

pumilionis Gir. Z. B. G. 1861 p. 90, Ad. 495. (nur H. M.). Ai.: (Rog ♂), Schneeberg (Fr. ♀, 10/6 Habich ♀, Ts. ♀, 2 ♂). Crt.: (Mann ♀). Ti.: Monte Piano (Mann ♀).

erythrocephala L. (Ad. 490, Ht. 326, Gir. 82). Ai.: (Eb., Kol., Wi. ♀, 3 ♂, Da. auf *Pinus Strabus* ♂, 2 ♀), Wien (S. G. ♀), Schönbrunn auf *Pinus Strobus* (Kollar ♀), Mödling auf *Pin. austriaca* (Rog. ♀), Piesting (Ts. 2 ♂, 2 ♀), Brühl, Kaltenleutgeben, Schneeberg (Mann 3 ♀). As.: Traunstein (Rog. ♀). Boh.: Prag (S. G. ♀). Hal.: Lemberg, Mai 863 (S. G. ♂). Cro.: Fiume (Mann ♀). * Zerbst (Lamprecht ♀), Schwerin (Kol. 3 ♀), Petersburg (Mor. u. Kolenati 2 ♀).

flaviceps Retz (Ad. 490, *cyanea* Klg. Ht. 329) Prag (Rog. 2 ♂). D.: (Mann ♀). St.: Um den Scheiplsee des Bösenstein, 1600 m., 26,5 90 (Str. 2 ♀).

flaviventris Retz (Ad. 516, *clypeata* Klg. Ht. 344, Gir. 86). Ai.: (Br., Ferr., Si., Wi. 4 ♀), Piesting (Ts. ♂ ♀), Mödling (Rog. 2 ♂, 1 Raupe). Hal.: Lemberg (S. G. ♀).

nemoralis L. (Ad. 512, *punctata* F. Ht. 345, Gir. 86). Ai.: (Eb., Kol., Meg., Walzl 2 ♂, 4 ♀), Spitz a. d. Donau auf *Prunus Armeniaca* als Schädling (Bg. 3 ♂, 12 ♀).

fausta Klg. (Gir. 86), H. M. — Ai.: (Ul., Meg., Mazzola Piesting (Ts.). Hu.: Ofen (Ak., Rog). Fiume (Mann ♂, 2 ♀).

betulae L. (Ad. 508, Ht. 344, Gir. 83). Ai.: (Eb., Fr., Kol., 9 ♀, auf *Populus pyramid.* Kollar ♀), Kronstein (Be. ♀). Prater bei Wien (Bg., Mann, Rog. ♂, 4 ♀), Weidling (Kol. ♂), Bergen (Mann ♂), Deutsch-Altenburg (Prochaska ♂), Donauauen (Ha. ♂). Ofen (Ak. ♀). D.: (Mann ♂). Lemberg (S. G. ♂).

inanita Vill. (Ad. 499, Gir. 87, *inavis* Klg. Ht. 347). Ai.: (Eb., Da., Kol., Meg., Wi. ♂, 7 ♀), Wien, am Glacis (Mann 2 ♀).

neglecta Zadd. H. M. St.: Aflenz (1881, Do. ♀).

arbustorum F. H. M. von? (Kol. 2 ♀). Fiume (Mann ♀).

silvatica L. (Ad. 511, Ht. 347, Gir. 87). Ai.: (Da., Eb., Ul., Wi. 13 ♀, 3 ♂), Wien (Mann 2 ♀), Piesting (Ts. ♀), Hütteldorf (Kol. 2 ♀); Seitenstetten auf *Picea excelsa* im Huberholz und Franzosenwäldchen, 4/5, 20/5, Sonntagberg auf Laub 15/6 (Str. 3 ♀). St.: Admont (1/7 Str. ♀). Boh.: Prag (S. G. ♂). Erzgebirge (Lange 2 ♀, eines mit rothgefleckter Mitte der Oberseite und gelbgesäumten Ringen der Unterseite des Hinterleibes). Hal.: Lemberg (7/5 54, S. G. 2 ♂). * Petersburg (Mor. 2 ♀).

hortorum Klg. (Ad. 510, Ht. 345, Gir. 86). Ai.: (Da., Eb., Wi. 5 ♀, 3 ♂); Melk, im Stiftsgarten (9/5 83 Str. ♂). St.: Strasse nach Hohentauern um *Pic. excelsa* fliegend (25/5 90, Str. ♂). Boh.: Prag (S. G. ♂). Ti.: (♀). Fiume (Mann ♀).

aurantiaca Gir. Z. B. G. 1857 p. 183, Ad. 503. Ai.: Seitenstetten auf Gesträuch an Bachufern (21/5 91, Str. ♀). Gir. erwähnt auch 2 ♀ aus dem H. M., ich sah aber daselbst keines.

cingulata Ltr. Im H. M. als *baltata* Fll. 3 ♂, 2 ♀ v. Meg., Si., Kol. ohne näheren Fundort; wohl aus Ai.

stramineipes Hrt. 347. (H. M.) Ai.: (Mazzola, Si. 2 ♀). Boh.: Braunau (Borm ♀). Cro.: Fiume (Mann ♀).

Gyllenhali Dhlb. (Ad. 509). St.: Im Gesäuse auf einem Ennssteine (6/8 91, Str. ♀). * H. M. Sonderburg (Wüstnei ♀).

flavipes Zett. = *pallipes* Zett. Ad. 505. (A. M.) Ai.: Piesting (Ts. 13/4 66 als *balt.* ♀). St.: Auf *Alnus viridis* um den Scheiplsee des Bösenstein, 1700 m. (1/8 92 Str. 2 ♀).

latifrons Fll. H. M.: Aus Ai.? (Meg. 2 ♂, Mazzola 2 ♀).

histrion Ltr. Hu.: Ofen (Ak. ♀).

depressa Schrk. (Ht. 346, Ad. 502, Gir. 87). Ai.: (Da., Eb., Meg., Wi. 4 ♂, 6 ♀), Wien (Mann, S. G. 4 ♀), Donauauen (Ha. ♂ ♀), Hütteldorf (Kol. 11 ♀), Melk, auf Gesträuch im Stiftsgarten (19/6 Str. ♀). Boh.: Prag (S. G. 3 ♀). Salzburg: Gastein (Wi. ♀). St.: Aflenz (Do. 2 hellgelbe Raupen und Frassblätter von *Alnus incana*).

fulvipennis Zadd. H. M. Boh.: Kaschañ (Mai 1868, ♀). D.: (1811, ♀).

marginata Lep. Von? im H. M. 2 ♀ (Meg., Fr.).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Strobl Gabriel

Artikel/Article: [Beiträge zur geographischen Verbreitung der Tenthrediniden. Theil III. 194-198](#)