download unter www.biologiezentrum.at

Die palaearctischen Arten der Coleopt.-Gattung Bangasternus Gozis (Coelosthetus Cap.).

Gegeben von **Edm. Reitter** in Paskau (Mähren).

1'' Fusskrallen von gleicher Länge.

2'' Rüssel an der Spitze plötzlich eingeschnürt und verschmälert.

3'' Lang und schmal, parallel, Flügeld. viel mehr wie doppelt so lang als zusammen breit. — Sicilien, Algier. **siculus** Cap.

3' Kürzer und breiter, Flügeldecken an den Seiten etwas gerundet, kaum ganz doppelt so lang als zusammen breit.

a'' Grösser und breiter; Rüssel mit deutlichem, vorn gerinntem Mittelkiel. — (Long. 6—7 *mm.*) — Auf der ganzen Balkanhalbinsel, Kleinasien und Syrien. **planifrons** Gyll.

a' Kleiner (5 *mm.*) und schmäler; Rüssel mit undeutlichem Mittelkiele, vorn mit feiner Rinne. Dem *orientalis* sehr ähnlich; Fühler, Schienen und Tarsen braunroth. Halsschild auch an der Basis etwas gerundet eingezogen, Toment gelblich, auf den Flügeld. mit greiser Marmorirung; Unterseite dicht greis behaart, dichter punktirt, wie geschuppt, die Punkte wie bei den andern Arten pupillirt und jeder mit einem langen, dreispitzigen Haare. — Araxesthal bei Ordubad. **Araxis** n. sp.

2' Rüssel an der Spitze nur etwas und schwach verschmälert.

4'' Grösser (5.5 *mm*). Hinterwinkel des Halsschildes rechteckig, oder beinahe so. Oberseite mit greiser Behaarung. — Algier, Spanien. **villosus** Cap.

Oberseite mit röthlicher Behaarung, Halsschild mit feiner, punktfreier Längslinie. — Spanien. **v. hispanicus** Cap.

4' Klein, (4 *mm*). Hinterwinkel des Halsschildes sehr stumpf. Südspanien. **Diecki** Cap.

1' Fusskrallen von ungleicher Länge.

5'' Rüssel bis zum Vorderrand der Augen viel länger als breit.

6'' Rüssel mit starkem Mittelkiel, die Seiten scharf gerandet. Grössere Art. (Long. 5—6 *mm*). — Im südöstlichen Europa, Kaukasus, Kleinasien. **orientalis** Cap.

6' Rüssel mit undeutlichem Mittelkiel, oder ohne solchen, oben flach, die Seiten nicht scharf gerandet. (Long. 4 *mm.*) — Südfrankreich, Italien. **provincialis** Fairm.

5' Rüssel bis zum Vorderrande der Augen nicht länger als breit. Kleinste, schmale Art. (Long. 4 *mm.*) Araxesthal, Amasia. **Fausti** Reitt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Wiener Entomologische Zeitung

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: 14

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: Die palaearctischen Arten der Coleopt.-Gattung Bangasternus GOZIS (Coelosthetus CAP.). 257