Beiträge zur geographischen Verbreitung der Tenthrediniden.

Von Prof. P. Gabriel Strobl in Admont.

IV. Theil.*)

12. Tarpa F.

(Von nun an nur A. M.).

flabellicornis Germ. (Ad. 488). Cro. (c. Kon. 8).

* **Loewi** Stein Stett. Ent. Ztg. 1876 pg. 56, 6, Ad. 486. Araxesthal (c. Kon. φ).

* Iuteiventris Kon. Tenie el Haad, Algier (c. Kon. ♂). flavicornis Klg. (Ad. 482, Ht. 318). Boh.: Prag (S. G. 2 \oplus). plagiocephala F. (Ad. 467, Ht. 317). Ai.: (Eb. \oplus), Brühl (30/7 S. G. ♂). Hal.: Lemberg, Winniki (S. G. ♂\oplus).

spissicornis Klg. (Ad. 477, Ht. 317). Ai.: (Eb. \mathcal{S}), Brühl auf Dolden (4/7 S. G. 3 \mathcal{Q}), Seitenstetten (\mathcal{S}). St.: Admont auf Waldblumen (Jul. Str. \mathcal{S}). Ti.: Bergwiesen der Zirlermähder bei Innsbruck (Str. $\mathcal{S}^{\prime}\mathcal{Q}$).

cephalotes F. (Ad. 485, Ht. 316). Ai.: (Eb. \circ), Melk, auf Gesträuch am Teiche bei Winden (25/5 Str. \circ).

V. Trib. Cephini. 13. Cephus Str.

Parreyssii Spin. (Ad. 528. Dalmatien (Eb. Q).

* haemorrhoidalis Gm. (Ad. 532, analis Klg. Ht. 362.) Syra (Eb. \circlearrowleft).

phthisicus Fbr. (pallipes Klg. Ad. 527, Ht. 362). Ai.: (Eb. \circ).

pilosulus Thms. (pumilus Mcs. Ad. 529). Ai.: Seitenstetten, auf Wiesen des Blümelsberges 19/5, 1,6 90 (Str. 2 normale 3 und 1 3, var.: Hüften, Schenkelringe und Hinterschenkel ganz schwarz).

brachycerus Thms. (Ad. 547). Seitenstetten, auf Wiesen des Blümelsberges 19/5, 22,5 (Str. 2 \circ). Ob nicht \circ zu pilosulus? — ist auch von pygmaeus nur durch die Hinterschienen unterscheidbar.

nigrinus Thms. (Ad. 531). Lemberg (26,553 S. G. 3). Ai.: Melk, auf Rainen bei Winden (2,683, Str. φ).

pygmaeus L. (Ad. 546, Ht. 361, spinipes Pz. Ht. 361, Q,

^{*)} III. Theil siehe pag. 194.

floralis Klg. Ht. 362 (eine var.). Ai.: Um Melk, Amstetten. Seitenstetten allenthalben im Grase und Getreide, $\circlearrowleft \circlearrowleft$ s. hfg., auch nicht selten auf Blüthen von Umbelliferen und Cruciferen (19/5—24/6, Str.); Wien (S. G. 5 \circlearrowleft). St.: Admont (Str. \circlearrowleft). Ti.: Innsbruck bis in die Bergthäler (Str.). Hal.: Lemberg, auf Getreide häufig (17/6 60, S. G. 3 \circlearrowleft u. v. floralis \circlearrowleft).

tabidus Fbr. (Ad. 535, IIt. 363). Ai.: (Eb. 9).

troglodyta F b r. (Ad. 535, Ht. 360). A i.: (Eb. \emptyset), Bistritzthal (6/6 51, S. G. \emptyset).

(Phylloecus) femoratus Curt., cynosbati Ad. 531. var.: Alle Schenkel fast ganz roth, die hinteren Schenkelringe ebenfalls theilweise roth, alle Schienen mit gelbem Basaldrittel, die vorderen sonst rothgelb, die Hinterschienen und Hintertarsen sonst tiefschwarz. Ai.: Seitenstetten auf Bachgesträuch (20/5 91, Str. Q).

fumipennis Ev. (Ad. 535, Ht. 363). Dalmatien (Eb. ♂). Innulatus n. sp. ♀. 14 mm. Aterrimus, nitidulus, mandibulis pedibusque rufis, 3.—6. abdominis segmento utrinque lunula albida marginali.

Diese Art fehlt in André, nach welchem man auf Nr. 30 (funipennis) gelangt, fellt auch im Hofmuseum und ist Herrn Konow unbekannt, - Tiefschwarz, ziemlich glänzend, überall dicht und fein punktirt, fein anliegend behaart. Kopf fast kubisch: Fühler von der Länge des Thorax, fast fadenförmig, nur wenig gegen das Ende verschmälert. Oberkiefer gelb mit rothen Zähnen. Hinterleib etwas seitlich zusammengedrückt, durchaus schwarz, aber der Seitenrand des 3. bis 6. Ringes mit fast reinweissem Saume, der an der Grenze zwischen Seiten- und Hinterrand am breitesten ist und sich verschmälert, auch etwas am Hinterrande fortsetzt. Hüfte und 1. Schenkelring schwarz, sonst die Beine durchaus hell rothgelb, Tarsenendglied etwas dunkler. Flügel glashell, Randmal und Adern dunkelbraun, die Transverso-Discoidalader etwas braun gesäumt. Die Margino-Discoidalader mündet in den Anfang der 2. Cubitalzelle. - Ai.: Melk, auf Gesträuch im Stiftsgarten (1/6 83, Str. ♀).

linearis Schr. (faunus Thms. Ad. 543). A i.: Melk, auf Sandrainen (30/6, Str. φ).

Satyrus Pz. (Ad. 547). Ai.: Melk, auf grasigen Rainen (31/5, Str. o³).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Wiener Entomologische Zeitung

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: 14

Autor(en)/Author(s): Strobl Gabriel

Artikel/Article: Beiträge zur geographischen Verbreitung der

Tenthrediniden. IV. Theil. 264-265