

## Beiträge zur geographischen Verbreitung der Tenthrediniden.

Von Prof. P. Gabriel Strobl in Admont.

### IV. Theil.\*)

#### 12. Tarpa F.

(Von nun an nur A. M.).

*flabellicornis* Germ. (Ad. 488). Cro. (c. Kon. ♂).

\* *Loewi* Stein Stett. Ent. Ztg. 1876 pg. 56, ♂, Ad. 486.  
Araxesthal (c. Kon. ♀).

\* *luteiventris* Kon. Tenie el Haad, Algier (c. Kon. ♂).

*flavicornis* Klg. (Ad. 482, Ht. 318). Boh.: Prag (S. G. 2 ♀).

*plagiocephala* F. (Ad. 467, Ht. 317). Ai.: (Eb. ♀), Brühl  
(30/7 S. G. ♂). Hal.: Lemberg, Winniki (S. G. ♂ ♀).

*spissicornis* Klg. (Ad. 477, Ht. 317). Ai.: (Eb. ♂), Brühl  
auf Dolden (4/7 S. G. 3 ♀), Seitenstetten (♂). St.: Admont auf  
Waldblumen (Jul. Str. ♂). Ti.: Bergwiesen der Zirlermälder  
bei Innsbruck (Str. ♂ ♀).

*cephalotes* F. (Ad. 485, Ht. 316). Ai.: (Eb. ♀), Melk,  
auf Gesträuch am Teiche bei Winden (25/5 Str. ♀).

### V. Trib. Cephini.

#### 13. Cephus Str.

*Parreyssii* Spin. (Ad. 528. Dalmatien (Eb. ♀).

\* *haemorrhoidalis* Gm. (Ad. 532, *analıs* Klg. Ht. 362.)  
Syra (Eb. ♀).

*phthisicus* Fbr. (*pallipes* Klg. Ad. 527, Ht. 362). Ai.:  
(Eb. ♀).

*pilosulus* Thms. (*pumilus* Mcs. Ad. 529). Ai.: Seiten-  
stetten, auf Wiesen des Blümelsberges 19/5, 1,6 90 (Str. 2  
normale ♂ und 1 ♂, var.: Hüften, Schenkelringe und Hinter-  
schenkel ganz schwarz).

*brachycerus* Thms. (Ad. 547). Seitenstetten, auf Wiesen  
des Blümelsberges 19/5, 22,5 (Str. 2 ♀). Ob nicht ♀ zu *pilo-*  
*sulus*? — ist auch von *pigmaeus* nur durch die Hinterschienen  
unterscheidbar.

*nigrinus* Thms. (Ad. 531). Lemberg (26,5 53 S. G. ♂).  
Ai.: Melk, auf Rainen bei Winden (2,6 83, Str. ♀).

*pigmaeus* L. (Ad. 546, Ht. 361, *spinipes* Pz. Ht. 361, ♀,

\*) III. Theil siehe pag. 194.

*floralis* Klg. Ht. 362 (eine var.). A i.: Um Melk, Amstetten. Seitenstetten allenthalben im Grase und Getreide, ♂♀ s. hfg., auch nicht selten auf Blüten von Umbelliferen und Cruciferen (19/5—24/6, Str.); Wien (S. G. 5 ♂). St.: Admont (Str. ♀). Ti.: Innsbruck bis in die Bergthäler (Str.). Hal.: Lemberg, auf Getreide häufig (17/6 60, S. G. 3 ♀ u. v. *floralis* ♂).

*tabidus* Fbr. (Ad. 535, Ht. 363). A i.: (Eb. ♀).

*trogloodyta* Fbr. (Ad. 535, Ht. 360). A i.: (Eb. ♀), Bistritzthal (6/6 51, S. G. ♀).

(*Phyllococcus*) *femoratus* Curt., *cynosbati* Ad. 531. var.: Alle Schenkel fast ganz roth, die hinteren Schenkelringe ebenfalls theilweise roth, alle Schienen mit gelbem Basaldrittel, die vorderen sonst rothgelb, die Hinterschienen und Hintertarsen sonst tiefschwarz. A i.: Seitenstetten auf Bachgesträuch (20/5 91, Str. ♀).

*fumipennis* Ev. (Ad. 535, Ht. 363). Dalmatien (Eb. ♂).

*lunulatus* n. sp. ♀. 14 mm. *Aterrimus*, *nitidulus*, *mandibulis pedibusque rufis*, 3.—6. *abdominis segmento utrinque lunula albida marginali*.

Diese Art fehlt in André, nach welchem man auf Nr. 30 (*fumipennis*) gelangt, fehlt auch im Hofmuseum und ist Herr Konow unbekannt. — Tiefschwarz, ziemlich glänzend, überall dicht und fein punktiert, fein anliegend behaart. Kopf fast kubisch; Fühler von der Länge des Thorax, fast fadenförmig, nur wenig gegen das Ende verschmälert. Oberkiefer gelb mit rothen Zähnen. Hinterleib etwas seitlich zusammengedrückt, durchaus schwarz, aber der Seitenrand des 3. bis 6. Ringes mit fast reinweissen Saume, der an der Grenze zwischen Seiten- und Hinterrand am breitesten ist und sich verschmälert, auch etwas am Hinterrande fortsetzt. Hüfte und 1. Schenkelring schwarz, sonst die Beine durchaus hell rothgelb, Tarsenendglied etwas dunkler. Flügel glashell, Randmal und Adern dunkelbraun, die Transverso-Discoidealader etwas braun gesäumt. Die Margino-Discoidealader mündet in den Anfang der 2. Cubitalzelle. — A i.: Melk, auf Gesträuch im Stiftsgarten (1/6 83, Str. ♀).

*linearis* Schr. (*faunus* Thms. Ad. 543). A i.: Melk, auf Sandrainen (30/6, Str. ♀).

*Satyrys* Pz. (Ad. 547). A i.: Melk, auf grasigen Rainen (31/5, Str. ♂).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Strobl Gabriel

Artikel/Article: [Beiträge zur geographischen Verbreitung der Tenthrediniden. IV. Theil. 264-265](#)