

## Beiträge zur geographischen Verbreitung der Tenthrediniden.

Von Prof. P. Gabriel Strobl in Admont.

### VII. Theil. \*)

#### (27. *Pteronus* Jur. — Fortsetzung.)

*ribesii* Sc p. (Ad. 173, *ventricosus* Ht. 196). A i.: (Eb. ♂-var. Hinterleib auch oberseits ganz roth — und 2 ♀); Melk, Waldränder auf Laub (7/5 ♂-var. alle Schenkel unterseits mit schwarzer Strieme). St.: Admont, auf Gesträuch längs der Enns (13/8 4 ♂). \* Germ. bor. (Bri. ♂♀ als *ventric.* — teste Kon.).

\* *melanocephalus* Ht. 219, Ad. 108. Mecklenburg (Kon. ♀).

*salicis* L. (Ht. 194, Ad. 220). A i.: Piesting (Ts. ♂♀). — Boh.: Prag (S. G. ♂). Hal.: Lemberg, auf Sandhaufen (17/7, 22/7 S. G. ♀, 2 ♂).

*incompletus* Frst. Ad. 168? St.: Admont, auf *Salix*-Blüthen (2/5, Str. ♂. Stimmt sonst genau nach Ad., nur ist die obere Hälfte der hinteren Augenränder breit rothgelb. Kon. schrieb dazu: „Mir unbekannt“).

#### 28. *Amauronematus* Kon.

*histrion* Lep. (Ad. 105, *rufescens* Ht. 191) A i.: (Eb. 2 ♀ teste Kon.).

*nigratus* Retz (Ht. 220, Ad. 213, *canaliculatus* Ht.) A i.: Seitenstetten, Waldränder am Blümlersberg (3/5 Str. ♀, det. Kon.; ich bestimmte ihn als *melanosternus* Lep. Ad. 213, der nach Ht. damit synonym ist). \* Mecklenburg (Kon. ♀).

*moerens* Frst. (Ad. 144) Lemberg (S. G. ♀; Kon. schrieb dazu: „Mir unbekannt“). Das Ex. stimmt jedenfalls, wie ich mich seither überzeugte, genau mit *moerens*, den Kon. Cat. als Synonym zu *canalicul.* (sub *Pachynematus*) aufführt; beide gehören aber teste Kon. i. litt. zu *Amauronematus*.

*fallax* Lep. (Ad. 107 pr. p.). A i.: Seitenstetten, in Waldlichtungen (15/5, Str. ♀). Boh.: Kaplitz (Kirchner ♀, teste Kon.). St.: Admont, Ennsufer auf blühender *Salix* (12/5, Str. ♀).

*humeralis* Zett. A i.: Seitenstetten, auf Knospen (April, Str. ♀ teste Kon.).

\*) VI. Theil siehe pag. 8—12.

**viduatus** Zett. (Ad. 138). A i.: Melk, Donauufer auf *Salix amygdaloides* (17/4 Str. ♂). Kon. schrieb dazu: „Unbekannt“. Das Ex. stimmt fast vollkommen nach Ad. — Mund, ein feiner Saum der hinteren Augenränder und des Pronotum ist weisslich, ebenso alle Knie und die Vorderseite der vier vorderen Schienen; der übrige Körper ist schwarz, nur die Afterspitze theilweise roth. 6 mm. — Das mir von Kon. als *viduat.* gesendete Paar muss ich für *Pontania puella* halten.

### 29. Croesus Leach.

**septentrionalis** L. (Ad. 99, Ht. 184). A i.: (Eb. ♂).

\* Germ. bor. (Bri. ♀).

**var. laticrus** Vill. (Ht. 186). A i.: Melk, in Waldgras bei Winden (17/7 Str. ♀). B o h.: Prag (August S. G. ♀).

**latipes** Vill. (Ad. 101, Ht. 185). A i.: (Eb. ♀). S t.: Gesäuse, auf Farnblättern (1/8 Str. ♀).

**varus** Vill. (Ad. 101, Ht. 186). S t.: Admont, auf Gesträuch bei Hall und im Krumauermoore (Jul., Aug. 2 ♀).

### 30 Holcocneme Kon.

**coeruleocarpa** Ht. 187, Ad. 113. A i.: Wien (16/5 S. G. ♀). S t.: Admont, Gesträuch am Ennsufer (14/8 Str. ♀).

**insignis** Ht. (Ad. 105). A i.: Piesting, an der Wand (3/6 Ts. ♀).

**lucida** Pz. (Ad. 104, Ht. 187). A i.: Seitenstetten, Waldgebüsch am Blümelsberg (3/5 Str. ♀).

### 31. Nematus Jur.

**abdominalis** Pz. (Ad. 179, *ventralis* Ht. 192). A i.: (Eb. ♀); Melk, Donauufer auf Gesträuch, bei Pöverding auf *Crataegus* (Ende Mai, Str. 2 ♀); Amstetten, in den Ybbsauen (20/6 Str. ♀) B o h.: Bistritzthal (6/6 S. G. ♀). S t.: Admont, längs der Enns auf *Alnus* (Ende Mai, Str. 3 ♂), in Waldlichtungen auf *Petasites* (5/7, 28/6 3 ♀), Gesäuse auf Blattpflanzen (18/6 Str. 2 ♀). \* Germ. bor. (Bri. 2 ♂).

**luteus** Pz. (Ad. 214, Ht. 195). A i.: Wien, Piesting (Eb. u. Ts. ♀, 3 ♂ teste Kon.; 1 ♂ ist eine Var. mit rothgefleckten Brustseiten, die = *contractus* Ev. Ad. 214 sein dürfte); Melk, Donauufer auf Kräutern (30/4 Str. ♀); Seitenstetten, an Waldrändern auf *Quercus* etc. (2/6, 27/6 Str. ♂♀). S t.: Tauernstrasse, auf einem Holzblocke (28/5 Str. ♀). C a r.: Kühwegeralpe (16/7 Str. ♀).

**aurantiacus** Klg.? (Ad. 217, Ht. 197, ♀). A i.: Seitenstetten auf Laub (10/5 Str. ♂; es stimmt sonst genau mit der Beschreibung des ♀, nur sind die Ränder der Thoraxlappen und ein grosser Fleck auf dem Schildchen rothgelb; die Mitte der Brust trägt einen grossen schwarzen Querfleck).

**bilineatus** Klg. (Ad. 223). A i.: (Eb. ♂ teste Kon.); Seitenstetten, am Stiftsteich und an Bachufern auf *Alnus* (21/5, 9/6 Str. 3 ♂). B o h.: Prag (S. G. ♂).

### 32. Pachynematus Kon.

**capreae** Pz. (Ad. 198). A i.: Piesting, an der Wand (7/5 Ts. ♀ teste Kon.). B o h.: Prag (S. G. ♀; dieses ♀ ist wohl nach Kon. von *capreae* verschieden, scheint mir aber doch nur eine dunklere Form mit grösserem Thoraxfleck und oberseits fast ganz schwarzem Hinterleibe; nur der letzte Ring und der Endsaum des vorletzten sind rothgelb).

\* **rumicis** Fll. (Ad. 156, *capreae* Ht. 198). Germ. bor. (Bri. ♂♀).

**circumscriptus** Frst., *Schmidtii* Gim. Ad. 137; St.: Admont, Gesträuch an der Enns (24/5 Str. ♂).

**leucogaster** Ht. Ad. 179. St.: Admont auf *Alnus* (24/5 Str. ♂), Kaiserau auf Sumpfwiesen (18/6 Str. ♀). Mor.: (c. Kon. ♀).

**obductus** Ht. 201, Ad. 176. A i.: Melk, Donauau auf Gesträuch (14/7 Str. ♀), bei Pöverding auf *Fagus* (12/5 Str. ♂); Seitenstetten, im Franzosenwäldchen zwischen Fichten fliegend (22/4 1 normales ♂ u. 1 ♂, var.: Bauch und Schenkel grösstentheils schwarz). St.: Admont auf Gesträuch an der Enns (18/7, 13/8 Str. 2 ♀, var.: Schenkel ganz ohne schwarze Partien). Hal.: Lemberg (S. G. 2 ♀).

**scutellatus** Ht. 214, Ad. 201. A i.: Piesting, an der Wand (7/5 Ts. ♂ teste Kon.); Seitenstetten, auf *Abies excelsa* im Huberholz und Franzosenwäldchen häufig (22/4—15/5 Str. 22 ♂). St.: Am Scheiplsee des Rottenmanner Tauern (1600 m, 26/5 Str. ♀ teste Kon.).

**pallescens** Ht. 216, Ad. 180. A i.: Melk, Gesträuch im Stiftsgarten (9/6 Str. ♀).

**nigriceps** Ht. Ad. 207. St.: Gesäuse auf Waldblättern (18/6 Str. ♀ teste Kon.).

\* **xanthocerus** Ht. (*posticus* Frst. Ad. 211). Germ. bor. (Bri. ♂♀ als *xanthopus* Zdd.).

\* **albipennis** Ht. 196. Ad. 208. Germ. bor.: (Bri. ♂♀).

### 33. *Lygaeonematus* Kon.

***compressus*** Ht. 213 (*Saxeseni* var. Ad. 171). Ai.: Piesting (Ts. ♂, 2 ♀); Melk, an Waldrändern (16/7 Str. ♀); Seitenstetten, auf *Abies excelsa* (4'5 Str. ♀). St.: Admont, auf *Ab. exc.* am Lichtmessberge (1/8 Str. ♀).

***Wesmaeli*** Tischb. (Ad. 167). Ai.: (Eb. ♀).

***Saxeseni*** Ht. 212 (Ad. 171 pr. p.). Ai.: Piesting an der Wand (29/4, 5/6 Ts. ♂): Melk, an Waldrändern (13/5 Str. ♀); Seitenstetten, auf *Abies excelsa* häufig, bes. im Franzosenwäldchen (1 ♂ 24/5 Str. 3 ♀, 10 normale ♂ und 1 ♂ mit schwarzer Brustmitte). St.: Waagraben bei Hiefiau (28'5 Str. ♀); Voralpenwiesen des Kalbling, 1400 m, (16/6 Str. 2 ♀).

***pini*** Retz (Ad. 172, *abietum* Ht. 210). Ai.: Seitenstetten, auf *Abies excelsa* im Franzosen- und Lärchenwäldchen (20/4 bis 6/5 Str. 3 ♂, 4 ♀). \* Germ. bor. (Bri. ♂♀).

***ambiguus*** Fall. (Ad. 148, *parvus* Ht. 208). Ai.: Seitenstetten, im Lärchenwäldchen (4/5 Str. ♂ teste Kon.). \* Mecklenburg (Kon. ♂♀).

***retusus*** Thms. (Ad. 149). Ai.: Seitenstetten, an Waldrändern auf *Quercus* (Str. ♀, 2 ♂), im Franzosenwäldchen zwischen *Abies excelsa* fliegend (22/4 ♂).

***compressicornis*** F. (Ad. 112 u. *cebrionicornis* Cst. Ad. 110). Ai.: (Eb. ♀, var.: Fühler, Schenkelwurzeln und fast die ganzen Hinterschkel schwarz); Melk, im Stiftsgarten und bei Winden auf Waldgesträuch (26/5 ♀, 24/7 ♂). \* Germ. bor. (Bri. ♂♀).

***Iaricis*** Ht. 203, Ad. 136. Ai.: Seitenstetten, auf Gebüsch (Str. ♀ teste Kon.).

***leucopodius*** Ht. 200, Ad. 132. Ai.: Seitenstetten, auf einem Baumstamme an einem Waldbache und auf *Quercus* am Blümlsberge (Mai Str. 3 ♂ teste Kon.; die Ex. stimmen zwar nicht ganz genau mit den Beschreibungen des ♀, hingegen vollkommen mit 1 ♀ aus Amata, Italien (c. Kon.), nur sind die Fühler schwarz und ziemlich zusammengedrückt).

\* ***mollis*** Ht. 201, Ad. 131. Mecklenburg (Kon. 2 ♂, 2 ♀).

***pallipes*** Thms. (Ad. 147). Ai.: (Eb. ♀); Seitenstetten, auf *Abies excelsa* im Franzosenwäldchen (20/4 Str. ♀). Hal.: Karpathen (S. G. ♀).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Strobl Gabriel

Artikel/Article: [Beiträge zur geographischen Verbreitung der Tenthrediniden. VII. Theil. 60-63](#)