

Beiträge zur geographischen Verbreitung der Tenthrediniden.

Von Prof. P. Gabriel Strobl in Admont.

IX. Theil.*

46. *Blennocampa* Ht.

(Kon. Tabelle l. c. pag. 214).

assimilis Fll. (Ad. 317, *hyalina* Klg. Ht. 279). A i.: Melk, auf Gebüsch bei Winden (9/6 Str. ♂); Seitensteiten auf *Tilia* und *Prunus padus* (Mai, 3 ♀).

pusilla Klg. (Ad. 312, Ht. 267). A i.: Piesting (19/5 Ts. ♂); Melk, Stiftsgarten und Donauau, auf Gesträuch und *Euphorbia* (19/4—20/5 ♂♀); Seitenstetten, Stiftsgarten, auf *Tilia* (♀). * Mecklenburg (Kon. ♂♀).

alternipes Klg. (Kon. 215, *cinereipes* Ad. 309). A i.: (Eb. ♂); Melk, auf Gesträuch an der Donau und Bielach (16/4 bis 7/5 3 ♀); Amstetten und Seitenstetten auf *Corylus* etc. (Mai, 4 ♂, 2 ♀).

confusa Kon. 215 (*alternipes* Ad. 310, Thms., *brevicornis* Bri. 282). A i.: Piesting, an der Wand (21/7 Ts. ♀); Melk, Seitenstetten, Rosenau auf Gesträuch (April bis Juni 1 ♂, 4 ♀). — Lemberg (S. G. ♀). * Mecklenburg (Kon. ♂♀).

subcana Zadd. (Kon. 215, *subserrata* Thms. Ad. 311). A i.: Hütteldorf (20/4 Ts. ♂); Melk, Stiftsgarten auf Gesträuch (7/5 ♀); Seitenstetten auf *Abies excelsa* (1/5 ♂). * Muggsee bei Berlin (Schirmer ♂♀).

tenuicornis Klg. (Kon. 215, *uncta* Klg. Ht. 269, *spiraeae* Bri. 282). A i.: Seitenstetten, Stiftsgarten und Lärchenwäldchen auf Gesträuch (Anfangs Mai 2 ♂, 3 ♀; variirt: a) ♂♀: Flügelschüppchen ganz weiss, b) ♂♀: Flügelschüppchen fast ganz schwarz; Hinterschienen entweder grösstentheils oder mit Ausnahme der Spitze ganz weiss). St.: Um Admont auf Gesträuch (24/5 ♀); am Kalbling auf *Alnus incana* (ca. 5000', 17/6 ♂, var. a). * Germ. bor. (Bri. ♂♀ als *spiraeae*).

47. *Scolioneura* Kon.

(l. c. pag. 215 sub *Blennoc.* pr. p.).

nana Klg. (Kon. 215, Ad. 302, Ht. 266). A i.: Piesting (8/5 Ts. ♀).

*) VIII. Theil siehe pag. 117—120.

tenella Klg. (Kon. 215, Ad. 316, Ht. 271, *tenuicornis* Ht. 267). A i.: Melk, Stiftsgarten auf Gesträuch (5/6 ♀). St.: Admont, auf Waldgesträuch (8/8 ♀). * Germ. bor. (Bri. ♂♀ als *tenella*).

48. Entodecta Kon. l. c.

pumilus Klg. Kon. 243 (*pumilis* Ht. 259, Ad. 230). * Germ. bor. (Bri. ♂♀).

49. Monophadnus Ht.

(Kon. l. c. mit Tabelle).

geniculatus Ht. (Kon., Ad. 308, Ht. 274). St.: Admont, auf Gesträuch an der Enns (24/5 2 ♀); Kaiserau, auf Voralpenwiesen (17/6 ♀). * Mecklenburg (Kon. ♂♀).

ruficruris Brull. (Kon., Ad. 302). A i.: Pöverding bei Melk (12/5 ♀ teste Kon.!).

spinolae Klg. (Kon., Ht. 27, *ventralis* Ad. 299 ♂, *croceiventris* Klg., Ad., Ht. ♀). A i.: Melk, am Wachberg, im Bielachthal und bei Winden (30/5—6/7 2 ♂, 1 ♀). St.: Admont auf Gesträuch an der Enns (24/5 2 ♀); Steinbrück, in Bergwäldern (21/7 ♀; var.: Schildchen alle Hüften und die ganze Brust roth = v. *scutellaris* Kon.). Dalmatien (Eb. ♂).

elongatulus Klg. (Kon., *micans* Ad. 309, non Klg.). A i.: Piesting (27/5 Ts. ♀, det. Kon.!). — Olmütz (S. G. ♀). * Zerbst (Lamprecht 2 ♂). Italia (c. Kon. ♂♀).

albipes L. (Kon., Ad. 313, Ht. 272). A i.: Wien (Eb., S. G. 4 ♀); Melk, Seitenstetten, Amstetten auf *Primula*, *Tilia*, *Abies* etc. ♀ häufig (20/4—13/8: auch eine Abnormität mit nur einer Radialzelle). St.: Admont, in den Ennsauen (♀). — Hal.: Lemberg und Winniki (S. G. 4 ♀).

50. Pseudodineura Kon. l. c. 269.

parvula Klg. (Ad. 94, Ht. 228). A i.: (Eb. ♀; Seitenstetten, auf Wiesen gestreift (Str. ♀).

fuscula Klg. (Bri. 236 ohne Diagnose.) St.: Admont, auf Wiesen an der Enns (22/5 3 ♀); Kaiserau auf Alpenwiesen (17/6 ♂♀). * Sachsen (Kon. ♀).

hepaticae Bri. 237. * Germ. bor. (Bri. 2 ♀).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Strobl Gabriel

Artikel/Article: [Beiträge zur geographischen Verbreitung der Tenthrediniden. IX. Theil. 143-144](#)