

Raupen gezogen hat. Dr. Howard bearbeitete hievon die Chalcididen und Mymariden (mit 16 neuen Arten), Ashmead die Ichneumoniden und Braconiden (mit 4 neuen Arten) — Neue Gattungen, von den Chalcididen: *Anagyris* und *Anicetus*, von den Mymariden: *Anthemus*, von den Braconiden: *Aphrastobracon*.

Ashmead William H. Descriptions of new Cynipidous Galls and Gall-Wasps in the United States National Museum. (Proceed. U. S. Nation. Mus. Washingt. 1896. Vol. XIX. pag. 113—136.)

Die Arbeit enthält 43 neue Cynipiden-Arten. Von den meisten werden die Gallen beschrieben. Die Substrate sind grösstentheils *Quercus*-Arten.

Kieffer J. J. Descriptions de nouveaux Cynipides d'Europe. (Bull. Soc. Ent. France 1897, pag. 8—10.)

Beschreibung von drei neuen Cynipiden, welche auf *Quercus pubescens* und *pedunculata* Gallen erzeugen, und zwar: *Cynips Stefani* (Sicilien, C. Mayri (Frankreich, Italien) und *Andricus Lambertoni* (Lothringen).

Kieffer J. J. Notes sur les Cynipides et description d'un *Andricus* nouveau. (Bull. Soc. Ent. France 1897, pag. 122—123.)

Beschreibung von *Andricus Magretti* n. sp. Bildet vielfächerige, verholzte, strohgelbe Gallen auf einer *Quercus*-Art aus Smyrna. Ferner Bemerkungen über einige andere bereits bekannte Cynipiden.

Vachal Jos. Eclaircissements sur le genre *Scapter* et description d'une espèce nouvelle du *Dufourea*. (Bull. Soc. Ent. France 1897, pag. 61—64.)

Der Verfasser kommt zu dem Schlusse, dass die Gattung *Macropis*, wie sie Dalla Torre in seinem Catalogus (Vol. X, Apidae, 1896, 193) auffasst in 3, resp. 4 Gattungen zerfalle, und zwar in: *Macropis* Pnz., *Scapter* St. F. et Serv., *Panurginus* Nyl. und eventuell in *Smithia* n. gen. — Ferner wird beschrieben: *Dufourea Gaullei* n. sp. aus Spanien.

Howard L. O. On the Chalcididae of the Island of Grenada, B. W. J. (Linn. Soc. Journal, Zoology. London 1897. Vol. XXVI, pag. 129—178)

Das Ergebniss einer Sammlung, welche Mr. H. H. Smith während des Frühjahres 1891 auf der Insel Grenada (Britisch Westindien) zusammengebracht hat, wird uns hier vor Augen geführt. Von den 132 Arten werden 72 als neu beschrieben; 6 Arten ergaben sich als Repräsentanten neuer Genera. Interessant ist das Vorkommen von *Spalangia nigra* Latr., dem bei uns nicht seltenen Parasiten von *Musca domestica*. Lehrreich ist der Vergleich über die Distribution der Arten (pag. 129); sie sind fast alle charakteristisch für Westindien. Leider wurde keine einzige derselben gezogen. J. Mik.

Corrigendum.

Pag. 154: Zeile 23, 24, 26 und 27 sind die Zeichen „ „ unter den zwei Worten *circiter* zu streichen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Corrigendum. 196](#)