

Rhyncolus Thomsoni nov. sp.Von **Claes Grill** in Göteborg.

Da nach Fowler *Rhyncolus turbatus* Schönh. nicht in England gefunden ist und alte Expl. von England in der Typensammlung Schönherr's (gesandt unter dem Namen *R. lignarius* Marsh.) *R. cylindrirostris* Oliv. sind, muss *R. lignarius* Marsh. ohne Zweifel identisch sein mit *R. cylindrirostris* Oliv. Mit dieser Art aber, die in mehreren Expl. von Paris in der Typensammlung Schönherr's sich vorfindet, stimmen vollkommen überein typische Expl. von *R. sulcirostris* Thoms. — *R. cylindrirostris* Thoms. dagegen ist, nach der Type im Reichsmuseum in Stockholm, ohne Zweifel eine eigene Art, welcher ich hiermit den Namen **R. Thomsoni** nobis, geben will.

Die Synonymie der Europ. *Rhyncolus*-Arten ist mithin folgende:

Rhyncolus

lignarius Marsh. 1802. Ent. 275.

cylindrirostris Oliv. 1807. Ent. 5. 83. 427; Seidl.

sulcirostris Thoms. Op. XVII. 1892. pag. 1862.

latitarsis Thoms. Ann. Entom. Fr. 1886. VI. et Op. XII. p. 1207. — Vielleicht eine Localvarietät von *R. lignarius* Marsh., aber gar nicht synonym mit *R. cylindricus* Bohem. (siehe Reitt. Cat. Col. 1891).

cylindricus Boh. S. 4. 1060.

cylindrus Reitt. 126.

longicollis Boh. l. c.

grandicollis Bris. Gren. Mat. 67. 193.

gracilis Rdtb. Faun. 2. 366.

Schönherrri Hoch. B. M. 47. 2. 580.

angusticollis Reitt. D. 1896. 188.

turbatus Schönh. 8. 2. 279.

lignarius Gyll. S. 4. 1052; Thoms.

Thomsoni nov. nom.

cylindrirostris Thoms Sk. Col. VII. 1865. pag. 342; nec Oliv.

gracilis Rosenh. And. 300.

angustus Fairm. A' 1859. 164.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Grill Claes

Artikel/Article: [Ueber den typischen Gonicarabus intermedius DG.
179](#)