Theilen der Heteromeren. Der generisch systematische Theil wird überall durch die Wiedergabe der von den einzelnen Autoren gegebenen Anordnung sehr ausgedehnt, so dass man auch ein Bild von den tropischen Formen erhält; ebenso wird auch diesmal die Biologie der Arten, soweit sie bekannt ist, in umfassendster Weise behandelt und die Kenntniss der Arten weit über den Rahmen des Werkes gefördert. — Dass der geniale Verfasser alle drei griechischen Neogonus-Arten in eine zusammenzieht, scheint mir ein Missgriff zu sein; bei dem schwarzen Emgei-Q sind die Fühler viel kürzer als beim hellgefärbten Plasonis-Q; auch ist das 4. bis 6. Fühlerglied beim Hampei-Q so eingelenkt, wie beim Plasonis-Q. In dieser Gattung wird reichlicheres Material aus Griechenland erst die erwünschte Klarheit zu schaffen in Stande sein

Everts Chr. Ed. Coleoptera Neerlandica. (De schildvleugelige Insecten van Nederland en het aangrenzend Gebied. Deel I. Met 62 houtsnee figuren in den tekst. Eerste Gedeelte. Gross Octav, pag. 1—368. 'Sgravenhage bei Martinus Nijhoff, 1898.)

Der Verfasser copirt in seinem schön ausgestatteten Werke Ganglbauer's ausgezeichnete Fauna von Mitteleuropa, nur sind die Arten in vollständig entwickelter analytischer Form gebracht. Ebenso sind die Figuren zum Theil nach Ganglbauer, zum Theil selbständige Originale. Der gegenwärtige Band umfasst die Carabidae, Dutiscidae, Gyrinidae und Staphylinidae, die augenscheinlich mit dem grössten Fleisse ausgeführt erscheinen; wir wünschen dem schönen Werke den besten Erfolg, den es in hohem Masse verdient.

Tschitscherine T. Matériaux pour le servir a l'étude des Féroniens IV. (Horae Soc. Entom. Rossicae tom. XXXII, Mai 1898, pag. 1—224.)

Enthält neue Pterostichinen aus den Tropen und der centralasiatischen Fauna, neue Gattungen und Subgenera, zahlreiche Beiträge anderer Art, Rectificationen, etc.

Escherich K. Zur Biologie von Thorictus Foreli Wasm. (Zoologischer Anzeiger, Bd. XXI, Nr. 567, 1898, pag. 383-492.)

Der Verfasser bestätigt im Allgemeinen die Beobachtungen Wasmann's über Thorictus Foreli, nur die Angaben über die Nahrungsaufnahme werden wesentlich modificirt.

E. Beitter.

Corrigenda.

Pag 169, Zeile 12 von unten, lies nitidus statt mitidus.

- " 204, in der Fussnote, lies dieses statt diese.
- , 207, Zeile 3, lies subreniformi statt subrheniformi.
- , 216, Zeile 16, lies subaequilongis statt subaequelongis.

Pag. 224, Zeile 5 von oben, und pag. 227, Zeile 10 von unten lies \mathbb{Q} , statt \mathbb{Q} .

Taf. III, Fig. 6, ist durch ein Verschen des Lithographen der Tarsus 6gliederig dargestellt worden; die Querlinie nahe der Basis des Metatarsus ist wegzunehmen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Wiener Entomologische Zeitung

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: 17

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Corrigenda. 256