

## Beiträge zur Kenntniss der Coleopteren-Fauna des Erzherzogthumes Oesterreich.

Von Ludwig Ganglbauer.

(Schluss.)

- Cyphon nitidulus* Thoms. Von Herrn Kaufmann in Dornbach auf einer feuchten Wiese gekötschert.
- Telephorus Erichsoni* Bach. In allen Alpengegenden Oesterreichs, auch in der Brühl bei Mödling. (Kolbe.)
- Apodistrus brachypterus* Kiesw. Von Herrn Reitter und Baron M. von Schlereth bei Mödling auf feuchten Wiesen gesammelt.
- Dasytes alpi gradus* Kiesw. Auf dem Schneeberge, Oetscher und Dürrenstein in der alpinen Region auf Ranunculus-Blüthen. (Kaufmann, Haberkorn, Ganglb.)
- Clerus substratus* Gebl. Von Herrn Kaufmann auf Föhrenklättern bei Mödling und Vöslau gefangen; von Herrn Oberförster Wachtl aus der Schwarzkiefer gezogen.
- \**Xyletinus ornatus* Germ. Bisamberg. (Bartscht.)
- \**Xyletinus subrotundatus* Lar. (nach Miller von *X. laticollis* Duft. spezifisch verschieden), ebendasselbst. (Kaufm.)
- \**Aspidiphorus Lareyniei* Duv. Von Herrn Kolbe in kleinen Staupilzen an alten Baumstrünken in Gesellschaft mit *Sphindus dubius* gesammelt. Brühl.
- Cis reflexicollis* Abeill. Oesterreich. (Deutsch. Ent. Zeit. 1875, pag. 388.)
- \**Cis vestitus* Mell. Nach Herrn Reitter in Oesterreich. (cf. Deutsch. Ent. Zeit. 1878, p. 26.)
- \**Enncarthron filum* Abeille. Von Herrn Miller bei Wien gesammelt.
- Corticus rufulus* Rosenh. Von Herrn Kaufmann bei Dornbach unter der Rinde von Föhrenscheitern gefunden.
- Omophilus longicornis* Bertol. Von den österreichischen Coleopterologen bisher mit *O. Betulae* Herbst (*lepturoides* Fabr.) verwechselt. Um Wien sehr häufig.
- \**Mordellistena Milleri* Emery, Brühl. (Kolbe.)
- Mylabris variabilis* Pall. Oberweiden. (Kaufm.)
- \**Zonitis fulvipennis* F. Bisamberg. (Bartscht.)
- \**Nacerdes austriaca* Ganglb. Bei Wien auf blühenden Cruciferen oft sehr häufig. Bisher mit *Nac. dispar* Duf., von der mir kein österreichisches Stück bekannt wurde, verwechselt.
- Polydrusus confluentis* Steph. Neuwaldegg. (Bartscht, Kaufm.)

- Sitones brevicollis* Gyllh. aus Oesterreich ist von *S. tibialis* Herbst spezifisch verschieden. (cf. Berl. Ent. Zeit. 1869, p. 321.)
- Dorytomus punctator* Herbst. Weidling am Bach. (Bartscht.)
- Tychius crassirostris* Kirsch. Von Herrn Paul Löw aus *Melilotus*-Gallen gezogen. Lang-Enzersdorf.
- Gymnetron netum* Germ. und *collinum* Gyllh. Bisamberg. (Bartscht.)
- Magdalinus Kraatzii* Weise. Nach einem österreichischen Stücke beschrieben. (cf. Berl. Ent. Zeit. 1872, p. 149.)
- Rhinoncus albicinctus* Gyllh. Stockerau. (Bartscht.)
- Ceutorrhynchus puncticollis* Boh. In grosser Menge auf der Türken-  
schanze auf *Erysimum canescens*. Einzeln auch im March-  
felde und bei Kalksburg. (Kaufm.)
- Ceutorrhynchus smaragdinus* Bris. Drei Stücke im Prater ge-  
kötschert. (Kaufm.)
- Ceutorrhynchus austriacus* Bris. Von Brisout aus Oesterreich be-  
schrieben. L'Abeille, V. 1869, p. 462.
- Rhyncolus gracilis* Rosenh. Purkersdorf in Eichenmoder. (Bartscht.)
- Hylurgus hederae* Schm. In Epheu-Strünken an der Ruine Dürren-  
stein oberhalb Krems. (Ganglb.)
- \**Hylesinus Kraatzii* Eichh. Ein Stück von Herrn Kaufmann bei  
Dornbach unter Ulmenrinde gefangen.
- \**Tomicus Mannsfeldi* Wachtl. Von Herrn Oberförster Wachtl aus der  
Schwarzföhre gezogen. (cf. Sitzungsberichte der zoolog. bot.  
Gesellsch. Wien, 1879, p. 59.)
- Rhopalopus spinicornis* Abeille. Ein Stück fing Herr Kaufmann  
bei Dornbach.
- Clytus lama* Muls. Im gebirgigen Theile Oesterreichs häufig.  
Bisher mit *Cl. arietis* L. vermengt oder mit *Cl. rhamnii* Germ.  
verwechselt; von letzterem sind mir keine österreichischen  
Stücke bekannt.
- Cyrtoclytus* (Ganglb.) *capra* Germ. Frankenfels (Erber), Lunz  
(Haberfelner), Gmunden (Oertzen).
- \**Monochammus saltuarius* Gebl. Von Herrn Haberfelner in einer  
Anzahl von Exemplaren aus Fichtenwipfeln gezogen.
- Monochammus galloprovincialis* Oliv. var. *pistor* Germ. Schneeberg  
(Bohatsch, Collect. Heyden); von Herrn Oberförster Wachtl aus  
der Schwarzföhre gezogen.
- Pogonochaerus scutellaris* Muls. In Oesterreich wahrscheinlich  
häufiger als *P. ovatus*, mit dem er häufig verwechselt wird.  
Lunz. (Haberfelner.)

120 Ludw. Ganglbauer: Beiträge zur Coleopteren-Fauna Oesterreichs.

- \**Acmaeops septentrionis* Thoms. Ein ganz schwarzes Exemplar wurde von Herrn Habermayer bei Lunz gefangen.
- \**Cortodera Frivaldszkyi* Kraatz. Bisamberg. (Kaufm.)  
*Cortodera femorata* Fabr. (= *monticola* Abeille). Mödling. (Kaufm.)  
*Clytra appendicina* Lac. Bei Wien häufig, während die ihr nahe verwandte *Cl. quadripunctata* L. hier selten ist.
- Coptocephala rubicunda* Laich. Bisher mit der bei uns viel selteneren *C. scopolina* L. vermenget. (cf. J. Weise, Naturg. Insect. Deutschl. Tom. VI., 1882, p. 135.)
- Coptocephala chalybaea* Germ. Um Wien nicht selten (Ganglb.). Von Redtenbacher irrthümlich auf die in Südfrankreich, Spanien und Italien vorkommende *Gynandrophthalma concolor* Fabr. bezogen.
- Cryptocephalus bohemius* Drap. Nach Weise in Oesterreich.
- Cryptocephalus frontalis* Marsh. Steyer in Ob.-Oest. (Kaufm.)
- Cryptocephalus quadriguttatus* Germ. Mödling. (Bartscht, Kaufm., Kolbe.)
- \**Adimonia flava* Küst. Angeblich von Herrn Bartscht in vier Exemplaren bei Moosbrunn gefangen.
- Triplax lepida* Fald. Von Herrn Kaufmann in grosser Anzahl in Dornbach gesammelt.
- \**Sacium densatum* Reitter. Nach Reitter in Oesterreich. (cf. L'Abbeille; Tom. XVI, 1877.)
- Sacium obscurum* Sahlb. (bisher mit dem nordischen *S. pusillum*, Gyllh. verwechselt). Von Herrn Kaufmann im Prater gefunden.
- \**Sacium brunneum* Bris. Von Herrn Braunhofer bei Feldsberg gesammelt.
- \**Arthrolips humilis* Rosenh. Nach Reitter in Oesterreich. (cf. L'Abbeille, XVI.)
- \**Orthoperus punctulatus* Reitter. Nach Reitter in Oesterreich. (cf. Deutsch. Ent. Zeit. 1878, p. 199.)
- Orthoperus punctatus* Wank. Bei Lunz von abgeschälter Fichtenrinde in Anzahl abgeklopft. (Ganglb., Habermayer, Kaufm.)

Der in der Botanik und Zoologie anscheinend sehr vielseitig versirte Professor K. W. v. Dalla Torre in Innsbruck hat in seiner „Käferfauna von Ober-Oesterreich“ (System. Verz. der in Ober-Oesterreich bisher beobachteten Käfer, Linz, 1879 und 1880) mehrere Arten als in Ober-Oesterreich vorkommend angegeben, die als für die Fauna Austriaca neu, an entsprechender Stelle meines Aufsatzes hätten Erwähnung finden sollen. Indessen scheinen mir Dalla Torre's Angaben vielfach auf unrichtigen Determinationen zu beruhen und daher halte ich es für gerathen, jene Arten vorläufig zu übergehen, bis dieselben von anderer Seite als richtig determinirt nachgewiesen werden.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Ganglbauer Ludwig

Artikel/Article: [Beiträge zur Kenntniss der Coleopteren-Fauna des Erzherzogthumes Oesterreich. \(Anm.: Schluss\). 118-120](#)