

# KATALOG

der

## Psylliden des paläarktischen Faunen-Gebietes.

Zusammengestellt von Dr. Franz Löw in Wien.

Da in Folge der regeren Theilnahme, welche seit einigen Jahren dem Studium der springenden Pflanzenläuse (*Psyllidae*) zugewendet wird, die Kenntniss dieser Insecten nach jeder Richtung hin wesentlich gefördert und erweitert und eine grosse Anzahl neuer Arten entdeckt wurde, so sind die Kataloge, welche über Psylliden existiren, für den Hemipterologen nicht mehr ausreichend und Demjenigen, was wir gegenwärtig von dieser Insecten-Familie wissen, nicht mehr entsprechend.

Ich halte es daher für zeitgemäss, einen neuen Katalog der Psylliden zu veröffentlichen, beschränke mich in demselben aber auf die aus der paläarktischen Region bekannt gewordenen Arten, weil von den meisten der bis jetzt beschriebenen Arten anderer Faunen-Gebiete nur ungenügende Beschreibungen vorhanden sind, so dass darnach nicht einmal die systematische Stellung dieser Arten erkannt werden kann.

Diesem neuen Kataloge liegt die von mir in der Versammlung der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft vom 5. April d. J. vorgelegte „Revision der paläarktischen Psylloden“ zu Grunde, welche in den Verhandlungen dieser Gesellschaft (1882, p. 227—254) abgedruckt ist, und in welcher alle, sowohl von mir, als von anderen Autoren, theils durch das Studium der einschlägigen Litteratur, theils durch die Vergleichung von typischen Exemplaren, theils durch Züchtung und genauere Beobachtung dieser Insecten, in Hinsicht auf Systematik und Synonymie gewonnenen Resultate verzeichnet sind. Seit der Veröffentlichung dieser „Revision“ wurde bloß eine neue Art, nämlich *Rhinocola cisti* Put. aus Südfrankreich beschrieben. (Vide Dr. Puton, *Revue d'Entomologie*, I. 1882, p. 183.)

Ich habe die Eintheilung der Psylliden in vier Sub-Familien, welche von mir im Jahre 1878 in einem unter dem Titel „Zur Systematik der Psylloden“ (*Verh. d. zoolog.-bot. Ges.*, 28. Bd., p. 585—610) erschienenen Artikel aufgestellt wurde, in diesem Kataloge beibehalten, weil neuere Untersuchungen gezeigt haben, dass diese Eintheilung eine natürliche und deshalb ungezwungene ist.

Aus dem paläarktischen Gebiete sind im Ganzen bloß 158 sichere Psylliden-Arten bekannt.

## Subord. HOMOPTERA Am. et Serv.

Sectio *Phytophthires* Burm.

## Fam. PSYLLIDAE Latr.

I. Subfam. **Liviinae** F. Lw.1. Gen. *Livia* Latreille.

(Chermes et Psylla auct., Diraphia Illig.)

<i>juncorum</i> Latr.	tota Eur.	<i>imbata</i> Waga	Eur. med. et mer.
<i>graminis</i> Hoy nec Lin.		<i>crefeldensis</i> Mk., Fl.	
<i>junci</i> Schrk.			

II. Subfam. **Aphalarinae** F. Lw.2. Gen. *Euphyllura* Förster.

(Thrips O. G. Costa, Psylla Fonse.)

<i>olivina</i> O. G. Costa	Eur. mer.	<i>phillyreae</i> Fstr., Fl.	Eur. mer.
<i>oleae</i> Fonse.			

3. Gen. *Rhinocola* Förster, F. Löw.

(Chermes, Psylla et Aphalara auct.)

<i>Fedtschenkoi</i> F. Lw.	Turkest.	<i>ericae</i> Curt.	tota Eur.
<i>aceris</i> Lin., Fl.	tota Eur.	<i>callunae</i> Boh.	
<i>abietis</i> Htg.		<i>succincta</i> Heeg.	Aust. inf.
<i>halimocnemis</i> Beck., Leth.	Ross. mer.	? <i>Targionii</i> Licht. Hisp.,	Gall. mer.
<i>unicolor</i> Scott	Ross. mer.	<i>speciosa</i> Fl.	tota Eur.
<i>salsolae</i> Leth.	Alger.	<i>subrubescens</i> Fl.	Gall. mer.
<i>bicolor</i> Scott	Ross. mer.	<i>cisti</i> Put.	Gall. mer.
<i>turkestanica</i> F. Lw.	Turkest.		

4. Gen. *Aphalara* Förster, F. Löw.

(Chermes, Tettigonia, Psylla et Rhinocola auct.)

<i>signata</i> F. Lw.	Turkest, Ross. mer.	<i>maculosa</i> F. Lw.	Turkest.
<i>Jakowleffi</i> Scott	Ross. mer.	<i>nebulosa</i> Ztt. Reut. nec Mk.	Eur. s. et m.
<i>aliena</i> F. Lw.	Aegypt.	<i>radiata</i> Scott	
<i>lurida</i> Scott	Caucas	<i>graminis</i> Thoms. nec Lin.	
<i>tamaricis</i> Put.	Rss. et Gll. mer., Hsp.	<i>nervosa</i> Fstr., Fl.	Eur. s. et med.
<i>nebulosa</i> Mk. nec Ztt.		<i>subfasciata</i> Fstr.	
<i>pilosa</i> Oschan.	Ross mer.	? <i>crassinervis</i> Rud.	
<i>artemisiae</i> Fstr., Fl.	tota Eur.	<i>subpunctata</i> Fstr.	Eur. med.
<i>malachitica</i> Dalb.		<i>pallida</i> Leth.	

<i>affinis</i> Zett., Fl.	Eur. sept.	<i>picta</i> Zett., Fl.	tota Eur.
<i>calthae</i> Lin.	Eur. sept. et med.	<i>flavipennis</i> Fstr.	
<i>polygona</i> Fstr. Fl.		<i>sonchi</i> Fstr.	
<i>ulicis</i> Fstr.		<i>alpigena</i> M.-D.	
<i>innoxia</i> Fstr.	Germ., Aust.	<i>nervosa</i> Thoms. nec Fstr.	
<i>exilis</i> W. et M., Fl.	Eur. s. et med.	?	
<i>rumicis</i> (Fall.) Boh. (teste Flor)		<i>Psylla purpurascens</i> Htg.	Germ.

5. Gen. *Psyllopsis* F. Löw.

(Chermes et Psylla auct.)

<i>fraxinicola</i> Fstr.	tota Eur.	<i>fraxini</i> Lin., Fl.	tota Eur.
<i>viridula</i> Fstr.		<i>sorbi</i> Thoms. nec Lin. ♀	
<i>unicolor</i> Fl.		<i>discrepans</i> Fl.	Gall. mer., Fenn.
<i>chlorogenes</i> M.-D.		<i>sorbi</i> Thoms. nec Lin. ♂	Suec
<i>meliphila</i> F. Lw.	Carn.		

III. Subfam. **Psyllinae** F. Lw.

6. Gen. *Calophya* F. Löw.

(Psylla F. Lw.)

<i>rhois</i> F. Lw.			Austria inferior
---------------------	--	--	------------------

7. Gen. *Diaphorina* F. Löw.

(Psylla Put., Diaphora F. Lw. olim.)

<i>Putonii</i> F. Lw.	Gall., Hisp.	<i>propinqua</i> F. Lw.	Turkest.
<i>aphalaroides</i> Put.			

8. Gen. *Psylla* Geoffroy, F. Löw.

(Chermes auct.)

<i>fasciata</i> F. Lw.	Turkest.	<i>simulans</i> Fstr.	Brit., Eur. med.
<i>sarmatica</i> F. Lw.	Ross mer.	<i>argyrostigma</i> Fstr.	
<i>spiraeae</i> (Beck.)		<i>pyii</i> Scott nec Lin.	
<i>glycyrrhizae</i> Beck., F. Lw.	Turk., R. m.	<i>albipes</i> Fl.	Gall. mer., Helv.
<i>Reuterii</i> F. Lw.	Turkest.	<i>pyrastris</i> F. Lw.	Eur. med.
<i>parvipennis</i> F. Lw.	Eur. s. et med.	<i>Flori</i> Put.	Liv., Fenn.
<i>saliceti</i> Fl. nec Fstr.		<i>insignis</i> Fl. nec Fstr.	
<i>microptera</i> Thoms.		<i>crataegi</i> Schrk. nec Fstr.	tota Eur.
<i>breviantennata</i> Fl.	Eur. s. et med.	<i>costatopunctata</i> Fstr.	
<i>terminalis</i> M.-D.		<i>ferruginea</i> Fstr.	
<i>pyri</i> Lin., Deg.	tota Eur.	<i>annulicornis</i> Boh.	
<i>Apiopsylla</i> Am.		<i>triozoides</i> Leth.	
<i>pyricola</i> Fstr.	tota Eur.	<i>quercus</i> Thoms. nec Lin.	
<i>apiophila</i> Fstr.		<i>puncticosta</i> Thoms.	
<i>notata</i> Fl.		<i>costalis</i> Fl.	Brit., Eur. med
? <i>pyri</i> Curt. nec Lin.		<i>nobilis</i> M.-D.	

<i>pyrisuga</i> Fstr.	Eur. med., Brit., It.	<i>myrti</i> Put.	Alger.
<i>pyri</i> Schdbg., Rtzb. nec Lin.		<i>rhododendri</i> Put.	Helv.
<i>austriaca</i> Fl.		<i>melanoneura</i> Fstr.	tota Eur.
<i>aurantiaca</i> Gour.		<i>crataegi</i> Frst. nec Schrk.	
<i>rutila</i> M.-D.		<i>pityophila</i> Fl.	
<i>rufitarsis</i> M.-D.		<i>oxyacanthae</i> M.-D.	
<i>peregrina</i> Fstr.	Eur. sept. et med.	<i>similis</i> M.-D. part.	
<i>carpini</i> Fstr.		<i>affinis</i> F. Lw.	Gall. sept.
<i>crataegicola</i> Fl. nec Fstr.		<i>nigrita</i> Ztt. nec Reut.	tota Eur.
<i>melina</i> Fl.	Liv., Helv.	<i>pulehra</i> Zett.	
<i>mali</i> Schdbg., Fstr., Fl.	tota Eur.	<i>pineti</i> Fl.	
<i>aeruginosa</i> Fstr.		<i>similis</i> M.-D. part.	
<i>occulata</i> Fstr.		<i>elegantula</i> Ztt., Reut.	Eur. spt., Helv.
<i>crataegicola</i> Fstr. nec Fl.		<i>ornata</i> M.-D.	
<i>dubia</i> Fstr.		<i>saliceti</i> Fstr. nec Fl.	Eur. med.
<i>rubida</i> M.-D.		<i>rhamnicola</i> Scott	Brit., Fenn.
<i>claripennis</i> M.-D.		<i>salicicola</i> Fstr., Fl.	tota Eur.
<i>viridissima</i> Scott		<i>rufula</i> Fstr.	
<i>ulmi</i> Fstr. nec Lin.	Eur. s. et med.	<i>subgranulata</i> Fstr.	
<i>bicolor</i> M.-D.		<i>iteophila</i> F. Lw.	Austr., Fenn.
<i>viburni</i> F. Lw.	Austr., Helv.	<i>ambigua</i> Fstr.	Eur. sept. et med.
<i>visci Curt., Fstr.</i>	Brit., Germ., Aust.	<i>insignis</i> Fstr. nec Fl.	
<i>ixophila</i> F. Lw.		<i>abdominalis</i> M.-D.	
<i>euchlora</i> F. Lw.	Gall. mer.	<i>stenolabis</i> F. Lw.	
<i>alpina</i> Fstr., Fl.	Helv., Aust.	<i>annellata</i> Thoms.	
<i>fusca</i> Ztt	tota Eur.	<i>Palmeni</i> Reut.	Lapp., Sibir.
<i>perspicillata</i> Fl.		<i>nigrita</i> Reut. nec Zett.	
<i>fuscula</i> Thoms.		<i>pulchella</i> F. Lw.	Asia min.
<i>alni</i> Lin., Fl.	tota Eur.	<i>limbata</i> M.-D., F. Lw.	Helv. Gall.
<i>Heydeni</i> Fstr.		<i>Delarbrei</i> Put.	Gall. mer., Hisp.
<i>fuscineervis</i> Fstr.		<i>spartii</i> Guér. nec Htg. } <i>spartiophila</i> Fstr. }	Brit., Gall., Germ., Hisp.
<i>Clethropsylla</i> Am.		<i>cytisi</i> Put. nec Beck.	Alg., Gll., It.
<i>Foersteri</i> Fl.	tota Eur.		
<i>alni</i> Serv., Fstr. nec Lin.			
<i>betulae</i> Lin., Fl.	Eur. sept.		
? Zetterstedti Thoms.			
<i>buxi</i> Lin.	tota Eur.	<i>Chermes quercus</i> Lin.	Suecia
<i>hippophæis</i> Fstr.	Brit., Eur. med.	" <i>sorbi</i> Lin.	Suecia
<i>phaeoptera</i> F. Lw.	Gall., Helv., Tirol	" <i>humuli</i> Schrk.	Bavar.
<i>Loewii</i> Scott	Brit.	" <i>obliqua</i> Thoms.	Suecia
<i>Hartigii</i> Fl.	Eur. sept. et med.	<i>Psylla fuscipes</i> Htg.	Germ.
<i>sylicola</i> Leth. nec Frfld.		" <i>viridis</i> Htg.	Germ.
<i>ledi</i> Fl.	Eur. sept. et med.	" <i>rubra</i> Geoff., Gour.	Gall.
<i>lutea</i> Thoms.		" <i>pieta</i> Fstr., nec Ztt.	Brit.
<i>pruni</i> Sep., Fl.	Eur. sept. et med.	" <i>nigricornis</i> Rud.	Germ.
<i>fumipennis</i> Fstr.		" <i>olivacea</i> Rud.	Germ.
<i>alaterni</i> Fstr.	Gall. mer., Ital.	" <i>sulfurea</i> Rud.	Germ.
<i>flavopunctata</i> Fl.		" <i>frontalis</i> Rud.	Germ.

9. Gen. *Amblyrrhina* F. Löw.

(Psylla Fl. part.)

*torifrons* Fl. Gall. mer. | *cognata* F. Lw. Austr.-inf.10. Gen. *Spanioneura* Förster.*Fonscolombei* Fstr. Gallia merid11. Gen. *Arytaina* Förster.

(Psylla auct., Arytaena Scott., F. Lw., Ataenia Thoms.)

*genistae* Latr. tota Eur. | *adenocarpi* F. Lw. Gall. mer.*ulicis* Curt.*spartii* Htg. nec Guér.12. Gen. *Livilla* Curtis.

(Psylla Waltl.)

*ulicis* Curt. Brit., Germ., Helv., Gall., Italia*oleoptrata* (Klg.) Waltl.*callunae* Rud.13. Gen. *Floria* F. Löw.

(Psylla auct. part.)

*pyrenaea* Mink, F. Lw. Alp., Pyren. | *Horvathi* Scott Hung.*spartiisuga* Put. Alger. | *spectabilis* Fl. Eur. mer.*variegata* F. Lw. Herzegovina | *retamae* Put. Hisp.*adusta* F. Lw. Hisp. | *syriaca* F. Lw. Syria*vittipennella* Reut. Carn.14. Gen. *Alloeoneura* F. Löw.

(Psylla auct. part., Arytaina Frst. part.)

*radiata* Fstr. Austr., Hung., Italia, Serbia, Ross. mer*lactea* A. Costa*cytisi* Becker nec Put.15. Gen. *Homotoma* Guérin.

(Chermes et Psylla auct., Anisostropha Fstr.)

*ficus* Lin. Austr., Hung., Gallia, Eur. mer.IV. Subfam. **Trioziinae** F. Lw.16. Gen. *Bactericera* Puton.*Perrisi* Put. Gallia merid., Italia, Turkestan17. Gen. *Trichopsylla* Thomson.

(Trioza auct. part.)

*Walkeri* Fstr., Fl. Europa septem. et media*rahamni* Frfld. nec Schrk.

18. Gen. *Trioza* Förster.

(Chermes et Psylla auct.)

<i>tripunctata</i> F. Lw.	Gll., Tirol. mer.	bicolor M.-D.	
<i>centranthi</i> Vall., André	id.	Cnidopsylla Am.	
<i>fediae</i> Kltb.		<i>crithmi</i> F. Lw.	Brit., Gall.
<i>Neilreichii</i> Frfld.		<i>curvatineris</i> Fstr.	Eur. med.
<i>velutina</i> Fstr. Fl.	Eur. med.	<i>pallipes</i> Fstr.	
<i>chenopodii</i> Reut.	tota Eur.	<i>unifasciata</i> F. Lw.	
<i>Dalei</i> Scott		<i>Saundersi</i> M.-D.	Eur. sept., Helv.
<i>atriplicis</i> Licht.		<i>acutipennis</i> Fl. nec Ztt., Fstr.	
<i>galii</i> Fstr., Fl.	tota Eur.	<i>maura</i> Fstr.	Eur. med. et mer.
<i>distincta</i> Fl. nec M.-D.	Germ. mer.	<i>helvetina</i> M.-D.	
<i>recondita</i> Fl.	Aust. Gll. mer.	<i>nigricornis</i> Fstr.	Eur. s. et med.
<i>mesomela</i> Fl.	Gll., Hsp., Hg., Aust.	<i>acutipennis</i> Ztt. nec Fstr., Fl.	Eur.
<i>assimilis</i> Fl.	Gll. mer.	<i>femoralis</i> Fstr., Fl.	
<i>alacris</i> Fl.	Gll. mer., Ital.	<i>alpestris</i> F. Lw.	Helv.
<i>lauri</i> Targ.		<i>striola</i> Fl.	Eur. sept. et med.
<i>Horvathi</i> F. Lw.	Hung.	<i>Schrankii</i> Fl.	Styria
<i>obliqua</i> Thoms.	Suecia	<i>abdominalis</i> Fl.	Brit., Suec., Liv.
<i>dichroa</i> Scott	Ross. mer.	<i>senecionis</i> Sep., F. Lw.	Aust., Grm.
<i>silacea</i> M.-D.	Eur. sept. et med.	<i>sylvicola</i> Frfld. nec Leth.	
<i>munda</i> Fl. nec Fstr.		<i>aegopodii</i> F. Lw.	Aust., Helv., Suec.
<i>Scottii</i> F. Lw.	Aust. Grm.	<i>chrysanthemi</i> F. Lw.	id.
<i>furcata</i> F. Lw.	Turkest.	<i>cirsii</i> F. Lw.	Aust., Lapp., Gall.
<i>elaegni</i> Scott	Caucas.	<i>munda</i> Fstr. nec Fl.	Eur. med.
<i>modesta</i> Fstr.	Grm.	<i>distincta</i> M.-D. nec Fl.	
<i>angulipennis</i> Put.	Grm.	<i>Meyer-Dürrii</i> F. Lw.	
<i>acutipennis</i> Fstr., nec Ztt., Fl.		<i>cerastii</i> H. Lw.	Eur. sept. et med.
<i>pinicola</i> Fstr.	Grm.	<i>flavescens</i> M.-D.	
<i>salicivora</i> Reut.	Brit., Suec., Fenn.	<i>viridula</i> Ztt., Fl.	Eur. sept. et med.
<i>albiventris</i> Fstr., Fl.	tota Eur.	<i>apicalis</i> Fstr.	
<i>sanguinosa</i> Fstr.		<i>rumicis</i> F. Lw.	Aust., Helv.
<i>vitripennis</i> Fstr.		<i>rotundata</i> Fl.	Styria
<i>hypoleuca</i> Thoms.		<i>flavipennis</i> Fstr. Fl.	Eur. s. et m.
<i>marginepunctata</i> Fl.	Gll. mer.	<i>Foersteri</i> M.-D.	
<i>ramni</i> Schrk., F. Lw.	Eur. s. et m.	<i>proxima</i> Fl.	Eur. sept. et med.
<i>abieticola</i> Fstr.		<i>juniperi</i> M.-D.	
<i>argyrea</i> M.-D.		<i>dispar</i> F. Lw.	tota Eur.
<i>remota</i> Fstr.	Eur. sept. et med.		
<i>cinnabarina</i> Fstr.			
<i>haematodes</i> Fstr.			
<i>dryobia</i> Fl.			
<i>urticae</i> Lin., Fl.	tota Eur.		
<i>eupoda</i> Htg. Fstr.		Chermes salicis Lin.	Suecia
<i>forcipata</i> Fstr.		Psylla marginata Htg.	Germ.
<i>protensa</i> Fstr.		" simplex Htg.	Germ.
<i>crassinervis</i> Fstr.		" geniculata Rud.	Germ.
		Trioza lepidoptera Rud.	Germ.
		" punctiventris Rud.	Germ.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Löw Franz

Artikel/Article: [Psylliden des paläarktischen Faunen-Gebietes. 209-214](#)