

Zwei neue Otiorrhynchus-Arten aus dem Kaukasus.

Von E. Reitter in Mödling.

Otiorrhynchus Tatarchani n. sp.

Oblongus, niger, nitidulus, squamulis oblongis subobconicis viridi-aureis parce maculatim adpersus; rostro punctato, subimpresso, in medio carinato; antennis gracilibus, funiculi articulo secundo primo vix duplo longiore, articulis 3—7 oblongis, sensim brevioribus; prothorace longitudine minus latiore, fortiter granulato; dorso in medio longitudinaliter canaliculato, lateribus leviter rotundato, elytris rugosis, fortiter punctato-striatis, interstitiis rugulosis, femoribus indistincte dentatis. Long: 9 mm.

Dem *O. dives* Germ. sehr ähnlich und in seine Verwandtschaft gehörend, von derselben Färbung und mit ähnlichen Schuppenflecken geziert; die Schuppen sind jedoch bei der vorliegenden Art langgestreckt, verkehrt konisch, mit abgerundeten Winkeln. Der Rüssel hat einen deutlichen Mittelkiel, der Halsschild eine Mittelfurche und die Schenkel sind nur äusserst schwach gezähnt.

Bei dem ♂, welches im Umriss dem ♀ nahezu gleichkommt, ist der erste Bauchring grubenförmig vertieft.

In den Hochthälern Swanetiens auf einer Raphanus-Art von Hans Leder und Fürst Tatarchan gesammelt.

Otiorrhynchus subcoriaceus n. sp.

Oblongus, niger, subnitidus, glaber, rostro profunde punctato, in medio subcarinulato, antennis gracilibus, funiculi articulo secundo primo vix duplo longiore, articulis 3—7 fere globosis; prothorace longitudine vix latiore, granulis deplanatis punctiferis obsito, lateribus in medio parum rotundato; elytris oblongo-ovatis, convexis, glabris, alutaceis aut coriaceis, subtilissime catenatim striato-punctatis, interstitiis latis, planis, aequalibus, subtilissime vix perspicue subseriatim punctulatis, femoribus obsolete dentatis. Long. 7·5—8·5 mm.

Mit *O. carbonarius* Hochh. nahe verwandt und diesem sehr ähnlich, von derselben Form und Färbung; der Rüssel und der Halsschild ist ähnlich sculptirt, nur sind die Körnchen des letzteren flacher, mehr abgeschliffen, die Flügeldecken sind kahl, sehr deutlich hautartig reticulirt, die Punktreihen viel feiner, etwas kettenartig zusammenhängend, die Schenkel, Schienen und Füße ähnlich geformt, gefärbt und behaart, ebenso zeigen die Schenkel nur ein sehr undeutliches Zähnchen.

Unter Steinen im Hochgebirge von Swanetien von Leder entdeckt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Zwei neue Otiorrhynchus-Arten aus dem Kaukasus.
222](#)