

Ueber die turkestanischen Arten der Coleopteren- Gattung *Laena* Latr.

Von **Edm. Reitter** in Paskau (Mähren).

In der Deutsch. Ent. Zeitschr. 1899 pag. 282 habe ich für die *Laena robusta* Kr. und *turkestanica* Reitt. aus Turkestan die Untergattung *Catolaena* m. aufgestellt, die sich diese durch ungerandete Seiten des Halsschildes von der Gattung *Laena* wesentlich entfernt. Inzwischen kam mir ein reicheres Material dieser Gattung aus Turkestan zu und ich fand darunter auch eine Art, welche wegen der deutlich gerandeten Seiten des Halsschildes, zu den echten Laenen gehört, aber eine Eigenthümlichkeit besitzt, welche einigen *Catolaenen* zukommt, nämlich einen breiten Zahn auf der Aussenseite der Vorderschienen, der weit vor der Spitze steht.

Die mir vorliegenden Arten aus Turkestan lassen sich in nachfolgender Weise auseinander halten:

- 1'' Seiten des Halsschildes strichförmig gerandet. (*Laena* s. str.)
- 2'' Oberseite aufstehend behaart.
- 3'' Halsschild viel länger als breit, vorne nicht schmaler als die Flügeldecken. — Urgut, Askhabad, Buchara.
dilatella Erschoff.
- 3' Halsschild breiter als lang, schmaler als die Flügeldecken. Grösser (7mm gegen 4) als die vorige Art. — Kokand; mir unbekannt.
hirtella Erschoff.
- 2' Oberseite kurz und fast anliegend behaart.
- 4'' Seitenrand des Halsschildes gefurcht, in der Mitte der Furche mit einem Grübchen. Dunkel kastanienbraun, gross. Long: 8·5 mm. *) — Kan-ssu. — Horae XXIII. 709.
bifoveolata Reitt.
- 4' Seiten des Halsschildes nur äusserst fein gerandet, einfach. Vorderschienen am Aussenrande weit vor der Spitze mit grossem, breiten, dreieckigen Zahne. Langgestreckt, kastanienbraun, Fühler, Palpen und Beine braunroth, Oberseite kurz, nicht ganz anliegend, wenig dicht gelblich behaart. Fühler den Hinterrand des Halsschildes erreichend, Glied 3 doppelt so lang als 2, die vorletzten Glieder so lang als breit. Kopf schmaler als der Halsschild, dicht

*) 1 Ex. in Coll. von P. v. Semenov in St. Petersburg. Die obigen Daten sind meiner Beschreibung entnommen.

und stark punktirt, vorne mit 2 breiten Längseindrücken, darum am Grunde die feine quere Stirnlinie nur wenig sichtbar; Augen mittelgross, etwas vorstehend, Schläfen länger als die Augen, nach hinten verengt. Halsschild merklich breiter als lang, gerundet, alle Winkel stumpf abgerundet, oben stark mässig dicht punktirt. Flügeldecken von der Breite des Halsschildes, dreimal so lang als dieser, oval, an den Seiten parallel, mit starken, gleichmässigen Punktstreifen, die fast ebenen Zwischenräume mit feiner weitläufiger Punktreihe. Schenkel verdickt, ungezahnt, Schienen gebogen. Long: 6·5 — 7 mm. —
Buchara. dentitibia n. sp.

- 1' Seiten des Halsschildes ganz ungerandet. (*Catolaena* Reitt.)
 5'' Vorderschienen einfach, am Aussenrande vor der Spitze ohne Spur einer Ecke.
 6'' Flügeldecken lang oval, fast dreimal so lang als der Thorax, Körper flach gewölbt, Fühler den Hinterrand des Halsschildes erreichend. Long: 7·2 mm. — **Margelan.**

turkestanica Reitt.

- 6' Flügeldecken sehr kurz oval, nur doppelt so lang als der Thorax, Fühler den Hinterrand des Halsschildes weit überragend. Schwarz, glänzend, hoch gewölbt, kurz abstehend gelb behaart, die Fühler, Palpen (bis auf das dunklere Endglied) und Beine rothbraun, die vorletzten Glieder der Fühler reichlich so lang als breit. Kopf schmaler als der Thorax, dicht und stark punktirt, vorne mit 2 breiten Längseindrücken, Augen ziemlich klein, schwach vorragend, Schläfen nach hinten verengt. Halsschild kugelig, so lang, oder fast so lang als breit, in der Mitte am breitesten, nach vorne und hinten gleich verengt, alle Winkel stumpf abgerundet, oben stark, wie die Deckenstreifen, nur auf der Mitte der Scheibe feiner punktirt. Flügeldecken kaum breiter als der Thorax, mit starken Punktstreifen, die Zwischenräume innen flach, gegen die Seiten zu gewölbt, alle mit feiner Punktreihe. Schenkel stark verdickt, einfach, Schienen gebogen, sehr kräftig, einfach. Long: 6·5 — 7 mm.

Von *robusta*, für die ich sie ursprünglich hielt, durch die Form der Vorderschienen, den gleichmässig gerundeten Thorax, dessen starke Punktur, noch kürzere Flügeldecken

und etwas längere Behaarung unterschieden. — **Verni, Alata** u. (Dr. John Sahlberg.) **brevipennis** n. sp.

- 5' Vorderschienen weit vor der Spitze mit breitem, stumpf vortretendem zahmartigen Winkel. Sonst der vorigen Art ähnlich, aber der Thorax hinter der Mitte am breitesten, nach vorne merklich stärker verengt, oben fein, weitläufig punktirt, die Flügeldecken etwas länger, die Behaarung kürzer. *Long*: 6·5—7 mm. — **Samarkand.**

robusta Reitt.

L I T E R A T U R.

Lepidoptera.

Reichert Alexander. Die Gross-Schmetterlinge des Leipziger Gebietes. (Herausgegeben vom Entomologischen Verein „Fauna“ zu Leipzig, zur Feier seines 25 jährigen Bestehens. 3. Auflage. Im Auftrage des Vereines in gemeinsamer Arbeit mit Max Fingerling und Ernst Müller. Klein Octav, pag. 81, mit Index. — Leipzig im Selbstverlag des Vereines, 1900)

Edm. Reitter.

Rhynchota.

Berg Carlos. Tres Reduviidae novae argentinae. (Comunicac. Mus. Nacional de Buenos-Aires I. 1900, pag. 187—190.)

Die drei n. spec. sind: *Hammatocerus lunifer*, *Daraxa Ambrosetti* und *Ghilianella argentina*.

Chabaneaud P. et Royer M. Sur une phénomène tératologique observé chez *Enoplops scapha* Fabr. (Bullet. Soc. Ent. de France. 1900, pag. 252 - 253.)

Es werden zwei Exemplare von *Enoplops scapha* F. (Hemipt.) mit abnormen Fühlern beschrieben; sie stammen beide aus Frankreich.

Quaintance A. L. Contributions toward a Monograph of the American Aleurodidae. (Technical Series Nr. 8 from U. S. Depart of Agricult. Divis of Entomology. Washington 1900. 1—48; with VII plates.

Die Arbeit umfasst die amerikanischen Arten der Gattungen *Aleurodes* Latr. und *Aleurodicus* Dougl.; von ersterer werden 16, von letzterer eine neue Art beschrieben.

Strobl Gabriel. Steirische Hemipteren. (Mittheilungen des Naturwiss. Ver. für Steiermark, Jahrg. 1899, pag. 170—224, Graz, 1900 erschienen.

Die an Arten reiche Arbeit ist das Ergebniss des eigenen Sammelleisses des Custos am Stiftsmuseum zu Admont, Prof. G. Strobl. Sie enthält die *Hemiptera leteroptera* und von den *Hemipteris homopteris* die Cicaden und Psylliden. Allen Arten werden genaue Sammeldaten beigegeben, worunter auch Oertlichkeiten aus dem Litorale, aus Niederösterreich u. s. w. angeführt erscheinen. Ein besonderes Augenmerk wurde den Varietäten geschenkt. Neue

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wiener Entomologische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Ueber die turkestanischen Arten der Coleopteren-Gattung Laena LATR. 61-63](#)